




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2549/A/3





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2549/A/3



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2549/A/3



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2549/A/3

6940

De morbis

M V L I E R V M C V -

R A N D I S , A V T H O R E


Nicolao Rocheo do-

ctore medico.

C V M P R I V I L E G I O .

1 5 4 2

Venundantur Parisiis apud Ioan-
nem Foucherium in vico Iacobeo
sub intersignio floris Lilii.

 L est permis à Denys la
not d'imprimer & met-
tre en vente ce present
liure, & deffenses faictes
à tous aultres libraires & impri-
meurs, iusques à deux ans de ne
l'imprimer ou faire imprimer, ven-
dre ou faire vendre, d'aultres que
ceulx que ledict suppliant aura im-
primez, sur peine de cōfiscation des
liures qu'ilz auroient imprimez &
d'amende arbitraire, comme plus à
plain est cōtenu en sa requeste res-
pondue du xxiii. iour de Iuing mil
cing cens quarante deux.

Ainsi signé. I. I. de Mesmes.

ILLVTRISSIMAE SERENISSIMÆQUE principi D. KATHARINÆ
ab Ambasia comiti cortisanæ apud
insubres, baronissæ linneriensi, mi-
glani, charantonii, trenollii. &c.
Dominæ calmōtis, marigniaci che-
uagniaci, tisiaci, sancti bricii ad li-
gerim, ampli putei. &c. Nicolaus
Rocheus. S. D.



Vū luteciam mēse octo-
bri peteres, à te accerfi-
tus, vt in via è domo tua
morbum, si quis occur-
reret, proffiga-
rem, veni clarif-
sima princeps, prosperam item vale-
tudinem tuam seruaturus. Nec de-
fuerunt in itinere, quibus aduersa
valetudine correptis suppetias tuli,
nihilò tamē minus ego aliquot ho-

A ii

ras selegi pro scribendo libro, quem
tibi lutetiæ excussum dicarem, quo
mulierum morbis facile mederi po-
terit, qui hunc in promptu habuerit,
qui & si latinus sit: non propterea
indignum duxi dicandum mulieri
gallicæ, quam penes hospitantur, ne
dicam charites, sed & ipsæ Iouis no-
uem filia: quod testantur, venusta
verborum cōcinnitas, facundia, mo-
destia, mores probatissimi, pruden-
tia, castitas, christianismus, omni-
um historiarum tenax memoria, pie-
tatis in pauperes opera, preces
assiduæ, & cætera id genus. Nec mi-
rum, quum nemo eorum à quibus
originē traxisti otio deditus fuerit,
at potius, quotquot fuere, virtutes
gratiâsq; citissimo gressu prosequu-
ti sūt. Quis precor, Aenea troiano in
rebus gerendis cōsultior. Quis Af-

canio ipso (nam ab eo natales tuos
accepisti) inter Duces strennuior.
Quis Cæsare Iulio vigilantior. Tan-
dem (ne historiam texere videar) ab
ipso Iulio dictatore vsque ad auum
& patrem, patruosque tuos inge-
nuosissimos principes (relinquendo,
regum gallorum & imperatorum,
adde & proauorum & tritauorum
historias) finem impono. Nec est
qui me mendacem aut parasitum
dicere possit, quum id satis notum
sit ex tum gallorum tum latinorum
historiis. Quid passim dicitur de
Georgio illo Ambasiano à pontifice
romano ad gallos cum omni ipsius
potestate misso. Is certè ad romani
pontificii dignitatem peruenisset,
nisi gladio ensibusque abstinere ius-
sisset, animæ propriæ probus consul-
tor pietatisque fraternæ amator, Il-

A iii

lo tempore ex patruis tuæ germa-
næ sex variis in cœnobiis virgini-
bus præerant, silentio transeo pa-
truos tuos pontifices, quorum acta
breuitati studens, hic describere no-
lo. Nouit gallia, nouit & italia karo-
lum illum illustrissimum generosif-
simumque fratrem tuum Ludouici duo-
decimi gallorum regis omnem ita-
liam annis duodecim ita ditioni sub-
iecisse, quod rex italiæ tunc potius
censendus erat quam dux: cuius me-
moriam nunquam delebitur. Vale
princeps optima, faxit Deus opti-
mus maximus annos viuas Adami-
cos, & demum spiritus sedes petat
beatas. E Lutecia. 26. die ianuarii.
1542.

NICOLAUS ROCHEVS

lector beneuolo.

S.



N lector candide libellus de mulierum morbis quem partim ex græcorum Arabumque monumentis decerpſi, partim ex ea quam experientia didici arte medica, deſcripſi, in vnoquoque capite ordinem obſeruauī, quem probatiorem iudicaui, incipiendo ſcilicet à definitione, cauſas, notas, prædictiones, nutritatum & tandem curandi rectam rationem proſequutus ſum. Hunc dicaui nomini dominæ meæ katharinæ ambafinæ, ne acephalos in lucem prodiret, quanquam libenter de ſemine genitali, & meatuum, membrorumque ſeminariorum morbis iſtum præcedere debeat.

A iiii

Tertium tenet ordinem libellus de
natorum & educatione, & eorū mor
bis. Quartus liber capillorū affectus
ipforūque infectiones āplectitur. In
quinto narrantur cerebri neruorūq;
pathemata, hos quatuor propediem
prelo mandandos curabo, modò bo
no gratoque animo hunc suscipias.
Vale foeliciter.

TRACTATUS MORBO-

RVM IN MULIERE CV-

randorū Index copiosif-

simus.

De mulierum meatibus semi-
nariis. fo. 3. pag. 1.

Testes foeminarum ab utraque par-
te. fo. 5. pag. 1.

De mulierum locis. fo. 6. pag. 2.

De mēſibus mēſtrualibus. fo. 11. pa. 2.

De purgatione menſtruorum.
Folio. 12. pag. 1.

De menſium facultate ex Plinio.
Folio. 13. pag. 1.

Cauſæ ex menſium moris. fo.
17. pag. 1.

Notæ ex iifdem ſatis apparentes.
fo. 20. pag. 1.

Prædictiones. fo. 22. pag. 1.

Nutricatus exhibendi. fol. 23. pag. 1.

Curatio quàm neceſſaria menſium
ſuppreſſorum. fo. 24. pag. 2.

INDEX.

Señtio venæ pro muliebri purgatio-

ne. fo. 25. pag. 1.

Potus ad extenuandos humores.

fo. 16. pag. 2.

Quæ menses cient simplicia ex Plinio. fo. 28. pag. 1.

Potiones compositæ. fo. 29. pag. 2.

Potiones pro mensibus comprimen-
dis ex pituita. fo. 30. pag. 2.

Potiones ad menses ex flaua bile
comprimendos. fo. 31. pag. 2.

Potiones ad idem ex atra bile.
fo. 32. pag. 2.

Purgationes humorum per aluum.
fo. 33. pag. 1.

Subductio pituitæ. fo. 33. pag. 2.

Bilis flaua quomodo educitur.

fo. 34. pag. 2.

Bilis atræ subductio. fo. 35. pag. 1.

INDEX.

Balnea & infessus ex subductione
pituitæ. fo. 35. pag. 2.

Infessus ad subductionem flauæ
bilis. fo. 36. pag. 1.

Vnguenta necessaria ad pituitam.
fo. 36. pag. 1.

Vngueta ad bilem flauā fo. 37. pag. 1.

Vnguenta ad atram bilem. fo.
37. pag. 1.

Pulueres, eclegmata, & pastilli ad
pituitam accommoda. fo.
37. pag. 2.

Pastilli ex mirrha. folio. 38. pag. 8.

Eclegmata pro flaua bili. fo.
38. pag. 2.

Placentæ pro atra bili. fo. 39. pag. 1.

Fotus, euaporationes, & suffitus
fo. & pag. eadem.

Euaporationes à pituita. fo.
39. pag. 2.

Cucurbitulæ. fo. 40. pag. 2.

INDEX.

& 53. pag. 1.
 Iniectiones quàm vtilis. fo. 1.
 40. pag. 2.
 Pessi & prostheta. folio. 40.
 pag. 2.
 Pessi pro flaua bile. folio. 42.
 pag. 2.
 Purgatio muliebris, hæmorrhagiâ-
 que locellorum & muliebri proflu-
 uium. fo. 43. pag. 2.
 Causæ & fluxus muliebrium locel-
 lorum fo. 43. pag. 2.
 Notæ ex fluxu. folio. 45. pag. 2.
 Præfagia. fol. 45. pagina. 2.
 Victus qualiter sumendus. fol.
 46. pag. 2. & folio. 67.
 pag. 1.
 Curandi ratio. folio. 47. pag.
 2. & fo. 67. pag. 2.
 Missio sanguinis e vena. fo. 48.
 pag. 1.

INDEX.

Potus utilis pro muliebri proflu-
uio. fo. 48. pag. 2

Simplicia ex Plinio. folio. 50.
pag. 1

Potiones compositæ & serapia.
fo. 51. pag. 1

Purgantia per aluum. folio. 52.
pag. 1

Purgantia item pro bile flaua.
fo. 52. pag. 2

Globuli vorandi *ἡλπιότα.*
fo. 52. pag. 2

Eucathismata siue infessus. f. 53. pa. 2

Constrictiones. fo. 53. pag. 1.

Suffitus. fo. 54. pag. 2

Eclegmata & placenta rotulæ que.
fo. 55. pag. 1

Placenta & eclegmata ex pituita.
fo. 56. pag. 1

Epithemata & cataplasmata. fo.
56. pag. 2

ē iii

INDEX.

Vnguenta accommodatissima.
 57. pag. 2
 Emplastra. fo. 57. pag. 2
 Pelli. fo. 58. pag. 2
 Metranchita. fo. 60. pag. 1
 Portanda quæ sunt mulieribus.
 fo. 60. pag. 2
 Hysterica. fo. 61. pag. 1
 Clyster & glandes, aliter supposito-
 ria. fa. 60. pag. 1
 Sectio venæ. fo. 62. pag. 2
 Potus è castorio. fo. 62. pag. 2
 Quæ subducant humores noxios.
 fo. 69. pag. 1
 Eclegmata, pulueres, & aliæ confe-
 ctiones. fo. 69. pag. 2
 Constrictiones & frictiones. fo.
 69. pag. 2
 Odoranda naribus. fo. 70.
 pag. 1
 Suffitus, linimenta, & per metran-

INDEX.

Chitum iniectiones.fo. 70.
pag. 2
Rubificationes & cataplasmata.
fo. 71. pag. 2
Sternutatio.fo. 71. pag. 2
Vomitio.fo. & pag. eadem. vt sup.
Encatisma.fo. 72. pag. 1
Aspergines.fo. 71. pag. 1
Pessi.fo. 72. pag. 2
Procidentia vteri.fo. 72. pag. 1
Causæ procidentium vteri.fo.
73. pag. 1
Notæ vteri procidentis.fo.
74. pag. 1
Victus ad procidentia vteri.fo.
76. pag. 1
Clysteres.fo. eo. pag. 2
Sectio venæ propter vterum proci-
dentē.fo. 77. pag. 1
Systremma lana conuoluta.fo.
& pag. eadem.

é iiii

INDEX.

Cucurbitulæ ad quid necessariae. fol. 77. pag. 2.

Olfacienda. fo. 78. pag. 1.

Pulveres, in seßus, & fatus. fol. & pag. ead.

Cerata & emplastra. folio. 79 pag. 1.

Vnguenta. fo. 79. pag. 2.

Suffitus. fo. 80. pag. 1.

Pessus. fo. 30. pag. 2.

Potus. fo. & pag. ead.

Mola quid. fo. 81. pag. 1.

Causæ generationis molarum. fo. 81. pag. 2.

Notæ earumdem. folio. 82. pag. 1.

Præfagia molarum. folio. 83.

pag. 2.

Victus pro molis. folio. 84.

pag. 1.

Curatio quæ sit congrua pro mola.

INDEX.

alienanda.fo.84.pag.2

Vena quæ secanda propter molam.
fo.84.parg.2

Purgatio per aluum.fol.35.pag.12

Potus pro mola.fo. & pag.ead.

Inseſſus & balnea.folio. eodem.

pag.2

Vnguenta, cerata, & emplastra.
fo.&.pag.ead.

Confectiones.fol.26.pag.22

Pessi.fo.87.pag.1.

Suffitus pro vtero.fo.87.pag.2

Causæ inflammationis vteri.

fo.23.pag.1

Notæ inflammationis eiusdem.

fo. &.pagi.eadē.

Nutricatus pro inflammato vtero.

fo.eo.pag.2

Clysteres pro eodem.fo.89.pag.1

Venæ sectio propter vterum infla-
matum.fo.&pag.ca.

INDEX

Purgatio per aluum.fo.&.pag.ea.
 Irrigationes & epithemata. fo.&
 pag.eadem.
 Obstetricis quod sit munus.fo.
 90.pag.1
 Iniicienda quæ sunt per metranchi-
 tum.fo.90 pag.2
 Pessuli.fo.& pag.ea.
 Potus pro vtero inflammato.
 fo.91.pag.1
 Placentæ,morsuli,& eclegmata.
 fo.& pag.ea.
 Inunctiones pro vtero.fo. eod.
 pag.2.
 Emplastra ad idē.fo.& pag.ea.
 Causæ inflammationis locellorum.
 fo.92.pag.1
 Notæ inflammationis eorumdem.
 fo.92.pag.2
 Prædictiones eiusdem. fo.94
 pag.2

INDEX.

Victus ad idem. fo. 95. pag. 1.
Quæ vena fecanda ex tali inflam-
matione locellorum. fo. eo. pag. 2.
Serapia & potus pro eodem. fo.
96. pag. 1.
Purgatio ad iddem. fo. eo. pag. 2.
Fotus ad iddem. fo. eo. pag. 2.
Cataplasmata pro eodem. fo. &
pag. 1. eadem.
Emplastra & inunctiones. fo.
97. pag. 1.
Inseflus pro supradicta inflamma-
tione. fo. 92. pag. 2.
Dilutiones per metranchitum.
fo. 99. pag. 1.
Pessi pro locellis inflammatis.
folio. 100. pag. 1.
Vnguenta ad inflammationem lo-
cellorum. fo. eodem pag. 2.
Epithemata ad iddem.
folio & pag. eadem

INDEX.

Vomitio ad idem. fol. 101. pag. 1.

Abscessus pro eodem. folio &
pagina eadem.

Notæ inflammationum locellorum.
fo. eo. pag. 2

Prædictiones eorum quæ de locello
rum inflammatione dicta sunt.

fo. 102. pag. 1

Victus similis pro locellorum in
flammatione vti & vteri. fo.

& pag. eadem.

Cataplasmata pro eodem. folio. 102.
pag. 2

Inseffus, similiter. fo. 102. pagi. 2.

Pessi apti pro eodem. fo. &
pag. eadem.

Quæ facienda rupto vteri aposte-
mate. fo. 103. pag. 1

Potus pro rupto abscessu. fo.
103. pag. 2.

Clysteres iuxta idem. folio. 104

INDEX.

pag. 1

Iniicienda quæ sunt in vterum per
metranchitum. fo. 104. pag. 1

Manu qualiter medendum. fol.

104. pag. 2

Causæ exulcerationis locellorum.

fo. 105. pag. 1.

Notæ exulcerationis eorūdem.

fo. 105. pag. 1

Quæ per metranchytum iniicienda
sunt fo. 105. pag. 2

Sarcotica quando immittenda. fo.

107. pag. 1

Vnguenta pro exulceratione locel-
lorum. fo. 107. pag. 2

Pessi pro eodem. fo. 108. pag. 1

Emplastra ad illud necessaria. fo.

108. pag. 2

Sectio venæ ob exulcerationem lo-
cellorum. fo. 109. pag. 1

Nutricatus pro ylcere locellorum.

INDE X.

pag. 1. fo. 109

Prædictiones ex his vlceribus. fo.

109. pag. 1

Causæ, cur abscessus vteri fuerit pi-
tuitosus. fo. 109. pag. 2

Notæ ex abscessu vteri pituitoso. fo.

109. pag. 1

Curatio quæ sit abscessus vteri. fo.

110. pag. 1

Iniicienda cum metrâchyto. fo. 110.

pag. 1.

Emplastra pro tali abscessu. pag. 2.

fo. 110

Scirrhus & scleroma vteri. fo. 111.

pag. 1

Causæ scirrhi. fo. 111. pag. 2.

Notæ scirrhi, & scleromatis vteri.

fo. 112. pag. 1

Vena secâda pro scleromate vteri.

fo. 112. pag. 2

Subductio humoris pro tali sclero-

INDE

mate fo. 113

Cataplasmata, malagmata & em-
plastra. fo. & pag. eadem.

Vnguenta satis vtilia pro scirrho
vteri. fo. 114. pag. 1

Cucurbitulæ pro scirrho vteri. fo.
114. pag. 2

Inseſſus pro eodem. fo. 114. pag. 2

Immittenda cum metranchito. fo.
114. pag. 2

Pessi pro vteri scirrho & scleroma-
te. fo. 116. pag. 1

Cancer vteri. fo. 116. pag. 1.

Causæ canceris vteri. fo. 116. pag. 1

Notæ canceris vteri. fo. 116. pag. 1

Prædictiones de cācris. fo. 116. pag. 2

Victus quis exhibendus propter can-
crum. fo. 119. pag. 1

Missio sanguinis e vena, si cancer
vteri. fo. & pag. eadem.

Eucathisma pro cancro vteri. fo. 119.

INDEX.

pag. 12

Potus pro eodē vt supra. fo. 119. pa. 2.

Cataplasmata & cerata, fo. & pag. ea.

Vnguenta maximè requisita pro
cancro vteri. fo. 120. pag. 1.

Adhibenda intrinsecus per metran
chytum. fo. 120. pag. 2.

Rhagades, condylomata, & hemor
rhoides vuluæ. fol. 122. pag. 1.

Causæ rhagades. fo. 122. pag. 1.

Notæ rhagades. fo. 122. pag. 2.

Pessi & epithemata in rhagadis. fol.
123. pag. 1.

Clausura muliebrium locorum. fol.
124. pag. 1.

Causæ ex clausura muliebrium lo
corum. fo. 124. pag. 1.

Incessus & cataplasmata. fo. & pag.
eadem.

Pessi apti pro loco muliebri. fo. 124.
pag. 2.

INDEX.

Suffimentis vtendum pro eodem.
Fol. & pagi. eadem.
Fotus & lotiones ad aperiēdas clau-
sas mulierū vuluas. fo. & pag. eadē.
Hiatus hostii vteri. fo. 125. pag. 1.
Contortiones & peruerſiones vul-
uarum. fol. 126. pag. 1.
Cauſæ ſterilitatis. pag. & folio eodē.
Notæ ſterilitatis fo. 131. pagina. 2.
Prædictiones ex ſterilitate. folio.
135. pagi. 1.
Viſtus qualis ſit pro ſterilitate.
Folio. 137. pag. 1.
Potus quis pro ſterilitate. folio
139. pag. 1.

RECEPTIONES AD ſterilitatem.

℞. pro pituita, ſi parens ſterilitatis.

ō

INDEX.

fol. 139. pag. 2.

Rx. si bilis flaua. folio. 140. pag. 1.

Rx. pro atra bili, si conceptionem
impediat. fol. 141. pag. 1.

POTIONES PUR-
gantes.

Receptiones potio. purgates pro pi-
tuita. fol. 142. pag. 1.

Rx. si bilis flaua. fol. & pag. eadem.

Rx. ab atra bile. Folio. 142.

pagina. 2.

Catapotiæ recept. si pituita. folio
& pag. eadem.

Catapotia pro bili flaua. folio. 143.
pagina. 1.

Rx. pro bili atra, fo. 143. pag. 1.

Catharticus bucellatus, & ecleg-
mata aluum subducentia. folio. 143.

INDEX.

pagina.2.

Rx. Cathartici bucellati, pro bili
flaua.fol.144.pagi.1.

Rx. si vitellina bilis.folio & pagina
eadem.

Rx. si atra bilis.fol.& pag.eadem.
Sectio venæ ex sterilitate.folio &
pagina eadem.

Balnea, infusus, & fatus propter ste-
rilitatem.fol.144.pag.2.

Rx. propter muliebrium locellorū
humiditatem, si bilis flaua.folio.

145.pag.2.

Rx. ad idem, si atra bilis.folio.146.
pagina.1.

Rx. si ex sola siccitate.folio.146.
pagina.1.

Eclegmatum receptio, si pituita.fol.
146.pagina.2.

Rx. eclegmatum, si bilis flaua.folio
147.pag.2.

ō ii

INDEX.

Recept.eorundem, si ex sanguine.
folio. 148. pag. 1.

Rx. altera ex eisdem, si atra bilis. fo.
148. pag. 1

Eclegmatum recep. si ex sola sicci-
tate. fo. 148. pag. 2

Pessi receptio, si pituita. fo. 148.
pag. 2

Rx. pessi, si ex bile flaua. fo. 149.
pag. 1

Rx. pessi, si ex sanguine. fo. eodem.
pag. 2

Rx. eiusdem, si ex atra bile. fo. & pag.
eadem.

Pessi recep. si ex sola ariditate. fo. &
pag. eadem.

Iniicienda per metrāchitum ex bili
flaua. fo. 150. pag. 1

Suffitus ex pituita. fo. & pag. eadem.

Suffitus recept. si ex bile. fo. 151.
pag. 1

INDEX.

- Emplastra & cataplasmata extra
balneum deferenda. fo. 151. pag. 2
Conceptio, foetus generatio, impræ-
gnatio. fo. 152. pag. 1
Causæ conceptionis. folio. 161.
pag. 1
Notæ conceptionis. fo. 161. pag. 1
Notæ conceptionis ex lotio. folio.
165. pag. 1
Notæ imprægnationis ex pulsu. fo.
166. pag. 2
Notæ sexus. fo. & pag. eadem?
Prædictiones ex notis conceptio-
nis & imprægnationis. folio. 166.
pag. 1
Abortum facientia. folio. 172.
pag. 2
Simplicia abortum facientia ex Pli-
nio. fo. 174. pag. 1
Nutricatus quo gravidæ sunt alen-
dæ. fo. 174. pag. 2

INDEX.

Clyster pro grauidis. folio. 175.

pag. 1

Purgatio vtero gerentibus conueniens. fo. & pag. eadem.

Venæ sectio pro grauidis. folio. 175.

pag. 2

Cataplasmata & emplastra pro grauidis. fo. 175. pag. 2

Pica, seu malatiæ, & fastidii cura.

fo. 176. pag. 2

Vnguenta ex pica siue malatiæ.

folio. 179. pag. 1

Eclegmata & pulueres. folio. 179.

pag. 2

Victus satis conueniens grauidis.

fo. 180. pag. 1

Contra tumores pedum prægnantium.

fo. 181. pag. 1

Causæ difficultatis partus. folio. &

pag. eadem

INDEX.

- Notæ difficultatis partus.
fo. 125. pag. 2.
Præfagia ex difficultate partus.
Folio. 134. pag. 1.
Pariendi ratio. Fol. 184. pag. 2.
Iuuantia partus ex Plinio.
Fol. 186. pag. 2.
Iuuantia partus ex monumētis Ara-
bum. Fol. 192. pag. 2.
Inseſſus pro partu iuuando. fol.
& pag. eadem.
Vnguēta poſt balneū. fol. 193. pag. 1.
Potus pro partu. fol. 3. pag. eadē
Species aromatica. fol. 193. pag. 2.
Quid faciendum in hora parturi-
tionis. fol. 194. pag. 1.
Cataplaſmata & emplaſtra adhiben-
da in hora parturitionis. f. 194. pa. 2.
Iniiciēda per metranēhytum in par-
turitione. fol. & pag. eadem.
Potus dādus parturiēti. f. 195. pag. 1.

Catapotia & orbiculi. fol. 195. pa. 2.

Eclegmata apta in parturitione.

Folio. 196. pag. 1.

Secundæ retentio. fol. 196. pa. 1.

Secundam extrahendi modus.

Folio. 197. pag. 2.

Eclegmata confortantia cerebrum.

Folio. 198. pagina. 2.

Encathismata pro retentione secundæ. fol. 198. pag. 2.

Linimenta, inunctiones & portanda. Fol. 198. pag. 2.

Potiones quæ menses prouocant.

Folio. 200. pag. 1.

Suffitus pro retentione secundæ.

Folio. 200. pag. 2.

Pessî pro vt supra. fol. 201. pag. 1.

Puerperæ cura. Fol. 201. pag. 2.

Monstra propter quid fiant. Fol.

201. pagina. 2.

FIN.

De muliere

Reverendissimi Patris

et Magistri

De sancti Augustini de civitate dei

libro octavo de civitate dei

capitulum de civitate dei

de civitate dei

de civitate dei

de civitate dei

de civitate dei

de civitate dei

de civitate dei

de civitate dei


de civitate dei

de civitate dei

de civitate dei

de civitate dei

de civitate dei



De mulie-

RVM MEATIBVS

feminariis.

De foeminarū genitalibus mem-
bris, ac ipsorum morbis describere
par est. Venæ igitur humoris, quam
prolificū plerique medici prædi-
cant, eandem ferme in foemella,
quam in viris originem habent, ac
flexuosis orbibus in testiculos deri-
uant, inde ad vuluæ ostium tēdunt,
vnde semen tanta voluptate pro-
rumpit quod vanum atque inutile
philosophorum princeps Aristote-
les asseuerat, cui & Arabs Auerroës
subscribit. Veruntamen (fateor) ex
renibus, spina, coxis, lumbis, venæ
ac arteriæ multæ, quæ sparsim fun-

Alexan-
der bene
dictus, li.
20. anat.
6. 23.

a iii

DE MORB: MVL:

dūtur in fibras per vuluam tenuiffi-
mas) tendunt, ex quibus genitalis
humor, crassus, albus, oui albori si-
milis intus colligitur (vt bilis quo-
tidie in stomacho) ad conceptum ne-
cessarius: quod in ouis contigit, in
quibus quod candidū est ac luteum
a foemina prodit, semine maris, tan-
tū constituyente: ex ea materia mē-
bra quæ spermatica vocamus gene-
rantur, at ex mensibus rubentia, qua
lis caro est nutrienti similis, fiunt.
Aristoteles de piscibus hæc refert.
Que autem rupto, foetus veluti nu-
cleus constat, qui primum nullum
accipit cibum, sed oui humore iam
hausto increfcunt, post nutriuntur
aquis dulcibus fluuiorū, vsque dum
satis augeantur. Idem author. An id
verum, non dicitur, alimentum om-
ne esse extrinsecus, sed protinus vt

Arist. lib.
6. de hi-
storia ani-
malium
c. 3.

in plantarū seminibus inest aliquid
tale primum quod lacteum voca-
tur, sic in animalium materia excre-
mentum constitutionis alimentum
est, incrementum verò foetui per um-
bilicum contingit, eodem quo plan-
tas modo per radices, atque etiam
animalibus ipsis, ubi absoluta iam
sunt, ex eo (quod continetur) alimen-
to idē accidit. At quod foeminis in-
venere prorumpit, non per saltus
exit sicut virile: quoniam inutile est
& vitiato simile, omnino differens
ab eo, quod intra vuluam sine libi-
dine quādoque restagnat. Ex utrif-
que itaque maris & foeminæ foetus
membra figurantur, ac spiritalis vi-
ta producitur: verū ex virili semi-
ne principalia membra, ex foemineo
cætera ignobiliora constituuntur,
ex puriori veluti materia, sicut &

a iiii

spiritalis vigor. Maris enim semen
 in medio genitalis foeminei alboris
 colligitur, vt generandi potestatem
 in materiam vniuersam diffundat,
 ex Galeni sententia, atque ita mem-
 bra formantur menstrui sanguinis
 nō indiga, donec exhausta materia,
 maiori corpus indigeat nutrimen-
 to, quod ex vmbilico postea quæri-
 tur. A conceptu enim ad septimum
 vsque diem feminis prolifici fluxio-
 nes simplices apparēt, quo tempore
 & vmbilicus inchoari & secundæ vi-
 dentur. Decimo die cordis bulla tu-
 met, spiritu intus ebulliente & calo-
 re extrinsecus exsiccante, secunda-
 rum materia firmatur: quoniam &
 planta, & cortex eodem, generantur
 tempore. Post eos dies cætera mem-
 bra describuntur, nec vno tempore
 principalia gerantur membra, quo-

niā diuersæ sunt naturæ. Cor enim
 primū progeneratur, exinde re-
 liqua describuntur membra, postre-
 mō replentur pictoris imita-ione,
 circiter diem.30.masculina figuran-
 tur membra ex Hippocrate. Alii ta-
 men(inter quos Aristoteles) mari
 40.diem statutum pronuntiant, fœ-
 minæ trium mensium vel post, quo-
 niam figura in humido post abor-
 tum non permanet, sed statim dis-
 soluitur. Mas si in aquam frigidam
 diffunditur, cogitur consistitque in
 me mbranula, qua rupta, fœtus
 ipse apparet magnitudine formicæ
 maiusculæ, & mēbra iam inde dis-
 creta tum cætera omnia, tum geni-
 talia constant, & oculi(vt in cæteris
 animantibus)prægrandes.

TESTES FOEMI-
narum,

Alex bc.

Melanc-
thon in
commen-
tario de
Anima.

Testes in foeminis ab utraq; parte
refimi sunt, leporinis similis, ex qui-
bus (vt alii arbitrantur) meatus, alii
ad vuluæ cauum exeunt generatio-
ni apti, quæ sententia refectione ip-
sa facile ostenditur. Habet & mu-
lier (inquit Melancthon opinione
Galenii) testiculos sitos iuxta cornua
matricis vtrinq; minores virili-
bus & frigidiores, sed tamen semen
quoddam generantes, quod est qui-
dem tenuius virili & subaquosum,
sed tamen in procreatione foetus
miscetur virili semini, eique velut
alimentum est, vt augeat virile se-
men, & foetus ex utroque procre-
tur. Nam vtrumque semen & actiue
& passiuè se habet, in generatione
foetus, multum in utroque spiritu-
um inest, sed virile quàm sit calidius
& minùs rarum, magis se actiue ha-

bet. Quum autem mulieris testiculi sint extra matricem, & tamen ab ipsis muliebri semen in matricem transmitti oporteat, ut inūgatur virili, sciendum est, ut in viris vasa spermatica vehunt seminis materiā ad testes, deinde testes trāsmittūt per quasdā abages in parastatas, ita propemodū fit in mulieribus. Nā vasa spermatica materiam seminis muliebris vndiq; ex corpore muliebri attrahūt, deinde testes excipiūt, exceptum & coctum trāsmittunt in parastatas, quæ sunt vasa amplectentia matricem, quæ quum à testiculis recedunt, incipiunt fieri paulò latiora, donec ingrediuntur matricem. Per hos ramos (quia in concubitu aperiuntur propter motum) illabitur muliebri semen in cauum matricis. Differunt autem viriles parastatæ à muliebribus, quia viriles

per longas ambages perueniunt ad
virgam, sed in muliere amplectun-
tur matricem non longo ductu.

DE MULIERVM

locis.

Lib. II. c.
37

Vterus in foeminis (inquit Pli-
nius) loci vocatur, in reliquis anima-
libus vulua.

Gal. lib.
de fi.

Loci ex duabus venis, totidem-
que arteriis constant.

Alex. bc.

Ostium vuluæ in muliere ac in
ceteris animalibus naturam, atque
os genitale vocari vidimus: In me-
dio tunicula vtrique apparēs nym-
pha *νύμφη* & cletoris *κλετορις*
dicitur. Ea intus natura ita custodi-
tur, vt in maribus glans præputii ter-
gore, vt hoc primo munimento aër
arceatur. Interior pars ceruix voca-

tur, in cuius medio ferè neruosa exi-
litas est, venulis dispersa tenuibus,
virginitatis testimonium affert. Eu-
giō vel Hymē vocatur, primo enim
coitu scinditur. Naturalia interdū
adeo cōpacta sūt à natura, vt chirur-
gi opera indigeāt. Partem interiorē
matricem locosque appellamus, qui
desiderio coitus saepe descēdunt in
his, quæ acetabula κοτυληδόνες sūt,
vocantur, quibus per vmbilicū fœ-
tus augetur. Vulua nullā vim immu-
tadi feminis, sed cōseruatricē tātum
possidet. Locorū ostium internū na-
tura glandulosum est, ad glādis viri-
lis similitudinem mucronatū, foras
in ceruicem prominēs suo turbine.
In ceruis triplex ostiū est, ob eā cau-
sam grauidæ (quia dolent) coitum
refugiunt, mulieres verò adamant,
vnde & quandoque superfœtant.

Vulvæ acetabula non omnia perfecta animalia possident, sed cornigera & vna parte dentata, dum partum gerunt: ex vtraque parte dentatis lepus, mus, vespertilio, habent acetabula. Sus vuluam leuem habet, & conceptus vulvæ non acetabulis adhæret. Semen itaque trahi à locis vteri, atque ob eam rem multa generari pro numero locorum & acetabulorum: saepe enim eodem in loco vteri, gemini consistunt.

Acetabulis vulvæ ex secundis robustior adhæret ea parte, qua confusa quædam fibrarum multitudo est.

Umbilici orificia acetabulorum orificiis respondent, vnde ali dicimus. Asperitas enim vtriusque fibrarum orificiorumque tenacitatem facit, vt in parietibus fieri solet. Scalpunt enim prius, vt cementum

superinductum magis hæreat asperitati. Umbilicus cum inuolucro hoc est secundis, functus officio, ab acetabulis abscedit, veluti pomi pediculus iam maturi à ramo sponte cadentis. Ex iis acetabulis à partu menstrua profluunt: similis in maribus materia est, quæ in semen genitale per concoctionem vertitur.

Locorum ostium in cōceptu aperitur, & exinde clauditur, nec amplius recluditur, nisi mulier superfoetet, vel fluxionibus laboret, vel si menses fluant, os id adeo occlusum est, ut aër subire nequeat. Loci ipsi posituram habent inter spinæ imæ partem, quæ os sacrum vocamus, supra vesicam, contra mediam positi aluum, inde paulum ad dexteriores coxam convertuntur, postea super rectum intestinum progressi, illis feminibusque

latera sua annectunt, rectam cū vesica continuatāque cervicem habent, quem Canale vocant, qui cervici vesicæ suppositus, carnosus cartilaginofusque admodum est: is in pragnante contrahitur.

Alex. bened.
Ex
celso. lib.
4. C. 1.

Vulva in virgine exigua est, in muliere (nisi ubi grauida est) non multo maior, quā manu comprehendi possit. Ea cordi, arteriis, nervis, cerebro, spinæque medullæ committitur, præcordiis item, māmīs, renibus, ventri, iliis, coxis, pubi, quæ omnia in vulvæ strangulationibus percipiuntur: quibus anima subducitur, vertigines sentiunt, capillos in vertice vel occipitio conuelli arbitrantur, lumbos præterea, fœmora, inguina & stomachum dolent, quædam obmutescunt, aliquibus mentes solvantur. Illis præsertim

adalligatur neruulis quibusdam re-
tortis, qui grauidis protenduntur.
Nulla vena de maiore, recta via ad
vuluam pertinet, de aorta verò mul-
tæ frequentēsque veniunt. Eius ma-
teria neruosa est, rugosa, pelliculosa,
pollicaris crassitudinis, quæ ad con-
ceptus magnitudinem extendi pos-
sit. Qui eo tempore acetabula vuluæ
inquirunt ad magnum vulgi deside-
rium, digna frustratione frustran-
tur: videri enim minimè possunt,
nec primo conceptus tempore cum
inuolucra (quæ secundas vocant)
robustius vuluæ adhærēt: tum enim
evidentius membrana valētior per
vmbilici radices acetabulis (quæ
κοτυληδόνας Græci vocant) cō-
mittitur, quales in polyporum fir-
rhis videmus, qui suctu cum aliquid
capiunt, continent. Hæc accrescen

b

te foetu conspicua sunt cum vtero,
cauo autem ad foetum conuersa ex
Aristotele. In ipso inuolucro ex se-
cundis quædam carnosæ extatæ fi-
bris referta minimis acetabulis affi-
xa, quæ sanguinem & spiritum velu-
ti radicum fibræ exsugunt, digerunt-
que per venas, & ad vmbilicum vs-
que deferitur sanguis, spiritusque per
quem alimentum haurit foetus.

Melæctho
lib. de aia

Matrix μήτρα, partes duas ha-
bet, Receptaculum, factum vt foetū
cōtinere possit, idque vocatur ὑστέρα.
Altera pars est angustior, quæ est
aditus longiusculus, ideoque Col-
lum matricis dicitur. Et quoniam
receptaculum amplius est, qua par-
te versus collum tendit, sunt addita
cornua, vt quasi lunæ crescentis fi-
guram referat. Nam hæc cornua sūt
ligamenta, quæ matricem alligant

toxis. Est & matrix intus vndique
consperfa tanquam punctis. Sunt
autem hæc puncta, orificia venarum
vndique tendentium ad matricem,
& hæc orificia vocantur ideo κο-
τυληδόνες, quia vt amplecti possint
fibras, quibus foetum in vtero & re-
tinent & alunt, sunt similes extre-
mis polypi pedibus, qui appellantur
cotyledones, propter cauā figuram
& aptam adprehendendum.

Triples utilitas est cotyledonum.

Sunt enim canales, per quos san-
guis menstruus effluit: suppeditant
etiam sanguinem puriorem alendæ
matri & alēdo foetui, & figura sua
fibras apprehendunt, vt retineri in
vtero foetus possit. Oriri autem Co-
tyledones alii putant à vasis semina-
riis, Galenus etiam à caua vena,
Aliquæ haud dubie rami sunt vena

b ù

rum, quæ à mamillis ad vterum tendunt: attrahunt enim mamillæ partem aliquam sanguinis ex vtero, quæ mutatur in lac, quemadmodum Hippocrates ait lac menstruo fraterum esse. Gemini matrici. Sinus sunt ab utraque laterum parte leuiter discreti (in dextra masculinum, in sinistra foemininum concipi volunt) geminis in mare testibus respondentes, in vacca veluti cornua plurimum discreta sunt.

Fœminis vulua scorti conuersi similitudinē refert, extrinsecus nervosa, intrinsecus autem carnosior, & est receptaculū foetus. Muliebris pudendi sinus pilis decoratus, Græcum nomen *κτῆς* obtinet. At quæ sinum ambiunt Alæ vocantur. Inter has autem caruncula, quæ bifariam excreuit Græcorum lingua

ὀμφη, nostra colliculum appella-
re licet, quem quòd multo promi-
neat, Aegyptii in virginibus exci-
dere consueverunt. Porro in ipsius
naturalis collo musculus est, quo
trinam cum lubet retinemus, Anu-
lus à figura, ab officio Fibula voca-
tus est. Venæ in partem eius infe-
riorem plurimùm aperiuntur, per
quas sanguis expurgatur, qui graui-
dus retinetur, cæditque in alimen-
tum foetus & formationem. Nam à
venis quæ secundas implicant, bi-
nae aliæ prodeunt venæ, ab arte-
riis indidem fitis binæ arteriæ, & à
neruis vnus nervus mutuo in vnũ
congressu, meatum quendã ab ana-
tomicis græcis *ὀμφη* appella-
tum absoluunt, qui infantis vmbili-
co inferitur, ex quo & enascitur &
suspensus est, vel alueus est foetus, lo-

b iii

cus cui post suppeditat nutrimentū.

DE MENSIBVS.

Alexan.
bened.

Menstrua quum plurimum lunæ motu singulis mensibus profluunt, quo profluuio virginibus vox mutatur, vt in maribus primo coitu, māmā inde tumescant. Hæc non nisi semen incoctum ab Aristotele appellantur, ex partibus quæ supra infraque renes sunt, & à lumbis, minimis venis prodeūt ad vuluæ acetabula, quibus foetus in vtero alitur, (vt dictum est) vel à puerperio iuxta naturalium ora: ex venis quoque duabus secundū os pubis iuxta vrinæ exitum erumpunt. Ex ea parte & foeminarum non prolificum semen in coitu (vt dictum est) effunditur, tanto in plerisque impetu, vt masculorum more longius exiliat, diuer-

sæ quidem naturæ ab eo, quod in
vulvæ cauo prolificum restagnat. Gal. lib.
Menstrua cōtingunt mulieri, vt sa- defi.
nitatem tueantur. Retenta enim in
conceptione foetui fomētum mini-
strant: facta quidem ad conceptio-
nem & lactis generationem. Alterū
(inquit Galenus) nostræ generatio-
nis principium, sanguis menstruus
videlicet, humidum natura est. Gal.
in comment. 2. lib. aph. sententia. 24.
Qui crescunt. &c.

DE PURGATIONE menstruorum.

Plærisque sane puellis anno. 14. Aegineta
mensium expurgatio primū inci- lib. 3.
pit, paucis admodum ante annum
tertium & decimū, aut duodecimū
muliebria proueniunt: plurimis ve-

b iiii

rò post annum decimum quartum tandem prorumpunt. Tempus autem vnicuique purgationi statum non est: plerisque etenim per bиду aut triduū, maximæ verò parti quinque dierum spatio menses excernuntur, aliæ usque ad septimum: paucae raræque sunt, quæ ad duodecimum usque diem huic profluvio iugiter obnoxie expurgantur. Sistuntur autem huiusmodi muliebres denique expurgationes, partim quidem anno ætatis suæ quinquagesimo, partim verò, quanquam ea rara sit avis, non ante annum sexagesimum, nonnullis à septimo statim ætatis, (vt ita dicam) lustro, & potissimè bene curata cute, ac præpinguibus desinere atque ònino cessare menses coeperunt. Quando igitur lètè ægræque ea purgatio procedit, circa prothesmiam

certum menstruorum terminū la-
ua, potionatōque vel sisanno, aut
porro capitato, cū pipere & ruta in
hoc ipsum decoctis, reliquus potus
ex passo fiat cretico: bibens autem
huius potionis ea affectione oppres-
sa cotylam, deambulando commo-
uebit menstrua. Manducet verò lo-
ligines, sepias, polypodas, & quæ-
cumque id genus sunt: nam sangui-
nem turbandi proliciendique po-
tentiam habent.

DE MENSIVM FACVL-
tate, Ex plinio.

Iam primum abigi grandines tur-
binēsque, contrā fulgura ipsa in mē
se connudata, sic auerti violentiam
cæli, in nauigando quidem tempe-
states etiam sine menstruis. Ex ipsis
verò mensibus monstrificis, alia di-
ra & infanda vaticinantur: ē qui-

Plinius

lib. 28. c.

7.

bus dixisse non pudeat. Si in defe-
ctu lunæ solisve congruat vis illa,
irremediabilem fieri. Non segnius
& in silente luna coitus suos mari-
bus exitiales esse atque pestiferos.
Purpuram quoque ab his eo tempo-
re pollui, tanto vim esse maiorem.
Quocunque autem alio menstruo,
si nudatæ segetem ambient, erucas
ac vermiculos scarabeosque ac no-
xia alia decidere. Metrodorus Scep-
sius in cappadocia inuētum prodit,
ob multitudinem cantharidum il-
las ire per media arua, rectetis super
clunes vestibus. Alibi seruatur, vt
nudis pedibus eant, capillo cinctū-
que dissoluto. Cauendum verò ne
id oriente sole faciant, sementem
enim arefcere. Item nouella vitis
eius tactu in perpetuum læditur. Vt
ad noxiam res medicatissima trans-

feratur, rutam & ederas illico mori.
Sed præter hæc certum est, tactis
alueariis apes fugere, linæque quum
coquatur nigrescere. Aciem in cul-
tris tonforum hebetari, æs contactū
graue virus odoris accipere, & æru-
ginem magis, si decrefcente luna id
accidat. Equas, si sint grauidæ, ta-
ctas abortum pati. Quin & aspectu
omnino, quamuis procul visas, si
purgatio illa post virginitatem pri-
ma fit, aut in virginea ætate sponta-
nea. Nam bitumen in iudæa nascēs,
sola hac vi sponte superari. Et fila
vestis contactæ, ne igne quidē vin-
cuntur, quo cuncta. Cinisque etiam
ille, si quis aspergat eum lauandis
vestibus, purpuras mutat, floribus
colorem adimit, ne ipsis quidē fœ-
minis malo suo immunibus. Abor-
tum facit illitus, aut si omnino præ-
gnans supergrediatur. Que lais &

Cleophātus inter se contraria pro-
 didē. e de abortiuis, carbone ē ra-
 dice brassicæ vel myrtæ, vel tama-
 ricis in eo sanguine extincto: item
 asinas non concipere tot annis,
 quot grana hordei contacta ede-
 rint: quæque alia nuncupauēre
 monstrifica, aut inter se pignantia,
 quum hic fecunditatē fieri iisdem
 modis, quibus illa sterilitatem pro-
 nuntiaret, melius est non credere.
 Bythus dyrrhachinus hebetari as-
 pectu speculorum nitorem tradit.
 Iisdem aduersa rursus contuenti-
 bus, omnem talem vim resolui, si
 nullum piscem habeant secum.
 Multi verò inesse etiam remedia
 tanto malo aiunt, podagras illini,
 strumas & parotidas, panos, sacros
 ignes, furunculos, epiphoras, tra-
 ctatu earum mulierum leniri, lais

& salpa, canum rabiosorum morsus, & tertianas quartanásque febres, menstruo in lana arietis nigri, argenteo brachiali incluso.

Diotinus thebanus, vestis omnino ita infectæ portiuncula acu, vel pelliceo brachiali inserta. Sortica obstetrix tertianis quartanísque efficacissimum dixit plantas ægri subterlini, multóque efficacius ab ipsa muliere, etiam ignoranti.

Sic & comitiales excitari, morbósque sanari Icethidas, aliás icacidas, medicus quartanas coitu finire, incipientibus duntaxat menstruis, sponondit. Inter omnes verò convenit, si aqua potúsque formidetur à morfu canis, supposita tantum calici lacinia menstruo tincta tali, statim metum eum discuti, videlicet præualēte sympathia illa Græ-

corum, quum rabiem canum, eius sanguinis gustatum incipere dixerimus.

Cinere enim eo iumentorum omnium vlcera sanari certum est, addita caminorum farina & cera, maculas autem è veste eas, non nisi & eiusdem farina ablui volumus. Cinerem verò per se rosaceo mistum, foeminarum præcipue, capitis sedare dolores, illitum fronti, asperrimamque vim profluvii eius esse primis annis, virginitate resoluta. Id quoque convenit, quo nihil equidem libentius crediderim, tactis omnino menstruo postibus, irritas fieri magorum artes, generis vanissimi ut æstimare licet.

Solum animal menstruale mulier est.

Nihil facile reperitur mulierum
profluuio magis mōstrificum. Aref-
cunt superuentu musta, sterilefcunt
tactæ fruges, moriuntur insita; exu-
rūtur hortorum germina, & fructus
arborum quibus insidēre, decidunt
Speculorum fulgor aspectu ipso he-
betatur, acies ferri præstringitur,
eborisque nitor, aluei apum emori-
untur, æs etiam ac ferrum rubigo
protinus corripit, odórque dirus aë-
ra, & in rabiem aguntur gustato
eo canes, atque insanabili veneno
morsus inficitur. Quum & bitumi-
num sequax alioquin & lenta na-
tura, in lacu Iudææ (qui uocatur Af-
phaltites) certo tēpore anni super-
natans, nequit sibi auelli, ad om-
nem contactum adhærens, præter-
quam filo quod tale virus infecerit.
Etiam formicis animali minimo,

Plinius.
lib. 7. c. 15

inesse sensum eius ferunt, abiicitque
gustatas fruges, nec post eam repe-
tit. Et hoc tale tantumque omnibus
tricenis diebus malum in muliere
existit, & trimestri spatio largius.
Quibusdā verò sæpius mēse, sicut ali-
quibus numquam, sed tales non gi-
gnunt, quando hæc est generando
homini materia, semine ē maribus
coaguli modo hoc in sese glome-
rante, quod deinde tempore ipso
animatur, corporaturque. Ergo cum
gravidis fluxit, inualidi aut non vi-
tales partus aduntur, aut saniosi, ut
author est Nigidius.

MENSIVM MORA.

CAVSAE.



Quæ singulis quibusque Aegineta
 mensibus mulieres repe lib. 3. c. 61
 tit purgatio, supprimitur
 quadoque vniuerso qui-
 dem corpore in-
 comoda vale-
 tudine affecto, interdū verò locel-
 lis modo earumdem priuata ægritu-
 dine vexatis, propter loci illius fri-
 giditatem, aut plagam, aut distēpe-
 rantiam oborta, vel acquisititiā af-
 flictionē, vt plurimū verò ex abor-
 tionibus, & propter principem ali-
 quam corporis partem, propria pas-
 sione afflictam, verbi causa, iecur,
 aut vētriculum, aut pectus quē græ-
 ci θώρακα dicūt, aut aliquid hū-
 iusmodi, quæ in diuturno accidunt

c

morbo.

Gal. lib. 3
de sym-
ptomatu
causis.

Neque mensium suppressionem, neque prauas expulsionem, omnium quæ ex utero profluere solent, difficile fuerit inuenire, si similes tibi scopos proposueris. Etenim nonnūquam uteri ipsius corpus, si solidum fuerit aut durum, causa est cur menses supprimantur: detinentur etiam nonnunquam ob materiam ipsam, quā vel crassum fuerit excrementū, vel viscosum, supprimuntur etiam nonnunquā, licet utile fuerit excrementū, obstructis ob huiusmodi humores vasis, quæ ad uterum descendunt. Præterea vniuersi corporis occasione, mulier interdum nihil expurgat, interdum plus iustò, interdum minus, nonnunquā etiam deprauatū. Nihil omnino excernit, ob multas exercitationes, & victum tenuē, &

quum ad alias partes repunt humores. Minus excernit, easdem ob causas, sed remissiores quàm pro naturali cōsuetudine. Plus autē ob diuturnum otium, & victū opiparum. Cæterum deprauatæ per vterū fluxiones (nominatur verò quicquid huiusmodi est fluxus muliebris) sūt expurgato per hanc partem vniuerso corpore. Atque talē semper refert speciē id quod excernitur, quale est id quod in animante redundat: quippe rubrum excrementum sanguinis saniem declarat, album pituitam, pallidum bilem amaram. Præter iam dicta, est aliud ex vtero deprauatum profluuium, ob affectū aliquem ipsum infestantē eueniens. Insuper menses interdum supprimuntur, nō ob sanguinis penuriam, quā vel multa exercitatio (vt dictū est)

c ii.

vel tenuis victus induxit, neque ob
affectum in vtero cōsistentem, sed
propter robustas vires, sanguine ad
alias partes irruente. Etenim nemi-
nem latet, quòd nōnunquā aut ma-
ior mensium copia fuit quā antea,
aut minor, aut omnino nihil fuit:
aut prauum est quod affluit, ob pro-
prios vteri morbos, siue ipsius cor-
nua, siue cervix, siue totum spatium
afficiatur, atque sub hac diuisione
steriles quoque cōprehēdi possunt.

Gal. in 5. Menstrua possunt fieri pauciora,
aph 57. vel quia venæ ferentes ad vterum
si menstrua menstruam purgationem cōprimū-
plura. & c. tur, vel obstruuntur ob crassitudinē
sanguinis vel frigiditatem, & robur
ipforum quæ sunt in vtero vasorū,
adeo, vt quod influit non admittat.
Fuch sine Mulieribus quibusdā menses sup-
ex paulo primuntur, vel naturaliter, vel præ-
& ætio.

ter naturā. Si naturaliter, hinc colligere licebit, quòd mulier nulla inde molestia vel totius corporis, vel vteri afficiatur. Aetatis itaque rationem iam descripsimus. Steriles etiā mulieres in vtero habentes & saltatrices, naturaliter non purgantur. Nam quicquid in eis recremēti est, nimia exercitationis vehemētia absumitur, & vt summatim dicam, mulieres calidioris temperaturæ, validisque exercitiis vtētes & agrestes, parum aut nihil per menstrua purgantur. Nonnunquam autē præter naturam menses nimia vel pinguedine, vel gracilitate supprimi solēt. Pingues enim exanguiore reliquis sunt, minimasque venulas habent: quique illis inest paucissimus sanguis, fere in pinguedinem transit. Graciliores verò ob diuturnum ali-

quem morbū extenuatæ, nihil prorsus superuacui sanguinis continēt. Præterea menses non defluunt, quibus sanguis vel crassius, vel lentus, vel per alia loca delatus fuerit: sicuti per nares, aut sedē, aliis etiā quod è thorace sanguinem eiectionerint, aliis quod è disiecta vena ultimam sanguinis inanitionē tolerauerint, menses suppressi sunt: sed & reliqua excretionum genera idē effecerūt, ut sudoris multitudo, assidui vomitus, alui profluvia, ac pustularū omne genus, quæ in cute efflorescunt. Sic præter has omnes causas menses supprimuntur ob acutos maximosque morbos, & ob alimēta quæ vel paucitate, vel multitudine sua excesserint. A paucis enim alimento paululum quidpiam confestim expirat, à multo verò meatus obstruuntur,

& exiretio intercipitur: sæpe etiam in ore vteri calli obtorti, aut carnis excrescentiæ, aut pinguedinis copia purgationem menstruam impediunt. Quibusdam etiam cicatrices vlcerum quæ in vtero præcesserunt, vasorum ora à quibus sanguis in vterum ferebatur, obstruxerunt. Nōnullis post abortum vteri ore exulcerato, ac deinceps ad cicatricem ducto, obstructio ac compactio superuenit, quæ sanguinis per vterum excretionē aufert: curæ quoque pertinaces, formidōque immodica, & ingens mœror menses intercipiunt, frigida denique aut alia vteri intemperies menses remoratur.

NOTAE.

c iiii

Gal. lib. 6
de locis
affectis,

Accidentia quæ ob astricta menstrua infestare solent, nunc enarrare aggredior, sumpto initio ab his quæ ab Hippocrate in Aphorismis scripta sunt, præcipue verò quum dicit: Si mulier neque prægnas, neque puerpera lac habet, menstrua eius defecerunt. At nullo in mammis apparente lacte, menstrua suppressa hisce notis deprehenduntur. Grauitas totum corpus molestat, item fastidium quoque ut nulla sit cibi cupiditas, horror inæqualis, quòd si citra horrorem inæqualitas aliqua fuerit, atque fastidium, cupiatque mulier quadam aliena, iube ut obstetrix uteri cervicem tangat. Nam si citra duritiem clausa inueniatur, eam prægnantem esse coniicies. Nonnullæ cibum præterea euomunt, ac terram, aut extinctos carbones, aut alia quadam huius-

cemodi ædūt. Si verò clausū fuerit
os cervicis vteri, ac duritiē quoque
habeat, affectū aliquem in vtero esse
portendit. Oportet itaque speculari
obstetricē ad quā partem, vel decli-
net, vel retrahatur: nā in ea parte af-
fectam vteri sedem esse coniicien-
dum est. Atque in quibusdam foemi-
nis, eius partis dolor cum gravitate
nō nihil significare potest: quin etiā
in coxam dolor transit, ac crus ipsū
quod ē regione est, per incessū clau-
dicat. Quod si lōgiori tēpore suppri-
mātur menstrua, nullāque medicus
mulieri vacuationē promoueat, tu-
mor aliquis præter naturā in ilibus
interdū exoritur, ostendēs nimirum
ex internis partibus quampiam esse
inflammata. Nonnullis panus in
extrema ilium parte excitatur: ve-
luti viris quoque eodem in loco

nonnūquam oriri solet, qui vbi sup-
puratus aliquando fuerit, longo tē-
poris spatio vix finitur. Huiusmodi
accidentia suppressa menstrua sequi
consueuerūt, ac præterea lumborū,
& colli, & sincipitis dolor, qui etiam
oculorum fundamenta infestat: itē
febres ardentes, & vrinæ nigrican-
tes, cum rubra quadā sanie, perinde
ac si aquæ ex qua nuper mactatæ
carnes ablutæ fuerunt, fuliginem
quis immiscuisset, quibusdā vrina,
aut difficulter redditur, aut omni-
no supprimitur. Quum ergo horum
aliquid in muliere conspexeris, v-
terum veluti radicem ipsorum con-
iicere oportet. Quòd si per alium
quempiam corporis locum sanguis
effluxerit, aut inflammatio, aut
Erysipelas excitatur, an menstrua
purgentur interrogare debes: siqui-

alem nihil horum accidere solet in-

egre purgatis,

Frigidioris autem temperaturæ Fuchs.
cœminas ex iis potissimum digno-
cemus, quòd somnolentiores, ad
omnemque motum segniores sunt,
et colore candidiores, seu plum-
beæ, vrina aquosa, pituitam quo-
que iugiter excreant, & interdum
etiam pituitosos humores euomunt.

Calidioris autem temperaturæ
notæ, iam commemoratis prorsus
contrariæ sunt.

PRAEDICTIONES.

Mulierì sanguinem euomenti, 5. Aph. 32
menstruis erumpentibus solutio fit. 5. Aph.

Menstruis deficientibus, sanguis 5. Aph. 36
ex naribus fluens, bonum.

Mulierì menses decolores, nec

per idem semper tempus venientes, purgationem indicant esse necessariam.

s. Aph.
39

Si mulier neque grauida est, neque peperit, lac habet, huic menstrua defecerunt.

s. Aph.
57

Si menstrua plura fiant accidunt morbi, & si non fiant, ex vtero morbi contingunt.

Hipocra-
tes libro
de foetu. Menstruorum retentio sequentes morbos gignit, conceptum impedit, corpus calefacit, venas implet atque distendit, vesicam premit, vrinam prohibet, dolorem lumborum & suffocationem excitat, coxendicem molestat, interdum putrescit & suppurat.

Dictis addunt Arabes, deliria, comitiales, locorum strangulationem, eorundem abscessus, corporis grauitatem, inappetentiam, con-

coctricis facultatis debilitatem, nau-
seam, ructus, tusses, anhelationes,
aquas cutem subeuntes, febres, mor-
bos articulares, animi angustias,
capitis & radice oculorum dolo-
res, oretulorum exitum inhibet.

Suppressa muliebris purgatio mul- *Aegineta*
tarum & diuturnarum ægreditinū *lib. 3. c. 68*
causa fieri consuevit.

Vrina lactis modo alba & densa,
aut obscura liuénstque, mensium
suppressorum, aut locellorum affe-
ctorum argumento est.

Vrina albescens, ruffescénstve
cum squammosis resolutionibus
nigricantibus eadem arguit, mo-
dò mensium suppressorum reliquæ
adsint notæ.

NUTRICATVS.

Fuchf.

Si à frigidis ac crassis humoribus
menses supprimuntur, cibos cali-
dos & extenuantes exhibebimus.

Vinum etiam fuluum, odoratum
& antiquum vt bibant præcipie-
mus. Exercitia quoque & alia quæ
corpus calefacere, crassosque ac len-
tos humores incidere & extenuare
possunt, præscribemus.

Fuchf.

Cæterum calidiores & plurimū
exsiccatae mulieres curatur, si quā
maxime humectentur humerore hu-
midiorēque cibo & potu, quales
sunt qui ē carnibus agni, hædi, ē
piscibus teneras carnes habenti-
bus, auibus altilibus, & similibus
parantur.

Vino vtendum candido non ad-
modum antiquo & diluto, Balneis
item dulcium aquarum, & vt in
paucis rem cōtraham, victus ratio-

ne ea vtendum, quæ hec̃ticis adhi-
betur.

Alimenta porrò congruunt bel- Aegineta
le instructa, ritèque disposita, & hu-
mida holera, ac dulciora cuncta.
Pisces saxatiles, aues teneriores, &
lactis potatio, confectiones ex melle
quæ μελιττώματα græcè dicuntur.

Vinum tenue, colore candido,
non admodum vetus.

Non probantur carnes, neque
legumina, excepta ptisana.

Vbi autem præfinitum purgatio-
nis tempus pro foribus iam consti-
tuerit, desquamatos pisces marinos,
& ceu dictum est, molliores, quæ
καλάχια vocantur, & quæ cutis
modo integuntur testa, vnde illis
græcè nomē ὀσρακόδερμα est in-
stitutum, necnon porra capitata, cum
puta ac pipere elixa fumant, ius

DE MORB. MUL.

quoque eorundem bibant.

REGVLAE CVRAN-
DI MENSES SV-
PRESSOS.

Quibus ex corporis ariditate
menses suppressi sunt, denegabis
ea quæ calefaciendo siccant.

Aperientibus medicamentis le-
uioribus in curæ aggressu uten-
dum, subinde sensim exhibenda
sunt quæ validius aperiunt.

Hippocratis sententia est, calefa-
ctione ex aromatis muliebria e-
duci.

5. Aph.
18

Lib. 8. de
regali di-
positiōe.

Hæc emplastri modo vmbilico
admoueri debere asserit Haly.

Intentio sanationis in ipsis est, ora quidem aperire vaforū quæ per-
tingunt ad vterum, sanguinem ve-
rò extenuare.

Gal.in.5.
aph.36.
Mulieri
mēses de-
co. &c.

SECTIO VENAE.

Quum igitur ob aliquam inte-
raneorum primariam affectionem
abscinditur aut remoratur mulie-
bris purgatio, nihil neque præstan-
tius neque vtilius, quàm membri
statim peculiari vitio mederi, atque
post hæc vuluam sui muneris ad-
monere per potiones. At vbi ni-
hil horum quidem adfuerit, perspi-
cuum est per se, & non per consen-
sum matricem affici. Si itaque ne-
que ætas, neque habitudo corpo-
ris, neque aliud id genus prohibue-

Argineta

rint, sanguis per venam detrahendus est, non ante tamen præscriptum mensium diem.

Progressu verò temporis adiiciantur dies decem.

Auferatur verò non plus duabus libris cū dimidia, neque etiam minus vna, siue venam fecabimus.

Aegine-
ræ & Ga-
leni tem-
pore fie-
bat.

Quod si febris pariter infestarit, in primis statim diebus febris sanguinem detrahare oportet.

Si plenitudine laborauerit mulier, & nihil aliud prohibeat, à sanguinis missione curandi ratio inchoanda erit.

Fuchsius.

Secunda verò vena malleoli aut poplitis, idque non ante statum mensium tempus.

Gal. lib.
de ratioe
curandi
per sang.
miss.

Quæ ex cubito fiunt euacuationes, purgationes menstruas comprimunt, sanguinemque ad supe-

riores corporis partes retrahunt.

Que verò fiunt ex cruribus, tantum abest vt retrahant, vt etiam menses promoueant, ac vbi id facere volueris, tempus consueti mulieris circuitus tribus quatuorve diebus anteuertas, aut vena incisa, aut scarificatis talis cruris vnus pauculum euacuato: deinde postero die similiter facito in crure altero, vt tamen etiam istis diebus in quibus vacuas, & ante eos

quatuor aut quinque

extenuantem vi-

ctum procu-

res.

POTVS.

d il

Gal.in.5. dunt, & humorum crassitudinem
 apho.36. extenuant, quale est quod ex Cala-
 Nu.men- mento fit, quo nos assidue vtimur,
 ses deco. mento fit, quo nos assidue vtimur,
 &c. sapius enim ciere solent tardantes
 Gal.lib. mensium purgationes. Mulieribus
 de curan- menses abunde prouocant & nepi-
 di rōne ta & pulegium. Exhibebis ea in me-
 per sang. licrato cocta, sed antea contusa, ari-
 missione. da, cribrōque subtili discreta, ac
 rursum trita vsque dum pollinem
 tenuitate referant, ita denique me-
 licrato insperge. Porro conuenien-
 tissimum potui tempus est à balneo
 inuolutis adhuc linteo. Atque hæc
 quidem medicamenta mitia sunt.
 Valentiora sunt sauina, & dicta-
 mum, cæterum vsus antedictis si-
 milis.

Aogincta Auspicante iam statâ muliebri-
 um hora adimat quidem cōpedes,

& potetur myrrhæ obolus, aut fabæ
quartitas aut castorium ex passo, vel
melicrato, artemisiæve decoctū: aut
saluæ post balneū ex passo & absin-
thio. Vinum verò absinthile ad om-
nem curationem propinetur. Ve-
rūm si validiora vehementioraque
res ipsa postulat remedia, hæc fuerit
eorundē materia: Iris illyrica (quam
vulgò Romani gladiolum dicunt)
pota cum vino, cyperi radix, græcē
cyperis nuncupata, ari radix, & ca-
sia, rotundi odorati iunci (quem græ-
ci *σχοίνου* dicunt) flos, nardus, he-
lenique radicis decoctum, & myr-
rhæ fabuly græci magnitudo, cum
passo in dimidiato cyatho poscæ, &
dictanni elixationis cyathi duo, &
gutta ammoniaca, & sagapenum.
Cæterum quæ nimia anxietate sto-
machi torquentur, opopanax exi-

d iii

guum in pilulas redactū, & in cocto melle irrigatum & eliquatum. Con-
suetā quādam nobis semina mulie-
bria ciere nata sunt. Cæterum infe-
riora & minoris efficaciam sunt, fœ-
niculum, cuminum, apium, daucus
Creticus, fœseli, anisum, ciceres &
cercides, & omnia quæ ad mingendū
ciant.

Potui dentur radices circa ter-
tium ordinem aperientes ex vino
albo aut decocto quopiam menses ciē-
te, verbi gratia: Radices apii, gra-
minis, fœniculi, oreoselini, asparagi
rubie passiuæ pentaphyllon, rasci.

Artemisia, nepeta, calamentum,
scopolendrium, semen rusci, acorum,
absinthium, perpenſa, radix iridis,
Lupini, semina apii, oreoselini sati-
ni, & macedonici, organum, men-
tastrum, meum, valeriana, filer mon

tanum, ammi, fefeli cuminum, dicta-
 mum, casia, Inula, satireia, abroto-
 num, allium, smyrnium,

Fortiora prædictis sunt ruta, gitti,
 sinapi, castorium, Veratrum atrum,
 colocynthis, astaphis, agria, myrrha,
 amoniacum, fel tauri, succus cucu-
 meris syuestris, fel gallinæ, opopa-
 nax, piper, pyretthrum, papauer lu-
 teum, asphodelus

QV AE MENSE SCI-

ent simplicia ex plinio.

Aprii & oreoselini semen. li. 20. c.
 11. Cuminum Aethiopicum siue re-
 gium. lib. 20. Gith. lib. 20. c. 17. Si-
 napi fatinum. lib. 20. c. 22. Narrubiū.
 lib. 20. c. 22. Hippomarathi semen
 & radix. lib. 22. c. 23. Liliū radices in
 vino decoctæ. lib. 21. c. 19. Centum-
 capita herba. lib. 22. c. 8. Oleū sam-
 psuchinum, siue Amaracinum. lib.

d iiii

21. c. 22, Anthemis siue chamæmilō
 pota. lib. 22. c. 21. Bulbi radix pota.
 lib. 22. c. 22. Sion latius apio in aqua
 nascens. lib. 22. c. 22. Lupini sylue-
 stres. lib. 22. c. 25. Cortex radicis lau-
 ri. lib. 23. c. 8. Chamædris quæ & trif-
 sago. lib. 24. c. 15. Ampeloprason. ibi-
 dem. Stachys. ibidem. Chrysocomes
 radix. lib. 21. c. 20. Thimum vtrum-
 que. lib. 21. c. 21. Anemone cum pti-
 sana sumptæ, aut vellere appositæ.
 lib. 21. c. 23. Heliochrysum siue chri-
 santhemum è vino pota. lib. 21. c. 25
 Batis. lib. 21. c. 27. Vrtica cum sale.
 lib. 22. c. 13. Caucalis. lib. 22. c. 22. Cō-
 drillon siue condricille habet proxi-
 mam terræ mastichen tuberculo fa-
 bæ, quæ apposita, foeminarum men-
 ses trahere dicitur. lib. 22. c. 22. Laser
 è silphio foeminis datur in vino: Et
 lanis mollibus admouetur vuluæ ad

menes ciendos. lib. 22. c. 23. Horde-
um murinum, siue herba phœnicia
trita ex vino pota, præclare ciet mē-
ses. lib. 22. c. 25. Phacos syluestris. lib.
22. c. 25. Cicercula. ibidem. Vitis ni-
gra. lib. 23. c. 1. Fici succus lacteus ap-
positus cū luteo oui, aut potus cū a-
mylo. lib. 23. c. 7. Caprificus pota mē-
ses cit cum luteo oui. ibidem. Baccæ
lauri appsitæ tritæ, vel potæ. lib. 23. c.
8. Cupressi ramenta pota. lib. 24. c. 5.
Styrax potu. lib. 24. c. 6. Viticis se-
men. lib. 24. c. 9. Ederæ corymbi ap-
positi. lib. 24. c. 10. Harundo indica
syriacâque admotu. lib. 24. c. 11. Ery-
throdani, siue Rubiæ radix & semē.
lib. 24. c. 11. Rosmarini semen. ibidē.
Pæoniæ radix. lib. 26. c. 15. Radix cal-
læ. lib. 27. c. 8. Onopordō lib. 27. c. 12
Smyrni folia & radix. lib. 27. c. 13.
Thlaspe alterum genus. ibidem.

DE MORB. MVL.

Impubium puerorū vrina si deco-
quatur ad dimidias partes cum por-
ro capitato nouo fictili, vaporatio
ea menses foeminarum cit.lib.28.c.
6.Fel taurinum lana succida apposi-
tum.lib.28.c.14. Olimpias thebana
addidit hyssopum & nitrum. ibidē.
Testes castorii duabus drachmis
ex aqua cum pulegio poti.lib.32.c.3.

POTIONES COM-
positæ.

Radicum acori, iridis, oreoselini,
asparagi.an.3.1.feminum apii, foeni-
culi, ainsii, dauci, ammi, vrticæ. an.3.
1.calaminthæ, absinthii.ã.3.f.origa-
ni, abrotoni, artemisiæ, pulegii, asa-
ri.ã.m.1.hissopi.m.1.f. Bulliat singu-
la in aqua iustæ quantitatis, quoad
tertia pars absorpta fuerit, dein ex-

colentur & saccharo sufficienti adhibito, adiiciantur serapia ex calamintha, & hyssopo, & ex marrubio. an. ʒ. i. ʒ. misce, fiat potio pro terna portione propinanda à cubili ieiunæ.

Castori. ʒ. i. mentastri in puluerem redacti. ʒ. ʒ. Vini antiqui, aut mulsæ. ʒ. ʒ. misce, & à balneo calidum propinato. Potio serapionis medici danda mulieri cui suppressi sunt menses, hæsitaturque an vterograt: si pregnans est, foetui vires calfaciendo præbet, alioqui menses cit locellos aperiendo.

Castorii, anisi, feminis apii. an. ʒ. i. trita fecerniculo traice & ex vino potui dato.

Potio Galeni menses deducit foeminis, probè cit vrinam, & omnino admiranda confectio est hy-

dropicis, hepaticis & nephriticis. Aloes. ʒ. c. mastiches ʒ. i. croci. ʒ. i. nardi indicæ. ʒ. i. cinnamomi. ʒ. i. carpo balsami. ʒ. i. asari. ʒ. i. tundo, & angustissimo cribro excernito, atque aridum vt ne transpiret seruato, & cū vino potui dato cochlear vnum. Menses porro puluis iste valentius ducit artemisiæ decocto dilutus.

SI EX PITVITA
comprimuntur menses,
potiones.

Chamæ pitheos, chamedrios, origani, saluiæ, rosmarini, sisimbrii, calamenti, mentastri, thymi. an. m. i. rad. rusci, asparagi, apii, oreoselini, raphani sylvestris, rubiæ & valerianæ. ā. ʒ. i. f. seminis iuniperi. ʒ. ʒ. seminis vrticæ, dauci cretici, ammis, anisi,

foeniculi, costi. an. ʒ. ʒ. f. phaseolorum
rub. cicerum arietinorum, an. p. ʒ.
terantur parum & decoquantur, &
ex decocto colo secreto cum saccha-
ri libris tribus confice serapium, qui
aromatizetur cū cinnamomo electo
& casia, præbe coquendum curato.
Portio exhibitionis esto sesquidra-
chmæ cum ʒ. tribus decocti sequen-
tis quolibet mane, ieiuno ore ven-
triculi. Phaseolorum rubrorum, ci-
cerum rubrorum. an. p. ʒ. feminis iu-
niperi. ʒ. ʒ. f. radicum valerianæ, ra-
dicum rusci, rhaphani sylvestris, A-
sparagi, apii, & oreoselini. ā. ʒ. ʒ. cha-
mædryos recētis m. ʒ. dauci, ammis,
anisi, foeniculi. an. ʒ. ʒ. radicum ru-
biæ. ʒ. ʒ. conterito paululum, & co-
quantur.

Cxymellitis compositi. ʒ. ʒ. ʒ. sera-
pii ex artemisia. ʒ. ʒ. liquoris stillati-

tii artemisiæ, quinque radicum communium aperiētium calidarum, vel bipinnellæ, aut betonica, vel florum sambuci, aut apii. an. ʒ. ʒ. limpidum facito, omnia simul mista pro triplici portione, poteris aromatis condire puta cinnamomo aut casia. Diebus octo ante mēsiū naturale profluuiū hanc curandi rationem aggreditor. g.

SI EX FLAVA BILE.

Artemisiæ. ʒ. 2. adianti, oxalidis, intybi erratici, scolopendrii, betonica, eupatorii, apiastri, mercurialis. an. ʒ. 1. quattuor seminum vulgò refrigerantium dictorum maiorum, seminis viticis, seminis buciæ, seminis pæoniæ, seminum asparagi, seminum abrotoni, intybi erratici, basilici, & lithospermatis. an. ʒ. ʒ.

Radicum valerianæ, rusci, asparagi,
oreoselini & apii . an. ʒ. 2 , iuniperi,
foenigræci. an. ʒ. 1. ʒ. cyperi, spicæ car
di. an. ʒ. 2. ʒ. cicerum rubrorū , pha
seolorum. an. p. 1. trita parum omnia
in aqua coquantur, cōfice serapium
cum tribus sacchari libris, quod o
doratiorem cinnamomo electo fa
cies . Huius sumito sesquiunciam,
quam immisce liquorum stillatitio
rum intybi erratici, cichorii & ab
sinthii. an. ʒ. 1 . similis esto ponderis
quælibet portio , perseverando ad
mensium debitum tempus vsque,
vel quo ad alteratum fluxuque vi
cinum percipias humorem nocen
tem. Serapii acetosi simplicis. ʒ. 1 . o
xymellitis simplicis. ʒ. ʒ. liquoris stil
latitii endiuivæ , Cichor. & absin
thii. an. ʒ. 1. misce.

DE MORE. MVL.
SI EX ATRA BILE,
potiones.

Scolopendrii, adianti, chamædry-
os, origani, calamenti, artemisæ, stœ-
cadis, eupatorii, florū genestæ, bora-
ginis, buglosæ & violarū, vniuscui-
usque. m. f. radicum asparagi. fœmi-
culi, apii & capparum. an. ʒ. i. thymi
in fine decoctionis inieci. ʒ. i. præ-
dictis potes addere glycyrhizæ, vua-
rum passerarum. an. ʒ. f. coquantur, &
ex decocto colo traiecto concinna-
serapium cum sacchari libris tri-
& aceti. ʒ. 4. quod odoratius sit cin-
namomo sibi misto, cuius portio e-
sto. ʒ. i. f. cum liquorū stillatitiorum
fumariæ, buglossi, & artemisæ. an. ʒ.
i. detur à cubili & vespere, quotidie
ad humoris solutionem vsque.

Vel. Oxymelitis simplicis. ʒ. 2. ferapii acetosi ex radicibus. ʒ. 1. liquorum stillatitiorum storum, fabuci, bipinnellæ & asparagi. ā. ʒ. 2. sunt duæ portiones, quibus clarificatis non nihil cinnamomi addere commodè potes.

PVRGATIONES HV-

morum per aluum.

Et quidē purgatio totius corporis, quando crassi eu. cuatur humores, tales sanat dispositiones. Si verò decolores scriptum sit, multo magis purgatio sanabit ita se habētes mulieres. Neque enim propter humorem pituitosum tantummodo, sed & propter melancholicum & biliosum, menses fiunt decolores.

Datur suppressiōnis mensium tē-

Gal. in. 5

Aph. 36.

mu. e. 1

mētes de

co.

Ga. lib.

e

s de curā pore medicamentum, quod proprie
di rōne amarum dicitur, centum habens
per sang. drachmas mixtis aliorum medica-
miss, minum cuiuscunque sex. Optimum
Hiera pi cra, est vbi cinnamomū acceperit, post

Paulus.

diem septimum, siue octauum, pur-
gatione cum hiera vtendum. Hiera
quidem ex colocynthide purgabi-
mus, duarum drachmarum pondus
in melicrati cyathis sex potui præ-
bentes. Quòd si febris pariter infe-
stet, hiera quidem vtendi locus non
est. Hiera picra, Eclegma diaphœ-
nicon, Eclegma. indum,

Catapotia ex Agarico, ex benedi-
cta, Foetida.

SVBDVCTIO PI

tuitæ.

Medullæ cassiæ fistularis extra-
ctæ cum decocto chamædryos, gly

cyrhizæ, cassuthæ, vuarū passarum,
 polypodii querni, & adiāti. 3. 1. ecle-
 gmatidis indi. 3. 3. serapii de radicibus
 cum aceto. 3. 1. misceto, dato ieiunæ
 à cubili. Vel.

Agarici. 3. f. zingiberis. 3. 2. salis
 gēmæ. 3. f. diluātur sero caprillo ad
 dita oxymelitis scillitici. 3. 1. immer-
 gātur simul horis duodecim, & cō-
 pressum colóque traiectum ius potus
 à cubili ieiunæ dato.

Catapotia foetida voranda noctu
 exhibeto.

Turpeti. 3. 1. zingiberis. 3. f. sal.
 gemmæ. 3. 6. sacchari candidissimi.
 3. 2. omnia leuigato, & cum sero ca-
 prillo aut iure pulli, vel iure cice-
 rum arietinorum propinato.

Rosarum rub. zingiberis, cinna-
 momi. an. 3. 2. santalorum alborum
 & rub. an. 3. 1. hermodactylorum. 3. 3.

c ii

turpeti. 3. 4. diacrydii 3. 2. f. masti-
ches. 3. 1. sacchari libra vnam quod
soluatur in liquoris stillati ii arce-
misia, confice quadras pōd. 3. f. dato
vnam ieiunæ a cubili.

SI EX BILE

fluua.

Medullæ casia fistularis decocto
communi extractæ, aut mannae 3. 1.
eclegma is ex succo ros. 3. 1. f. confe-
ctionis hamech. 3. 1. seraphi violacei.
3. 1. potui dato.

Rhabarbari electi 3. 2. spica nar-
di. g. 6. aut cinnamomi tantumdem.
Vino optimo dilue, & horis duode-
cim in sero caprillo immerge, sub-
inde valenter trahendo compri-
me. Colamento adde mannae, au me-
dulle casia fistularis cribro secretae.
3. 1. separii violacei. 3. 1.

Propinato demum ea quæ bilem
per sedem educere valent, quæ te
edocebunt alii medici.

BILIS ATRA SIC

educitur

Adianti, florum vtriusque bu-
glossi & violarum, lupi salictarii,
stœchadis, chamædryos. an. m. f. po-
lypodii. 3. 3. glycyhizæ vuarum
passarum. an. 3. f. terantur paululum
& coquantur in aqua sufficienti, in
fine decoctionis adde epithymi. 3. f.
& cum hoc decocto, cribro extraha-
tur medullæ cassiæ fistularis, aut
mannæ. 3. 1. confectionis hamech. 3.
1. f. diaphœnicon. 3. 2. serapii viola-
cei. 3. 1. detur à cubili.

Corric. Myrobalanorū indorū. 3. f.
luteorū. 3. 2. diluantur horis duo-

e iii

decim in sero caprillo, colo valen-
ter deinde traice, colamento adde
medullæ casia fistularis aut mānæ.
ʒ. 1. epithymi friati. ʒ. 2. zingiberis.
gran. 6. mell. rosacei. ʒ. 1. fiat potio,
detur. &c.

Globuli indi uorandi sunt.

BALNEA ET INSES- sus.

Si ex pituita.

A succorum subductione balnea
sunt ex chamæmelo, artemisia, mē-
tastro, & aliis quæ in decocto pitui-
tam proffigante memorata sunt.

Vel. Sabinae herbæ, origani,
calamenti, apiastri, pulegii, menta-
stri, fertulæ cāpanæ, chamæmeli. an.
m. 2. chelidonii, peucedani, prassii,
absinthii. an. m. 1. foliorum lauri, la-
uendulæ, mercurialis, rosmarini,

ocymi, florum sambuci. ā. m. 3. artemisiæ. m. 6. rad. valerianæ. lib. 2. conterantur paulum omnia simul dempta artemisia, quæ seorsum in sacculo includatur, deinde omnia simul coquantur. Ex his rebus facculus vnus impleatur, super quem in balneo sedeat mulier, & super fœmur sacculum artemisiæ calidum teneat, & bis in die ieiuna balneum intret, & pro arbitrio in eodem stet. Cubile subinde petat, & vnguento vngatur quod inter sequentia vngenta offendes.

Si ex flaua bile.

Subducto humore bilioso, tertio die tale confice balneum, quod accipit. Althœæ cum rad. m. 6. artemisiæ. m. 4. florum sambuci. fol. sali-

e iiii

cis, foliorum violarum, polytrichi.
 an. m. 2 valerianæ sesquilibram, fœ-
 nigræci lib. 2. seminis lini lib. 1. f.
 terantur parum, artemisia seorsum
 recondatur in sacculo. Ex aliis im-
 pleatur sacculus vnus & coquantur
 omnia simul, artemisiæ sacculum in
 balneo super fœmur teneat, altero
 sacculo infideat, dein pétat cubile:
 tuncque pubes & os sacrum inun-
 gatur vnguento quod describemus.

Si ex atra bile, balneum esto tale,
 quale ex pituita.

VNGVENTA.

Si ex pituita.

A balneo in lecto hoc vngvine
 vngatur ant^e & retrò. Olei lilini,
 olei amygdal. dulcium, medullæ cru-
 ris vituli. an. 3. 1. mucoris althææ,

fœnigræci & seminis lini an. ʒ. f.
ceræ parum. Post inunctionem bi-
bat pulueres & elat confectioes
describen. las.

Si ex bile tauræ.

Olei amygdal. dulcium. ʒ. i. f.
medullæ cruris virul ʒ. i. b. u. ri re-
centis, pinguitudinis galinæ, mu-
coris fœnigræci & seminis lini an.
ʒ. f. ceræ parum, cōcinnito vagien-
tum, quo os sacrum & pecten inun-
gantur.

Ex atra bile.

Vngatur vnguento quo pituitosæ
inungendæ sunt. Post quartum di- Aegineta
em a purgatione, dropace vnguento
circa pectinem lumbos ac fœmora
ægrotaens illiniatur.

Olea quibus inungi debet mulier,
cuius menses suppressi sunt. Oleum
lilinum. Rutaceum. Spicatum. Ole-

DE MORB. MVR.

um ex sabina herba.

PVLVERES, ECLEGMATA,
ET PASTILLI.

Si pituita.

Inunctione peracta exhibeto cochlear pulueris sequentis ex vino decoctionis pituitam proffigantis.

Cinnamomi electi reiecto cortice exteriori, corticis casia fistularis. an. 3. 2. casia. 3. 1. f. croci. 3. 2. aristolochia rotunda, perpenſa, calami odorati, corticis radicum capparum, costi, dictami, rad. tormentilla, rad. iridis, eryngii, lacca. an. 3. 2. chamaepithyos, chamedryos, foliorum lauri, origani, polii, zingiberis, calamendi, thymi, seminis smyrnii, seminum rutae syluestris, dauci, nusturtii & his fopi, carpesiorum, nigellae, ammis, anisi, marathri, baccarum lauri, sagapeni. an. 3. f. sacchari quod pon-

dere omnia æquet, friato & vtere vt dictum est. Vel.

Acci. pulueris prædicti depto saccharo. ʒ. ʒ. sacchari candidi liquati in decocto menses ciente lib. ʒ. pan ge quadras, quarum pondus esto. ʒ. ʒ. detur vnà post inunctionem, dein bibat decocti menses prolicientis. ʒ. 2.

Pastilli ex myrrha. Triphera magna siue opio profunt. Acci. fructus sabinæ. ʒ. 1. ʒ. rutæ sicca. ʒ. 2. ʒ. feminis rutæ aggreſtis. ʒ. 2. laſerpicii, ammoniaci, rubi & paſſiuæ. an. ʒ. ʒ. confice ex his simul friatis globulos serapio ex artemisia exceptos, exhibeto ægrotæ. ʒ. 2. ex vino decocti menses cientis, à balneo, aut à suffitu, vel ab euaporatione.

Vel. Cinnamomi, succi cyrenaici, fructuum sabinæ, piperis nigri. ā. ʒ.

DE MORB. MYL.

2. myrrha, castorii. an. 3 f. excipe
melle sufficienti in eclegma exhibe-
to. 3. 2. ex vino decocti menses pro-
riantur, si fitu, aut balneo, vel ab
astu aione.

Si ex flaua bile.

A balneo dato cochlear sequen-
tis pulueris cum 3. 2. decocti menses
suppresos ob flauam bilem cientis,

Cortic. casia fistularis, cyprii. an.
3 1 f. rad. tormentillæ, rad. pæoniæ,
cinnamomi reiecto superiori corti-
ce. an. 3. 2. croci, seminis bauciæ syl-
uestris, seminis pæoniæ. an. 3 1 semi-
nis vi icis, seminum apii, ocymi, o-
reoselinii, mercurialis, asparagi &
milii folis. an. 3. f. adianti, polytri-
chi, chamæmeli, betonicæ, eupato-
rii, spicæ nardi, scharnianthi, lupi sa-
lictarii, seminis endiniæ. an. 3. 1. sac-
chari ad pondus omnium, leuigato

& misceto.

Reiecto saccharo, ex pulvere prædicto pange rotulas aut quadras, in quibus concinnandis pro 3. r. friamentorum adde sacchari (quod in decocto biliosos iuvante liqueatur) libram vnam.

Si ex atra bile.

Ex his quæ atram arcent bilem pulveres & placentas confice.

His peractis saphena vena aperienda est, hinc ad ligaturas veniendū est.

LIGA TVRAE.

Probatum item inferiorum corporis partium artior cū ligaminibus ad treis vel quatuor dies cōstrictio: auspicante verò iam statuta muliebrium hora, adimat quidem cōpules, sed poterit myrrhe obolus, & propinentur reliquæ potiones menses cientes.

Aegineta

DE MORB. MUL.
FOTVS, EVAPORA-
tiones & suffitus.

Abili.

Abrotoni, anethi, artemisiæ, chamæmeli, calitrichi, apiastri, mercurialis, storum sabuci. ā. m. .i. fœnigraci, seminis lini. an. lib. f. ex his contritis & in vino coctis in vaporario aut solio, balnei loco vaporetur mulier. Huius loco talem facito suffitum. Seminis viticis. ʒ. i. f. anethi. m. .i. carei, costi, an. ʒ. i. : terantur parum, & per infundibulum fumum mulier in locellos vestibus tecta sedensque recipiat.

A pituita.

Para æstuarium ex pharmacis quibus confectum est balneum.

Amoni, galbani. an. ʒ. ʒ. succi cyrenaici. ʒ. i. f. frangantur parum, & in carbones iniiciantur, suffianturque

locelli, fumus tamē non pertingat
ad nares.

Fuchsius.

Suffitis etiam ex styrace galba-
no, thure, bdellio, radice aristolo-
chia, artemisia, nigella, cariophyllis,
cinnamomo & similibus paratis
utendum erit. Fouēdus quoque
uterus odoratis fomentis, maiora-
na, serpillio, calamintha, chamæmelo
sertula campana, pulegio, artemisia,
radice iridis, & similibus in olla de
coctis, quam operculo perforato o-
perire oportet, arundinēque, aut a-
lium canalē foramini insertū vndi-
que circumlinere, ut deinde sedens
mulier excepto canali foueatur.

Proderit etiā ut mulier huic de-
cocto vsque ad vmbilicū infideat,
& inde pessos sibi admoueat.

CVCVRBITVLAE.

Nequæ inutile erit cruribus cucurbitulas affigere.

Iniectiones

Fuchf.

Paulus,

Métrachitæ, siue metrâchitæ gallicè vne sonde. Arabicè argalia.

Metranchitis etiam vtendum, in quem vsu vtero infundimus celea calida, ninum liliaceum, laurinum. &c. In sinum porò ipsum infundatur susinum, aut amaracinum.

Succi mercurialis & absinthii, artemisia. an. 3. 6. poteris addere. 3. 2. puluerum vl. ciendi menses habentium, & innicere in locellos.

PESSI ET PRO-
sitheta.

Est autem pessulus lana pectita, & quodcunque aliud teres, digiti hu-
mani speciem præferens, in quo me-
dicamenta sustinentur. Pessus ergo
apponatur ex medicamento è no-
uem rebus constante, & ob id
ἐννέφαρμακον nomen obtinente,
aut olibanius.

Aegineta

Prostheta præterea (sunt autem ea
medicamenta quæ molliore lana ex-
cepta, mulierum naturalibus subii-
ciuntur & condiuntur, barbari na-
stalia vocant) quæ menses ciendi
munus subeunt: ex his constant,
myrrha, absinthio, aut lupinorum
elixatione eliquata, seu rutæ succo
contrita, bdellióque non absimili-
ter. Styrax item & sylvestris oleæ
gummi, succusve rutæ compari mo-
do, vel Aristolochia longa in col-
lyrii, hoc est glandis formam affa-

Aegineta

f

brefacta, & concinata. Confimili
 præterea eodémque modo centau-
 rii grandioris radix, aut veratri, aut
 liquor scammonia & colocynthi-
 dos, medulla per se, & artemisia ca-
 taplasmatis modo illita, cum ruta,
 galbanúmque factó inde suffitu &
 fotu. Quæ utique ipsa & foetum e-
 tiam conceptum vtero elidere, at-
 que eiicere naturæ suæ aptitudine
 possunt. Pessis etiam in vterum de-
 missis, necessitate sic exigente vtē-
 dū, ex quorum numero hic est, qui.
 R. Tripheræ magnæ citra opiū.
 3. 1. farinae erui, nigellæ, rubiæ tin-
 ctorum, artemisiæ, pulegii. an. 3. 1. f.
 succi rutæ. 3. 2. misce, fiat pessus, qui
 cum lana, vel æsipo supponatur.
 Vel. Myrrhæ, bdellii, styracis, an.
 3. 1. calaminthæ, abrotoni, absinthii.
 an. 3. 1. f. radicis acori, rad. rubiæ

tinctorū. an. 3. 1. feminis nigellæ, rutæ aridæ, baccarum lauri. an. 3. 2. sabinae. 3. 1. castorii. 3. f. redigantur singula in puluerem, & cum melle, aut triphera, aut mithridati antidoto quod faris est, formentur pessi.

Si menses supprimantur ex pituita valentioribus pellis ciendi sunt, vt theriacæ electæ. 3. f. castorii, ammoniaci. an. 3. 1. misce, & coto in mercurialis succo immerso excipe.

Vel Nigellæ, Astaphisagriae, centaurii minoris. an. 3. 1. veratri candidi, vitri friati, salis gemmæ, piperis nigri, diacrydii. an. 3. 1. aloes, ladanii galbani, herebinthinæ, styracis. an. 3. 1. f. ambaris. 3. f. omnia cū pistello calido misceantur, demum in panno lineo cum mercurialis succo immerso include. Vel.

[Theriacæ, mithridatidis aut opopa-

f ii

nacis. ʒ. i. castorii, ammoniaci. an. ʒ.
 i. succo mercurialis excipe in pes-
 culos. Si ex flaua bile.

Ex cuiuslibet pharmaci sequentis
 friamentis, pessulos conficere po-
 tes, aut ipsorum succo. Mercuri-
 alis, artemisiæ, sampsuchi, absin-
 thii, chamædrys, chamæpithyos suc-
 co. Pulueres sunt ex nitro, amo-
 mo, myrrha, aristolochia rotunda,
 calamo odorato, caryophyllis, ma-
 iorana. Eclegma ex succo rosarū
 cum saccharo in canulam immitti-
 tur, ut pessi solida formā recipiat, &
 pessus filo appesus & in locellos im-
 missus, filo fœmori alligatur.

Ex radicibus oleo tinctis concin-
 nantur pessi. Verbi causa: Ex radi-
 cibus Rubiæ passiuæ, flōmi, vtriuf-
 que maluæ, iridis, apii, acori.

Olea sunt, ex lilio, ex castorio, ex

succo cyrenaico, & ex costo. Pulue-
res quibus pessuli aspergendi sunt,
ex succo cyrenaico, costo, castorio,
euphorbio, myrrha, turpeto, scam-
monio, veratro cādido, sabina her-
ba, nigella, & galbano.

NIMIA MULIEBRIS EX
PURGATIO, HAEMOR-
rhagiāque locellorum,
& muliebri proflu-
uium.

Destillatio (quā *ῥευματισμὸν* græ-
ci nuncupant) est muliebriū locel-
lorum fluxus, vniuersi corporis ex-
purgati. Redundare menses in
mulieribus dicimus, quando vltra
consuetum tempus purgationis ma-
gnā copiā effluxerint. Tempus au-
tem vnicuique purgationi statū &
ordinatum non est, multis enim ad

Paulus
Aegineta

Fuchs.

f. iii

duos tréſve dies, haud paucis vſque
ad quintum profluit, aliis etiam ad
ſeptimum vſque, rarò ad duodeci-
mum purgatae ſunt.

Aegineta

CAVSAE, hæmorrhagiæ & flu-
xus muliebrium locellorum. Cæte-
rum immodicè & plus iuſtò expur-
gantur non rarò mulieres, interdū
quidem menſibus auctis, atque cu-
mulatius quàm par ſit, impetūque
procedētibz, interdum verò iniu-
ſtæ & integræ ætatis nouæ nuptæ
partubz. Nonnullæ magna quidē
ex parte ſua quoque ſponte ceſſant.
Continuè verò in ἐμβλῶσει for-
titer ſanguinis ſit profluuium, ita
quidem vt plerunque inferat peri-
culum, cauſæ fluxus muliebrium
locellorum.

Aegineta

Eiuſcemodi verò ideam ac ſpeci-
em præfert id quod euacuatur, cu-

huiusmodi est humor qui in corpore
redundat: Aliud rubrum quidem,
instar saniei, aquosive humoris, quē
ἰχθῦς græci vocant.

Alterum verò candidum à pitui-
ta proveniens, Aliud autem palli-
dum luridumque, aliud pirrocholō,
id est, amaræ bilis instar. Nonnū-
quam aqueum denique sanguinem
eiiciunt, quemadmodum in phle-
botomia aufertur atque procedit.

Animadvertere interim accuratissi-
mè oportet, ne qua anabrosis, id
est erosio in locellis enata consti-
terit, sit ob fracta, aut aperta vasa,
vel magna vel parva.

Possibile est si ora vasorum quæ
pertingūt ad vterum vltra modum
aperiantur, & si sanguis vel calidi-
or, vel tenuior fiat, & totum corpus
propter malum habitū aliquem ag-

Fuchs.

Gal.in.5:

Aph. 57.

si mēstrua

plura fiāt

&c.

f iiii

grauetur sanguine, & si modum natura conuenientem sua multitudine non excefferit, quare ipsum expellit ad venas quæ in vtero sunt, vt in fluxionibus accidit, alias ad aliam partem immodicas fieri menstruum euacuationes.

Opinio
Arabum.

Redundantibus humiditatibus ex venis opplētur locelli, quæ ex aliis sæpe membris in ipsos deferuntur, quos humores natura per vuluam eiicit: nam duæ venæ magnæ, caua scilicet & porta, in venulas tenuissimas plurimasque dispersæ locellos intrant à quibus nonnūquam diuturni succi, destillationis modo, interdum rubri, quandoque pallidi, sæpe etiam albi, aquosique interdum destillant. Quorum causa est, locellorum, iocinorisve, aut alicuius alterius membri, vel concoctri-

cis eorundē facultatis imbecillitas.

Causæ externæ sunt, percussio, Arabum, casus, vulnus, cursus, saltus, cibi sanguinem extenuantes, vel ipsum acutiorē vel ardentiorē facientes. Verbi causa, Aromata calida, Vini albi & clari potus.

Causæ internæ sunt locorum calor exuberans, sanguinis redundātia, facultas expultrix ualens, retentrice imbecilla.

NOTAE.

Notanda autem ac deprehendenda fluxus species est, ex perpetuo locorum madore, dissidentibus colore humoribus. Laborans autem plarumque solet pallefcere, cibum auersari, & mediam sustinere, in deambulationibus quoque spiritus difficultatem sentire, oculos insuper habere tumefcentes, interdum

Aegineta
de mulie-
bri pro-
fluio.

quidem cum dolore, interdum verò
citra dolorem, & id quidem vel cū
exhulceratione, vel absque exhul-
ceratione, siue vulua inflammante
sordide, siue pure.

Fuchsius.

Amplioribus vasis ruptis aut a-
pertis confertim sanguis profluit,
minoribus verò apertis, sensim, nec
magna copia promanat. Ab erosio-
ne si accidit, tum non solum pau-
latim, verum etiam cum maximo
dolore effluit. Porro quum im-
modicè promanant menses, color
foedus consequitur, pedes molli tu-
more attoluntur, corporis robur pro-
sternitur, vitiatur ciborum tum ap-
petitus tum concoctio.

PRAESA G I A.

s.aph.57

Si menstrua plura fiant, accidunt
morbi: & si non fiant, ex vtero mor

bi contingunt. Mulieri menses
decolores, nec per idem semper tē-
pus venientes, purgationem indi-
cant esse necessariam. Mensium
fluor redūdans iuuenibus molestif-
simus, senioribus autem vt pluri-
mū mortalī. Si longo tempo-
re fluxerint menses, tandem aquas
cutem subeuntes inducunt, & ani-
mam subinde agere cogunt.

5.aph. 39

In fluxu muliebri si conuulsio &
animi defectus aduenerit, malum.

5.aph. 56

Non confestim sanguinis impetū
localibus remediis reprimere conā-
dum: nam multa sequerentur in-
commoda, nempe hydrops, neruo-
rum, aut oris ventriculi, aut capitis
pathemata.

Fuchs.

VICTVS.

Aegineta
Fuchsius.

Chondrus lotus è posca, aut oryza, aut halica, cibi loco sunt adhibenda. Vino ita habentes abstinere expedit. Cibis & potionibus austeris & adstringentibus vtendū, Assis autem potius quàm elixis vescatur agra, carnibus potissimum, quibus suapte natura desiccandi facultas inest, vt auium mōtanarum, & agrestium animalium: motu verò abstinendum, & pro eo adstringenti potione vtendum. Lac in quo extincti sint lapides fluuiales candentes, aut ferrum ignitum, potui detur. Oryza, chondrus, portulaca hesitatur, rubi item furculi cum carniū iure decocti, brassicæ probe cocti, lens palustris ex aceto cocta.

Singulare præsidium in sequenti ferculo esse asserit Gaynerius.

Accipe folia plantaginis & flo-

res flommi, terito: his adde nonni-
gil radicis symphyti probè coctæ,
& fecerniculo traiectæ, parum item
casei recentis pinguitudine referti,
& pinguedinis renum caprarum,
aut arietis momētum, rapellumque,
dein pastæ nondum fermentatæ cū
luteis ouorū pistatæ, aut farinae te-
nuissimæ supradicta immisce, & in
iure carniū coquito, & ægrotæ ex-
hibeto. Assis carnibus vesca-
tur potiusquàm elixis, quæ infartiā-
tur rhoe, fructu oxyacanthæ, & aliis
vim sanguinem arcendi fluentem
habētibus. Nocent aromata, ma-
ximè crocus. Si ob vires ficulneas
vinum potui dare cogaris, esto ni-
grescens, vtcunque, adstringens,
crassum, aqua cælesti, aut aqua in
qua ferrum candens extinctum fue-
rit, aut puteali aqua dilutum. quie-

te fruatur. Somno indulgeat, gaudio non afficiatur nimio. Venerem fugiat. Aer esto temperatus, fructus maturi non adstringentes & calidi nocent. Potus nimius crapulâque obsunt.

CVRANDI RATIO.

Aegineta
de mulie
bri pro-
fluio.

In defectu verò & interualli spatium, habet enim circuitum nonnunquam, sed ulò vtendum fuerit gestationibus præstâtibus, diuersique generis deambulationibus, vociferationibus, vñtionibus, cucurbitulis, dropace vnguento, aut leuigationibus, frictionibus, vnguentis depilatoriis quæ psilothra dicuntur, sinegmate, sinapismis, vomitibus cum radiculis prouocatis, curatione recreandis defectibus restituendisque viribus facta, lauacris,

vinique omnifaria educatione &
alimento. In mensium
profluuiio nimio, neque balneis, ne-
que calefactionibus vtendum. Mē-
sium fluor ex repletionē, aut ex ma-
tritis humorum abundantia factus,
non est adstringendus, præsertim si
oculore tingatur assueto mulier, nisi
ipsius vires prosteruantur.

SANGVINIS MISSIO E VENA.

In rubro fluore primum, si ætas Fuchf.
& alia permiserint, ad sanguinis mis-
sionem vertimur. Ablationem ve-
rò sicut in iis qui sanguinem excre-
ant, partiri oportet, vt paulatim pro-
lixiori tempore auersio fiat. Se-
cunda verò si erit in cubito vena,
aperiatur vena axillaris.

Aegineta
de mulie
bri profl.

Hydromeli austerum, aut ompha-
comeli, Propinandum insuper in
posca balanstium, hypocystidis, siue
acaciæ cremor, aut lycium, aut sa-
mius aster, aut omphax aridus, aut
rheum quod rha quidam nuncupāt,
aut lentis in Italico vase fictili cre-
matae cinis, aut sesamum in posca
maceratum ad mollitiem vsque &
teneritatem manducandum. Ea
quoque quæ urinam cient porrigi-
to: ē quorū numero habetur aqua,
in qua elixa sint asarum & apium.
Ad hæc portulaca etiam mansa, at-
que succus eiusdem herbæ potus, ad
hunc modum affectis subuenit. Ba-
lanstium item rubique cum fructus
tum flos, & ea quæ inter quercum
& corticem suum interiacent, pren

ni membranofum, & id quod sub
exteriore glandis cortice contine-
tur. Hippuris potiffimè (quæ conus
ex cauda equina eft) rubeum fluxū
pota ex aqua aut vino, fiftit: aut hy-
pocystis, fructusque lentifci frictus
& in vino potus, Samius aſter, Len-
nium figillum, Coagulum lepori-
num, aut hædinum, aut agninum,
aut viulinum, aut ceruinum, gi-
garta id eſt acini, myrta, omphax
aridus, piceæ cortex, acacia, coral-
lium, lycium, galla, polyginum,
ſymphytum vtrumque, hæmatites,
calyces glandium, plantago, oxya-
cantha.

Cornu ceruinum cum acacia &
tragacanthæ lachryma maceratum
potui dato his quibus ex locellis hu-
mor defluit, ieiuno ore ventriculi.

Spica i. em nardus, lapis gypſeus,

g

cornu ceruinum vstum & rosacea
 lotum, rosea rubea, rhus coriaria,
 nymphaea semen & flos, haec sunt
 quorum in pollinem tenuissimum
 redactorum drachmam ex vino da-
 bis potui. Præterea hypocysti-
 dem, succinum, lachrymam arabi-
 cam, achilleæ succum concretum,
 glebam armeniacam, flores & se-
 mina cotoneorum, fidiam, balau-
 sium, malicorium, vniones, mum-
 miam, myrtorum fructus, libanum,
 iunci rotundi odorati florem, cine-
 rem testarum ouorum³, friato potui
 ex vino dato, friamenti picis naua-
 lis vncia cum succo plantaginis bi-
 bitur. Fimi caprilli drachma aqua
 caelesti macerata cōmodè bibitur.

Stercoris itē asinini pari pondere.
 Succus porri potus. Ferri & si ste-
 rilitem inducat, mensium tamen

fluorem compeffit.

Si albus fit fluor, medicamenta quoque crassos & pituitosos humores extenuantia, urinamque ducen-
tia bibantur, vt asarum, foeniculum, apium. &c.

aulus.

p

SIMPLICIA EX

PLINIO.

Pulegium ex melle & aceto men-
fes sistit. lib. 20. c. 14. Xenocrates
tradit rem miram, si vera est, men-
strua contineri vno die, si vnum gra-
num coriandri biberint foeminae,
biduo si duo, & totidē diebus quot
grana sumperint. lib. 20. c. 20.

Hippocrates menstrua fisti cibo
bliri putat. lib. 20. c. 22. Violæ al-
ba & lutea extenuant menstrua. lib.
21. c. 19. Nardum gallicum men-
strua sistere. lib. 21. c. 20. Leucanthe-
mum impositum. lib. 21. c. 22.

g ii

Heliochrysi folia trium obolorum
pondere in vino albo. lib. 21. c. 25.

Centumcapita herba mulierum
mensibus siue abundant, siue subfi-
dant. lib. 22. c. 8. Fex aceti. lib. 23. c.

1. Foliorum olearum succus expri-
mitur tuis, affuso vino & aqua coe-
lesti, siccatusque in pastillos dige-
itur. Sistit menses in lana ad motus
vulvæ. lib. 23. c. 3. Palma quæ fert

myrobalanum in vino austero. lib.

23. c. 5. Balauustum cytini floscu-
lus. lib. 23. c. 6. Ramenta ligni lotu

(quam fabam græcam nuncupant)
decocta in vino. lib. 24. c. 2. Gallæ

ciemata & aceto falso extincta, fo-
tu. lib. 24. c. 4. Ulmi folia, cortex &

rami illita. lib. 24. c. 8. Spina ara-
bica. lib. 24. c. 12. Rhannus candi-

dior in lacte bibitur. lib. 24. c. 14.

Dracunculus si ferro non attin-

gatur. lib. 24. c. 16. Menses nimios
sistit achillea imposita & decoctum
eius insidentibus. lib. 26. c. 15. I-
dea herba (quæ & oxymyrina dici-
tur) flos. libro. 27. c. 11. Leucogra-
phis. libro. 27. c. 11. Medii radix
drachmis duabus cum melle eclig-
ma & per aliquot dies sup. o. lib. 27.
c. 12. Succida lana imposita sub-
ditâque. lib. 29. c. 2. Quorum lu-
tea cocta, & ex vino pota. lib. 29. c. 3.
Ferri rubigo imposita velleribus.
lib. 34. c. 15. Misy. lib. 34. c. 12.

Sinopis quæ magis cæteris rubet,
pota denarii pondere, fœminarum
profluvia sistit. lib. 35. c. 7.

POTIONES COMPO-

SITAE ET SERAPIA.

Serapiū rosaceum. S. myrthinū.

g iii

Serapium mirabile & certum quo
frequenter mensium fluorem sistere
coegimus. Acci. fimi asinini suc-
cū quātum vis, & ex eo arte & igne
saccharoque serapium confice, pro-
pinabis ipsum myrthino serapio &
aquæ plātuginis mistum ad cubile.

Labri veneris succus aut friamē-
tū datur in ovo sorbili.

Si ex erosione, aut ulcere profluāt
menses, Sumito lapilli hematitis,
achilleæ succi concreti, quem san-
guinem draconis vocant, succinum,
corallii, balaustiorum, glebæ arme-
niacæ, terræ lemnia, seminis portu-
lacæ partes æquas, trita omnia se-
cerniculo traice, potui dato. ʒ. i. cū
succo, aut liquore stillatitio myrto-
rum aut plantaginis.

Si ex acuitate sanguinis aut alio
rum humorum menstrua defluant,

auxiliabuntur, Serapia ex cotoneis
S. myrthinum. S. rosaceum.

Pastilli ex succino. Pastilli ex o-
xyacantha. P. ex terra lemnia.

PVRGANTIA PER ALVVM.

Fluore albo infestante in prin- Fuchsius.
cipio quidem resistendum non est, Si ex pi-
vt aliena e corpore excernatur, ne- tuita.
que præter rationem erit, si quod
pituitam purgat medicamentum
adhibeas. Acci. Polypodii
querni, anisi, fœniculi, epithymi.
an. ʒ. ʒ. coquantur, in decocto ma-
cera horis decem corticis myroba-
lanorum, deinde cepulorum trita.
ʒ. i. colo traice & adde pulueris di-
aturpeti. ʒ. i. potui dato à cubili ie-
iunæ.

Eclegma aut rotula
g iiii

diacartami eadem efficit.

Si ex bile flaua, Eclegma ex
succo rosarum, Medulla cassiæ
fistularis, Rhabarbarum, Myro-
balani lutei accommodantur.

GLOBULI VORANDI

καταποτία.

Globuli ex bdellio maiores &
minores ex monumentis Mesuæ
Arabis, cuius portio esto .3. aut
sesquidrachmæ.

Fuchf. Accipe, Terræ lemnix, glebæ ar-
menix, thuris, mastiches, gallarum.
an. 3.2. succi achilleæ concreti, hæ-
matitis. an. 3.1. cornu cerui vsti 3.
1. hypocystidis, acaciæ, corallii ru-
bei. an. 3. 6. balaustum, rosarum

rubrarū. an. 3. 2. succini. 3. 1. cum se-
rapio myrrhino formetur catapotia,
de quibus. 3. 1. au. 3. 1. f. propinabi-
mus.

Mummie, thuris, mastiches, cor-
nu ceruini vsti & loti, an. 3. 1. coa-
guli leporini, aut hoedini. 3. 2. exci-
pantur in globulos succo polygo-
ni, quorum portio esto. 3. 2. Voren-
tur a cubili & ad cubile, prædatis
potes addere nonnihil caphuræ.

CONSTRICIONES.

Primum igitur atque præcipuum
est, vt membra ab alis & pube con-
stringantur, & extrema.

Aegineta

CVCVRBITVLAE.

Aegineta
5 Aph. 50

Cucurbitulae inanes spatiosae
plerumque sub mammis adglutina-
tae, tantum ut desideres in contra-
ria reuellunt.

Mulieri si velis menstrua cohi-
bere, cucurbitulam quam maximam
ad mammas appone.

Gal. in commentario inquit
melius non ad ipsas mammas, sed
sub ipsis partibus inferioribus firma-
re cucurbitulam, ubi maximae sunt
hae, quae ad ipsas venae de subter ve-
niunt.

ENCATHISMATA,

SIVE INSESSVS.

Aegineta

Eucathisma insuper illud his qui
sanguinis mensium eruptiones pa-
tiuntur apprimè conducit.

Oxyſchani quod est acuti ro-

tundi iunci odorati, capitis myrti,
foliorum rhanni, rosarum, virgul-
torum rubi tantundem coquens in
aqua, qua infidentibus muliebria
loca foeminis vtiliter fouentur.

Aliud. Sumantur corticis mali
punici dulcis, radicis myrti, corti-
cis cupressi, singulorum medinni
tres, gallæ, medinnus vnus, aquæ
quantum satis est.

Hippuris, lentisci, foliorum mo-
ri, foliorum pirorum, prunellorum,
sorbarum, mespilorum, symphyti,
corticum interiorum quercus, ro-
sarum, labri veneris. an. m. 2. sidia,
bistortæ, gallarum, fructuum myr-
ti. an. lib. 4. rad. vlni, radicem fili-
cis, mespilorum, & sorbarum, cali-
cis glandium. an. lib. 2. ex his om-
nibus cōfractis & decoctis in aqua
cælesti in cisterna capta, seu in a-

qua in officina fabri ferrarii hausta,
quantum sit satis, fiat infessus, in
quo infideat mulier mane ieiuna &
serò, saltem horam vnā.

SUFFITVS.

Si infessibus suffitus præferat, per
infundibulum fumum recipiat in
locellos, pannis tecta, sedens in se-
de perforata.

Acci. colophonix. 3. f. spodii. gle-
bæ armeniæ, papaueris nigri, hios-
cyami. an. 3. 2. parum trita in car-
bones ardentes iniiciantur.

Eadem facito ex blatta bizantina,
& ex symphito, fiant etiam suffitus
ex coriis, quæ e domo eiciunt sar-
tores calceorum coriariorum, & ex

gallis & ex viuaceis, dein præbe ex
eccligmatis nonnihil.

Si ex pituita mensium fluxus,
Fiat suffitus ex ladano, mastiche,
galla, menta sicca, galbulis cypres-
si, sampsucho. &c.

ECLEGMATA ET

PLACENTAE ROTV-

LAE QVE.

Conseruæ rosarum antiquæ. 3. 4. Ex Ara-
diacitonit. siue speciebus saccharo bibus.
conditi. 3. 4. vel diacodiõn concina
ti per quadras tantundem, coralli
rub. tenuissime triti. 3. 4. margarita-
rum, spodii, lap. hæmatitis, mu-
niæ. an. 3. f. condiantur omnia si-

mul saccharo sufficienti & serapio
ex malis cotoneis, quibus poteris
addere momentum ex bracteis au-
ri, confice eclegma, detur ex eo
manè & vespere pro qualibet por-
tione, quod castaneæ crassitudinē
æquet, per duas horas ante cibi sum-
ptionem, superbibâtque vini meri
cyathum. Vel,

Sumantur radices vtriusque sym-
phyti, coquantur, & pistello tendan-
tur, cribróque traiciantur. Eadem
facito ex plantaginis radice. Ex
traiectis radicibus sume. 3. 2. rad.
plantagi. 3. 1. f. sacchari libr. 1. sol-
uatur saccharum aqua caelesti ex
cisterna, aut liquore stillatitio plan-
taginis, in ea fricato hæmatitem
quousque rubescat, subinde lento
igne sensim coquantur, addendo
radices, concoctione probe facta

decocto perfrigerato immisce fria-
mentorum succi achilleæ concre-
ti, acaciæ, rhois obsoniorum, ter-
ræ lemnæ, succini, cornu ceruini
vsti & loti, an ʒ. i. margaritarum.
ʒ. 4. coralli rub. ʒ. i. f. spodii, lap.
hæmatitis, seminis apii. an. ʒ. 2. con-
cinna eclegma solidum sectum in
rotulas aut in quadras, vel si ma-
uis eclegma confice non solidum,
ex quo mane à cubili dato. ʒ. f. de-
inde bibat vini meri cyathum.

Hæc quidem exhibenda censeo
mulieribus, quæ sumere ea renuūt
quæ palato grata non sunt.

Si ex pituita, Exhibeto the-
riacam magnam, Dialibani.

Vel dato cochlear eclegmatis se-
quentis si prostratæ sint vires.

Acci. Conseruæ rosarum
antiquæ. ʒ. i. dialibani. ʒ. 2. con-

rub. 3. 1. margaritarum. 3. f. cymini
 & inter diu aceto macerati. 3. 1. f.
 mentæ siccæ. 3. 4. libani. 3. 2. spi-
 cæ indicæ. 3. 1. fiat mistura de auri-
 ta, detur crassitudo castaneæ à cu-
 bili.

EPITHEMATA ET CATAPLAS- MATA.

Foris autem egregiè subue-
 niunt epithemata, quæ adstrin-
 gendi & stipticandi naturam ha-
 bent, & ex dactylis palmæ coto-
 neisque cataplasmata, quæ ma-
 liconia continent, aut priuobalanii,
 aut rubi virgulta, aut folia lentisci,
 balaustium, acacia, hypocystis, gal-
 le parum, alumen. Sed omnium ma-

xime illud, taurinum glutinum, quā
taurocollā dicunt tantisper dum e-
liquefcat, & dissoluatur, postea mace-
ratur, deinde in linteolum pannū-
ve alium robustum emplastri mo-
re impingitur, & illinitur lumbis
affectæ. Vel,

Acc. Succī simphiti, succorum
plātaginis, pentaphylli, quinquener-
viæ. an. aceti parum, pannos duos in
talibus succis vnā mistis immerge,
quorum alter ab umbilico ad pu-
bem alter ossi sacro imponatur.

Frusta linteoli aceto electo dilue,
& vtriquæ mammæ admoue, subin-
de pubi & ossi sacro, aliquod vnguē-
torum impone.

b

...Vnde MORBVMVL...

VNGVENTA

Acc. Olei myrthini. 3. 4. olei ma-
stichini, succi plantaginis. an. 3. 2.
mastiches friata. 3. 2. rhus coria-
ria, hypocystidis, myrti fructus, terræ
lemniæ, glebæ armeniæ. an. 3. 3. f.
spodii, rosarum, an. 3. 1. hordei vsti. 3.
f. ceræ quātum sit satis pro cōcinnā
do vnguento, quo inungatur. etrum
& os sacrum.

Vnguentum comitisæ accom-
modatissimum est quod etiam in-
ceptum abortum inhibet, & colore
viribus destitutos renes refrigerat
robur addendo,

EMPLASTRA

Efficaciter quoque ac strennuē
admodum ad hoc faciunt emplastra
Aegineta etiam quæ glutinandi vim retinēt,
verbi causa, composito Icesii, Ice-

fios appellata, emplastrum atheniense, Meelinum indicū, atque id genus cætera. Vel,

Accipe Acaciae, hypocystidis, fidiae, terræ lemniae pastillorum ex succino, colophoniae. ā. ʒ. f. leuigato omnia & liquore stillatitio plātaginis excipito in emplastrum, quod bipartitum pubi & ossi sacro imponatur.

Vel, Mastiches, libani, mummiæ, succi achilleæ concreti. an. ʒ. i. friato, dein oui albugine mētæ que succo & artemisiæ excipito & emplastri modo utrinque admoueto.

Vel, Acc. Herbae pulicaris seminis vsti, aluminis, arrillorum immaturorum, glebæ armeniacæ, succi concreti achilleæ, radicis symphyti, fidiae, balaustiorum partes æquales terito, cribróque secernito, & in emplastrum oui albore excipito, dein

ossi sacro pubique imposito.

Anus nostrates fuliginem aut calcem friatam sumunt, & oleo myrtino ouique albore excipiunt in emplastrum pauco aceto addito, & praedictis duobus imponunt locis, sicque menses supprimunt, foetumque ne ab orsu pereat seruant.

PESSI.

Aegineta

Pessi quoque utiliter, vel plura alioqui vellera locis ipsis apponantur ex vino & oleo, siue rosaceo, siue melino, siue myrthino leuigata, Pessuli praeterea (sic enim $\pi\rho\acute{o}\delta\epsilon\tau\alpha$ interpretor) qui naturalibus foeminarum admouentur, muliebrium sanguinis eruptiones compescunt, ex hypocistidis succo concinnati, aut acacia cum manna aceto eliqua

i. Post hæc opis plurimum, & admiratione dignum confert auxiliū in eiusmodi profusione, spongia vino aut liquida pice irrigata & apposita, vel deusti ipsius cinis cum aceteto, poscave applicatus, pari etiam modo corticis suberis (qui græcè *φελος* appellatur) Italico vase testaceo cōbusti cinis. Ad sanguinis porrò eruptiones pessis vtitor, gallæ interaneum tritum, & thus irrigatum aqua apponito, aut cytinis, aut dulcia mala punicica consimiliter applicato, aut seminalem leuigatam. Cæterum compositionem ad eandem rem peridoneam ita contexere conuenit. Acc. aluminis fissilis, medullæ gallarum, succi acaciæ, mānæ, singulorū. 3. 4. ouorū affatorū putamina quatuor arida friātur, atque eliquescant in cremore plan-

h iii

taginis, atque tum misceantur. Quum autem vsus atquæ res ipsa monet & exigat, pello laneo excipiantur, & intingatur etiam in rosaceum, atque admoueantur.

Fuchf.

Acc. thuris, balaustiorum, gallarum. an. 3. 1. gummi arab. acaciæ, succini, cornu ceruini vsti. an. 3. 2. glebæ armeniacæ. 3. 2. singula redigantur in pollinem tenuissimum, & lana rosaceo intincta excepta, in mulieris pudendum immittantur.

Acc. triphera, micleta, athanasia. an. 3. 1. hypocyttidis, acaciæ, glebæ armeniacæ, succi achilleæ concreti, radicum symphyti maioris, plantaginis, gallarum, fidiæ. an. 3. 1. trita omnia in pessulos digerantur ex coto & immittantur succo adstringentium excepta. Vel,

Colophonix, caphura, scorix ferri

preparata, hoc est in pollinē tenuis-
simum redacta, & in aceto & rosa-
cea inter diu macerata, & cocta
vsque ad aceti & aqua absumptio-
nem. an. quantum vis, succo solani
excipe, & in pessulos digere.

Vel, Cornu ceruini vsti, acacia,
hypocystidis, glebæ armeniaca, mū-
mia, mastiches, gipsi, partes aquas
excipe sauo caprillo & concinna
pessulos. Ex pharmacis item
quibus emplastra concinnata sunt
potes pessulos condere.

Ex magnæ ranæ cinere pessulos
facias exceptos aceto, aut fimi asi-
nini succo.

METRANCHYTA.

Iam verò & per metranchyton Aegineta
instrumentum ad eam rem factum,

h iii

locellis succum plantaginis, aut ferreos, aut feminalis, aut strychni, aut perdicii, aut psyllii, aut hypocystidis, aut acaciæ infūdito, atque hæc eadē per lanā, aut digitū, aut malā organum, calamū inve in longitudinem formatum, vsque ad os vteri indantur, inferanturque. Et Andromis denique pastillus cum mettranchyto infusus cum prædictorum succorū aliquo, aut vino adstringente, efficax & presentaneū est remedium.

PORTANDA.

Aegra portet assidue iaspidem, Corneliū lapilū, sapphyrum, pilos dextræ auris asini, magnæ ranæ cinerem lineo panno inuolutū, Hircinē friatam in dextra manu.

HYSTERICA.

Suffocatio, ὤσφις πνίξ spi-
rationis ob vterum ablacio, Strāgu-
lacio vteri, Su focario matricis.

Strāgulatus vteri, in superiorem Aegineta
partem ascensus vuluæ est, in socie-
tatē afflictionis principes corporis
partes ducētis, veluti carotidas, cor,
panniculos cerebri, quos græci
μῦς ὤσφας dicunt.

CAVSAE.

Conuenit inter omnes medicos Gal. lib.
hunc affectum magna ex parte vi- 6. de lo-
dis euenire, idque maximè, si an- cis. aff.
tea probè purgarentur, ac parerent,
atque virorum concubitu gauderēt.
Quibus rebus omnibus priuatae,
quid probabilius excogitari quis

posset, quam quod ob retenta menstrua, vel semen cohibitum, huiusmodi mulieres vteri dispositionibus crucientur: siue eas apnæas (id est non spirationes) siue suffocationes quis vocauerit, siue etiam fortuna contractiones sint membris. Idque fortasse magis à semine contingere potest ut pote magnā vim obtinente: ut est enim mulieribus humidius, ita etiam frigidius, proinde ipsum excerni oportet, præsertim si naturaliter multo semine exuberat mulier. Id verò viris quoque euenire solet, quippè nō parua est horum differentia. Igitur vteri peruersiones eo quem diximus modo, ad suppressa sequuntur mēstrua, eas tamen ob hoc, accidentium quæ in animalis corpore apparent causas esse nequaquam putandum est: quippe quæ

communem habent causam, plenitudinem à suppressa menstruorum purgatione euenientem. Quæ verò citra peruersionem, aut menstruorum retentionem viduas molestant noxæ, hæc retentum semen euenire putantur.

Retenta menstrua & semen co- Actius.
hibitum statuosam quandam refrigerationem in vtero excitant, quæ subinde cordi & cerebro communicantur, contingit etiam refrigerato vtero, quo tēpore menstruæ purgationes effluunt, vel ob difficilem quēpiam abortum, vel vbi quis sanguinis eruptionem ab vtero repente sistere properauerit.

NOTAE.

Lib. 6. de
loc. aff.

Ego verò (inquit Galenus) multas vidi mulieres hystericas, alias quidem sine sensu immobiles iacere cum obscuro paruoque pulsu, adeo ut in quibusdam ne percipi quidem pulsus posset: alias sentientes quidem, & moueri potentes, absque integra ratione, sed tamen animi defectione, & difficili spiratione laborantes: alias etiam crura & brachia contrahentes. Ex quibus coniecturam feci multas esse vteri affectuum differentias, vel pro causæ efficientis magnitudine, vel pro specierum quarundam varietate inter se differentes.

Gal. de
loc. aff.

Quòd autem hos affectus excitandos retentum semen maiorem, mēstruum verò minorem vim obtineat, facile intelligitur ab his mulieribus, quibus quum non sint vi-

duæ purgationes supprimuntur: quâ-
uis enim pluribus infestentur acci-
dentibus, spiratione tamen non pri-
uantur, neque animi defectione, ne-
que aliis quoque accidentibus labo-
rare videntur. Præterea ex eo quod
sunt viduæ quædam, quæ licet æquæ
ut antea aut paulominus purgan-
tur, nihilominus similibus corripiun-
tur accidentibus. Quippe medicæ
quæ eas exquisitè tetigerunt, faten-
tur circa vterum notas quasdam ap-
parere. Nam ceruix eius inclinata
videtur, interdum quidem veluti
fursum retractus sit totus vterus, in-
terdum verò veluti ad latus traha-
tur, non veluti animal errabundū,
aliàs ad alium locum discurret in
mulieribus vterus, sed ab extensio-
ne retrahitur

Aegineta

Accidit autē languentibus immi-
 nēte quidem iam paroxysmo tardi-
 tas mentis, segnities, infirmitas cru-
 rum, pallor vultus, species luminum
 percrassa, in stante verò iā strangu-
 latione in somnum delatio quam
 κατὰφθοράν vocant, dementia, ca-
 talepsis sensuum sedis cum mutita-
 te, crurum contractio, deinde inci-
 piunt rubesceri genæ, & vultus uni-
 uersus plenus fit. Relaxationis verò
 tempore promanat quædam è mu-
 liebribus locellis humiditas ad ta-
 ctum, & borborygmus, hoc est ven-
 tris strepitus, & progreditur aliquod
 intestinum, & ipsa quoque vulva
 paululum flaccescit, & languescit,
 tum denique ad se redeunt, sensu-
 que recipiunt. Mouetur porrò
 morbus ille quodam circuitu, quem
 admodum & morbus comitialis,

fracta scilicet vulua, vel seminaria,
vel alia quapiam materia, aut mate-
ria in eadam marcida & putrefacta.

Arteriæ motu aspirationeque
priuata mulier manum vtero admo-
uet, vt vaporum ascensum inhibeat,
curua manet, astantium voces au-
dit, quamquam respondere non pos-
sit, colore, sensu, motuque orba mor-
tem gelidam præfert. Comitiali cor-
repta spumans os habet, contra vte-
ri stragulatu affecta: nō priuatur ta-
mē omni aspiratione vt in attonito.
Præter dicta præfocationem vteri
præcedunt cordis tremor, capitis do-
lor, seipsam alloquitur mulier, ali-
quando sitit, vultus, oculi & labra
quandoque rubore suffunduntur, o-
culis conuiuet, nec ipsos aperire po-
test, præsentit item aliquid ascen-
dere à pube per aluum & vmbilicū

vsque ad os ventriculi & stomachum, deinde dentibus stridet, stringit maxillas, quandoque manus, brachia & tibias mouet, animam demum egisse putares. Si ex femine corruptio scitur, quoniam à longo tempore non fuit, quamuis passim icta fuerit cupidinis sagittis, aut virgo est ferre iugum apta, vel mulier in delitiis otioseque viuens, quæ cereri temulentoque deo indulget, sobriis nymphis reiectis, atque sibi deest in quod eniciat tenera brachia collum. Huic obnoxia morbo, eorum quæ in morbi tempore audiuit, memor est, contra in comitiali.

PRAESAGIA.

Plures quidem relatæ & pristi-
 nae salubritati restitutæ sunt, non-
 nulla verò in ipso paroxysmo viã
 in mortem subito commutarunt:
 pulsibus quidem crebrescētibus ac
 densatis, inordinatimque diffusis,
 deinde & asphixia (id est nulla ve-
 narum pulsatione) sequuta, exiguo
 verò humore superficiem irroran-
 te, respicationem autem primum
 quidem ad nichilū redigente & ob-
 scurante, postea verò omnino ampu-
 tante. Cæterum hic languor hyeme
 atque autunno ingruit inuenibus
 procliuis ad libidinem, sterilibus, &
 potissimè si propter medicationem
 infocundæ fuerint, & aliis refrige-
 ratis.

Aegineta

Igitur prima species (hoc est in
 qua immobiles sine sensu iacent,
 cum obscuro paruoque pulsu) cuius

Gal. lib.
 6. de loca
 aff. c. 5.

Heraclides Ponticus in suo commentario mentionem fecit, multam exhibet de ortu suo ambiguitatem. Ait enim sub hac specie, neque pulsum, neque spirationem mulieris deprehendi posse: atque ob id dūtaxat non videri mortuam, quòd exiguum in mediis corporis partibus calorem haberet: ac astantes quoque medicos quæsiuisse ait, an nondum sit mortua. Rursus nonnulli Heraclide posteriores credentes seruari aliquid spirationis, quamuis ipsa nō appareat, carptæ lanæ flocculos coram naribus suspendi iubent, vt exacte deprehendatur, num spiritus aliquis inter spirandum tum intro, tum foras rursus deferatur. Sunt qui poculum aquæ plenum, ori ventriculi imponere præcipiunt quippe immotum omnino seruari humo

em aiunt, si tota perierit spiratio. itaque si omnes ita affectæ mulieres interiissent, simplex esset quæstio, quum uerò nonnullæ seruatæ videantur, geminam oriri quæstionem necesse est, inuestigantibus notis, tum dispositionem ob quam spirationis munus deperditur, tum vel magis, quomodo uiuere possint, quæ nihil omnino spirant. Quippe in cōfesso est, & spirationem à vita, & vitam à spiratione separari non posse, adeo ut uiuentē non spirare, & spirantem non uiuere sit impossibile. Atque hæc quæstio, quanquam superiore difficilior videtur, non est tamen perinde difficilis: quippe facile sustinebitur, si latebris inclusa animalia consideres, nulla apparēte in ipsis spirationis nota. Hoc enim cognito, perspectisque animalibus

ut pote frigidis, atque eo demon-
strato, quod maximus respirationis
usus est, ut intimus calor, & refri-
geratione & ventilatione seruetur:
haud ita difficile fuerit perpendere
exiguum illum calorem in ipsis de-
relictum, arteriarum cordisque offi-
cio conseruari, quæ actio à quibus-
dam medicis transpiratio, veluti ea
quæ à thoracis pulmonisque officio
prodit, respiratio vocatur. Itaque pe-
reunte ob vteri affectum spiratione,
quoniam vniuersum corpus refrige-
ratur, id enim manifestè videtur, fie-
ri potest, ut nulla prodeat ab ore spi-
ratio, quamuis ea quæ in arteriis fit,
nequaquam intercipiatur. Verùm
potest adeò esse exigua, ut sensum
omnino effugiat.

Si ex semine corrupto fiat, &
spuma ex ore destuat, imminet exi-

ium, demum vteri strangulatus
qualis qualis fit, exiit, nisi auxi-
um præbeatur. Quæ locellorum
præfocatione corripuntur si futue-
runt, facile vtero gerentes efficiun-
tur.

VICTVS.

Cibo interea & potu paucis ad- Fuchf.
modum contenta sit mulier, tota-
que victus ratio exsiccatoria sit, &
hæc ad accessiones proficiunt. Si ma-
lum diuturnum fuerit, non parum
etiam recta victus ratio opitulabi-
tur: nempe deambulationes matu-
tinæ, gestationesque vel in curru,
vel naui, vel iumento. A gestationis
motu vociferatio & lectio clara,
modulata, concinna utilis est. Vn-
ctio præterea, frictio & exercitatio

ex congruis interuallis repetita, eisdem conueniet, balneū aquæ dulcis rariùs, & non nisi fordium abstergendarum gratia adhibendum. Balneis verò naturalibus vti optimum est.

Aegineta Inclamet autem quispiam illis altiore horrendaque vociferatione, atque appellet & accerset: Si virgo sic nubat, & futuat.

Vinum nequaquam potui dato, quoniam aqua ipsis est accommodatior, nec carnes concoctu edat difficiles, neque his vescatur quæ semen augent genitale.

CVRANDI

ratio.

Anic. sen
41.3.

Vtendum censeo clystere, sanguinis missione, constrictione ex-

remorum membrorum, frictione,
odoramentis aluum cientibus, cu-
curbitulis, glādibus, cataplasmatibus,
sternutamentis, vomitionibus, po-
tionibus, infestibus, pessis, dropacif-
icis, rubrificationibus, acopis, exer-
citationibus, vociferatione, & la-
uacris.

CLYSTER ET GLAN-
des, Suppositoria
vocant.

Accessione protracta, & ea quæ ^{Aegrot.}
impeditus agunt sunt vtilia, cuiusmo-
di sunt sacculi dactilio, id est sedi
appositi: exempli gratia, cuminum
nitrum cum melle, & stercus cum
latione prolicere ac subducere, ne
torqueant in accumulatione sua.

¶ iiii

VENAE SECTIO.

Aegineta Cæterum ad vniuersi corporis i
staurationē à detractiōe sanguinis
auspicandum, præcipuè si menstrua
purgationes detineantur.

Imprimis secanda est vena axil
laris, subinde saphena, modò visci
di humores hunc morbum non ex
citarint. Si ex semine corrupto, ca
ue ne venam tangas.

POTVS.

Aegineta E castorio potione vtamur, quan
doque quidem cum decoctione ar
temisiæ, interdum verò cum aqua
mulsa. In quibusdam enim expedit
illud, atque vnicum ad exactam &
numeris omnibus absolutam cura
tionem satis est. Bibat decoctum

aut ius calamenti, aut mentastri, vel
rutæ, aut viticis. Dandum est casto-
rii. 3. i. singulis diebus vt dictum est,
vel cum vino tenui.

HVMORES NOXIOS.

subducentia.

Post septimum autem diem pur- Aegineta
gandum, quæ e colocynthide con-
texta sit hiera. Post sanguinis mis-
sionem ad expurgationem cum hic
ra proficiscere, deinde ex aloii con-
fectam picram porrigito. 3. i. cum a-
quæ mulsæ cyathis sex.

Catapotia ex Agarico voranda
sunt.

ECLEGMATA, PVL

ueres & confectiones

aliæ.

Diamarthæ, dicymini, diatri-
um pepereon potui dentur cum ra-
dicum aperientium decocto vel sac-
charo, excepta digerantur in rotulas
aut quadras, vel eclegmata confice.

CONSTRICIONES frictionesque.

Quocirca in paroxysmis extre-
mas corporis partes vincire oportet,
& tota crura fricare, atque vni-
uersum etiam corpus, perinde atque
eos qui animo defecerunt, reducere
& refociliare.

Alta voce vocetur, pedes manús-
que dolorosæ fricentur, tibiæ &
genu cum funiculis, & aliquando
coxæ super genu strictissime vinci-
antur. Cum aceto item & sale extre-
ma asperè fricentur,

ODORANDA.

Graue olentia odoramenta ol- Aegineta
factanda naribus admouere: verbi
causa, elychnium extinctum, casto-
rium, picem liquidam, cedriam, vel-
lera & lintea combusta: quidam ve-
rò amida quoque abhibuerunt è lo-
tio veteri, siue oleulo.

Accipe castorii, galbani in aceto so-
lutorum. an. ʒ. ʒ. sulphuris. ʒ. i. misce,
& naribus fumum recipiat mulier.

Par suffitus fiat ex asa, foetida,
sagapeno, ammoniaco, Animalium
plumæ in carbones iniice, ad suffi-
tum pertinent, præsertim perdicis,
capillorum hominis, canis & hirci
cappillorum, corium quod libet,
ungulæ brutorum, & quodcunque
cornu.

DE MORB. MUL.

SUFFITVS, LINI-

menta, & per metran-
chytum iniectiones.

Aegineta Atqui in vterum odoratissima
fragrantissimaque vnguenta infusa,
detrahere vuluā naturæ aptitudine
possunt: veluti amaracinum, mala-
bathrinum, spicaceum, irinum. Hæc
etiam obsterix digitis capiens vs-
que ad os vteri immittat, leniter ac
multum defricans, vt eo irritamen-
to crassus humor excernatur.

Aegra pannis testā, cauendo ne
fumus nares ipsius attingat, odora-
tissimis suffiatur: verbi gratia, lada-
no, alipta moschata, gallia moscha-
ta, cinnamomo, caryophyllis, xilo-
aloe, calamo odorato, casia, lauen-

dula, libano.

Vel,

Acc. moschi. ʒ. ʒ. galliæ moschatae.
3. 1. olei lilini ʒ. 2. misce in mortario,
hoc linimento vngat manus obste-
trix, & leniter os vteri fricet & ip-
sius interanea, tunc enim corruptus
exhibet humor, & prospera fruetur
valetudine mulier.

Vel, Acc. Pastillorum galliæ &
alipthæ moschatae. an. 3. 1. styracis. 3. 3. Fuchsius
caryophyll. maceris. an. 3. 1. agallochi,
ʒ. 2. cinnamomi, foliorum lauri. an.
3. 2. ladani. 3. 2. f. redactis singulis in
pollinem tenuissimum cum stacte,
styracem liquidam appellant, fiant
Trochisci, iniiciendi in carbones
pro suffite recipiendo per infudibu-
lum.

DE MORE. MVL.

RUBIFICATIONES & cataplasmata.

Aegineta Sinapi pedibus cataplasmatibus in-
star imponatur.

Nec inutiliter sinapismi & dro-
pacismi ex euphorbio, pyrrethro, pi-
pere & sinapi confecti applicatur.

STERNUTATIO.

Aegineta Porro quæ sternutationem pro-
ficiant, adhibenda sunt è castorio
videlicet & struthio (condisi barba-
ri vocant) lanariæve, & pipere tem-
rata.

VOMITIO.

Mali verò elapso acumine atque
insultu, ad vomendum cogito: om-
nes enim vomitus leuat, sed eas pre-
sertim quæ à cibo infestantur.

Aeginet

ENCATISMA

Neque inutile erit, si infestio-
nes ex decocto baccarum lauri fo-
liorumque, pulegii, calaminthæ,
artemisiæ, marrubii, sabine, althææ,
chamæmeli, serpilli, iridis, aristolo-
chiæ, & foenigreci parentur.

Fuchs.

ASPERGINES.

Infessionum tempore cerebri cu-
ram non omittemus, sed rosaceo &
aceto caput irrigabimus.

PESSI.

Aegineta Post septimum diem infestationibus & pessis molientibus ex adipe anserino, styrace, mastiche, ammoniaco & similibus confectis uti licebit. Vterusque etiam iis, quæ calefaciendi statumque educendi vim obtinent, suffiendus.

Menses suppressi si uteri præfoculationem genuerint, curato ut menses ciere possis.

PROCIDENTIA

uteri.

Fuchsius. Procidere uterum dicimus, quando ita euertitur, ut exterius emineat: neque enim uterus, ut imperiti suspicatur,

à suis solutis propaginibus totus decumbit, nam si ita procideret, restaurari minimè posset. Quòd si progressu temporis id quòd procidit putrescat, auferendum est ipsum citra omnem futuri periculi suspicionem: totam etenim vuluam ablata fuisse memorant putrefactā, & superstitem mansisse mulierem.

Aegineta

Si igitur prolapsa pars diuturnitate temporis propter incuriam putruerit, ob assiduamque vrinae irrigationem & sordem inhaerentem exulcerata fuerit, amputandum aut vrendum quod inutile fuerit, nullius meru periculi erit.

CAVSAE.

Procidit sanè foeminis vulua rariùs, sed plures ob causas, aut enim ex alto delabetur, & in coxendices

Aegineta

lz

quasi radices agit, ruptis membranulis quæ intestinum continent, aut vterum vicinis partibus connectunt, aut propter secundæ muliebres locellos ambientis sibi quæ adnatæ extractionem, quemadmodum in difficili partu contingit, aut ob inertem & imperitam foetus extractionem, aut propter sterilitatem, aut propter plagam vel ictum, aut immensi ponderis eleuationem, aut ob animales affectiones, puta amissionem liberorum, tristem scytalem aduersumque aliquod nuncium, aut hostium insultum, aut ob navigationem periculosa, aut aliquam id genus aliam causam, omni eo quod concretum est soluto, collapsa vulua, aut propter paralyfim, & imbecilitatem partium, quemadmodum in senescentibus, & deficientibus.

tibus frequenter accidit. Procidit
saepe ob humoris plurimi ac tenacis
defluxum, partiúmque frequentiam
laxatis ac solutis appendicibus, pro-
cidit autem secundum os eius ma-
ximè. Nonnulli verò vniuersum
vterum procidere affirmât, quod sa-
nè ineptum est, ne dicam absurdū.
Quo enim pacto reducta in suâ se-
dem collocaretur.

Fit etiam ob cursum velocem, aut
ob infessionem rei frigidaë, aut ob
diuturnam moram in aqua frigida,
aut ob gelidaë potum, vel ob tussim
vehementem, vel propter sternuta-
tionem, aut vociferationem, demū
ob mensium suppressionem, nonnū-
quam etiam ob tenesimum.

NOTAE.

Signa satis manifesta sunt, & cau-
sarum diuersitas facile de agrotan-

lz ii

tis aut affidentium sermonibus cognoscetur.

Arabe

Notæ internæ sunt, si sine locellorum strangulatu vterus ascendere exiatur, comite dolore ab umbilico ad os usque ventriculi, tactuque rotundum quicquam deprehenditur, putat interdum ægra se manu prehensam, ferèque tunc suffocata iacet, non sine gemitu. Adfunt vertigo, capitisque dolor, nausea, ructus, præsertim si flatus huius morbi sit parens.

Vbi vterus procidit, grauedo tumorque percipitur, quod si vir hanc futuendi gratia aggrediatur, genitali femini ad locellos interiores nullum patebit iter, & hæc accidunt si ad superna repat vterus: sin autem vterus ad ima descendat, dolent renes & pecten. In pectine rotundum

quid, tumens, graueque tactu percipitur. Intestinum nempe rectum sæpissime vesicæque ita comprimuntur, vt neque lotium, neque oletulum quoquomodo exire possit.

Quod si lotium emiserint, albescens & densum erit, in cuius sedimento hypostasis residebit liuens aut nigricans, arteriæ item motus erit mollis paruusque & inequalis.

Si ob neruorum, tendonum, aut ligaminum resolutionem is morbus euenerit, vel ob putrefactionem, procidet vterus insensibiliter indolorosæque vt plurimum, putris humor vbertim ex locellis destuet.

Sciscitari denique oportet, an mulier pituitosa desidiosæque diutius steterit, & si recentibus fructibus, aut piscibus assidue vescatur, Auic. 21. sique inter futuendum locelli humi

tertii.

lz iii

ditate scaturiant.

Accidentia porrò procidentis
uteri sunt, authore Auicenna, pe-
ctinis & ossis sacri vertebrarumque
dolor validus, quandoque febris a-
dest, supprimuntur & vrina & ole-
tulum. Adsunt item conuulsio, tre-
mor, timorque insolitus. Si nihil
rotundi in pectine percipiatur, his
quæ uteri procidentia laborant, to-
tum uterum procidisse signat.

PRAEDICTIONES.

In principio facile repositioni
paret, & rectè locatus perseuerat,
præsertim si ætas non impedierit.
Nam in prouectioribus uterus quî-
dem reponitur, sed rursus qualibet
leui causa relabitur. Si sursum ele-
uetur, aut ad latera tendat uterus,
facile curatur: Si extra os vuluæ exi-
erit, vix curabitur. Si à longo tem-

pore prociderit vterus, nūquam releuabitur. Si ex corruptis succis aut putrefactis ipsam connectentibus procidat vterus, curæ nulla danda est opera.

VICTVS.

Toto curationis tempore mulier Fuch. motum, & ea quæ sternutamēta excitant, euitet: vt autem naribus odoratissima sunt adhibenda, sic vterus ab infernis foetidis rebus susciendus est.

Vrina & stercoribus vacuatis ægram supinam figurare oportet, vt coxas habeat subliniores, poplites flexos, cruribus inuicem dilatatis ac diuaricatis, tūcque foueatur locus fomētis aptus. Extrinsecus autem pubem spongia in posca expressa operiemus. Mulier iacebit extēsis adaptatisque inuicē cruribus, vt

lz iiii

alterum alteri incumbat: tutius ta-
men erit pedes simul vinciri, fasci-
usque ad genua deducendo, deind
cucurbitæ infigendæ sunt. &c.

CLYSTERES.

Aegineta Oportet itaque in huiusmodi cu-
ratione stercus ante omnia clystera
euacuantes, & lotium excernentes
quo vndique ab omni anxietate li-
bera fit vulua, laborantem supinè
corpore componere, in altum pro-
tendentes coxendices & deustos
poplites, cum diuaticatis cruribus,
dein accipito systremma.

Venter leniendus, ne si cum dif-
ficultate sit egerendum, simul vte-
rus procidat: obseruandum tamen,
ne nimium venter subducatur, ex-
oluitur enim, relaxanturque propin-
quæ partes, & vteri loca procidunt:

Si ex flatu vterus procidat, iniicito
clysterem qui flatus discutiat, cui
nonnihil eclegmatis benedictæ ad-
datur.

VENAE SECTIO.

Si adfit plethoria, sanguinisque
detractione egeat ægra, modò dum-
taxat ad superna aut ad ilia repat v-
terus, tunc oppositi pedis saphena
secanda est: porrò si ad inferna des-
cendit vterus, axillaris aperienda
est.

SYSTEMMA, LA- na conuoluta.

Quum sita fuerit ægra, diuarica- Aegineta
tis (vt dixi) cruribus, accipito sy-
stremma ex lana, forma & crassitu-
dine sinui muliebri respondens, syn-
donéque illud circunvoluito, & in

cremorem acaciæ intingito, aut hy-
pocystidem vino in hunc vsum im-
mergito, subiicitóque vuluæ, & abs-
que violentia omne id quod proci-
dit sursum torqueto, dum solidus &
integer in sinu tumor excitetur, &
uterus in proprium reponatur locū.

Obstetrix item præcipitatum vte-
rum manu oleo mastichino intin-
cta in proprium reponatur locum.

CUCURBITVLAE.

Aegineta Reposito utero, mulieréque decubā-
te ita vt crus alterum alteri incum-
bat, post hæc cucurbitulæ sunt ad-
glutinandæ, cum flamma plurima
umbilico & vtrisque iliis seu lum-
Ex Arab, bis. Quòd si repat uterus in latus,
lateri opposito affigenda est cucur-
bitula magna sine scarificatione, cū
extremorum eiusdem lateris ligatu

his dolorem inferētibus, sicque quiescat ægra. Mammarum radicibus in vteri procidentia admouere cucurbitulam proderit.

OLFACIENDA.

Cum cucurbitulis odoramenta, Aegineta
item offerenda sunt perodora.

PVLVERES, INSES-

SVS ET FOTVS.

Cæterum tertio die lana finui imposita, mulier in vinum atrum & austerum descendat aliquantulum tepesfactum, siue in decoctione myrti, aut rotundi iunci odorati, rubi, malicorii. Post hæc autem imposita lana tollatur, & altera imponatur eodem madefacta medicamento.

Prolapsam vteri partē oleo tepido, Fuchs.

vel butyro, vel malua, althæa, foeniculi, nigraei, seminis lini, aut similium decocto fouentes, conuolutam laniam præparabimus, vt diximus in systemmate. Decocto foliorum lauri, mentastri, abrotoni, artemisiae & similium fomentatione calefacta vterus, subinde obstetrix gallinæ adipe manus innungat, vterus autem seminis cotoneorum mucilage inunctus tali inspergatur polle. R. Acaciae. ʒ. 2. myrti fructus, balaustiorum, rosarum rub. an. ʒ. 1. f. friato.

Vtero in propria sede reposito ægra sequenti decocto infideat.

R. Rosarum rub. myrti fructuum, rhoi coriariae, foliorum mespillorum, & cornorum, corticis querni, glandium, origani, saluiæ, rutæ, symphiti grandioris. an. m. 1. confracta in

qua coelesti coquantur, & in deco-
to per horam mulier infideat.

CATAPLASMATA.

Foris cataplasmata inspergentur
circa epigastrium, diaphœnicôn, sci-
licet ex farina hordei, aut lente &
corticibus mali grauati, cum oxy-
melite, atq; hæc denuo fiant vsque
ad exactam curationem.

CERATA ET EM-
plastra.

Cerata etiam ex mastiche, agal-
locho, ladano, thure, iunco odora-
to, acoro, nuce moschata, lachryma
arabica, tragacantha, & eiusmodi
medicamentis parata conueniunt.
Vel, R^x. Thuris, mastiches,
opopanacis, terebinthinæ, galbani,

Fuchsius.

DE MORB. MUL.

sagapeni, rhesinæ pini, stactes, colophonix. an. 3. 2. ceræ luteæ. 3. 3. concinna ceratū, quod corio extensum rotundo super fœmora à muliere deferatur. Vel, Rx.

Galbani. 3. f. galliæ moschatae. 3. 1. caryophyllorum. 3. f. confice ceratū utilissimum. Vel,

Rx. Ladani fordix expertis. 3. 1. f. thuris, mastiches. an. 3. f. agallochi, caryophyll. spicæ nardi & celticæ, ambaris. an. 3. 1. moschi. 3. f. confice ex omnibus oleo ex spica exceptis emplastrum rotundum, quod panno lineo admotum noctu & interdiu assidue deportetur.

VNGVENTA.

Inunctiones in pube fiant ex oleo lilino composito. Vel, Acci.

Olei nucū. 3. 3. seminis oxylapathi.
 1. thuris, mastiches, cornu cerui-
 i vsti, strobilorum vstorum. an. 3. 2.
 era excipe in vnguentum quo in-
 ungatur pubes. Vel, Rx.

Olei ex lilio. 3. f. mellis. 3. 2. pulueris
 sumini. 3. 1. parum omnia simul fer-
 nere finito, & hoc linimento illine
 pubem calidè, præsertim si ob flatus
 procidat vterus.

SUFFITVS.

Suffiatur vterus tauri aut bouis
 imo, colophonia, mastiche, laserpi-
 io, dictamno in aceto decocto, Hy-
 pocystide. Rx. Acacia, ossis fe-
 riæ, balaustiorum, gallarum, nucū
 cypressi, fructuum aut foliorū myr-
 ti. an. 3. f. mastiches, libani. an. 3. 3.
 aserpitii. 3. 1. ex his contritis coch-
 lear in carbones ignitos iniiciatur

& per infundibulum fumus vterum
intret mulieris ita vestibus tectæ,
quod vapor ad nares quoquomodo
peruenire non possit, subindē vte-
rus aliquo ex præscriptis fotu fove-
atur.

PESSVS.

Rx. Asæ foetidæ. ʒ. ʒ. mastiches. ʒ. ʒ.
feminis myrti, thuris, gallarum, gal-
bulorum cupressi. an. ʒ. ʒ. f. oleo myr-
thino excipe, & pessulum confice.

POTVS.

Si vterus ad latus repat, ore ven-
triculi ieiuno potui detur ex mero
vino calido cochlear friamenti se-
quentis. Rx. Florum & bacca-
rum lauri, cornu ceruini vsti. an. ʒ. ʒ.
fructuum myrti. ʒ. ʒ. lenigato.
Vel, Acci. Aristolochiæ rotun-
dæ. ʒ. ʒ. dato ex vino.

Si vterus ad exteriora procidat, à balneo aut ab infessu propinato positionem sequentem. R̄. Rutæ, artemisiæ. an. m. f. terenda trita simul feruere parum finito in vino, adde nonnihil confectionis mithridatidis, potui dato.

MOLA. *μύλη* Vteri induratus est tumor, interdum quidem iuxta locellorum ostium, quandoque verò per vniuersam eorundem molem apparens, ad tactum fere lapidosus. Gallis, vng amast.

In mulieribus molæ in vtero gestatio: Ita verò appellant informem carnem.

In mulieris vnius vtero, quas appellant molas, ea est caro informis, inanima, ferri ictum & aciem respuens: mouetur, sistitque men-

Aegineta

Gal, de
morbuscu
randis, li-
bro. 14.

Plinius
lib. 7. c. 15

DE MORB. MUL.

ses, & ut partus, aliâs letalis, aliâs
vnâ senescens, aliquando aluo cita-
tiore excidens. Simile quiddam &
viris in ventre gignitur, quod vo-
cant scirron, sicut oppio capitonî
prætorio viro.

Aegineta Sunt porrò qui molam asserant
carnem esse informem in ipsis lo-
cellorum tunicis consistentem, &
quod abortione editur, quemad-
modum foetus, quæ embrya dicunt.

CAVSAE.

Plinius Molas gigni putant, vbi mulier
lib. 10. c. non ex mare, verùm ex semetipfa
64. tantum conceperit, ideo nec ani-
mari, quia non sit ex duobus: al-
tricemque habere per se vitâ illam,
que satis arboribusque contingat.

Fit à feminis muliebris, & plu-

rimi sanguinis menstrui in vtero
retentione & affluxu, quem calor
immodicus cogit, ac in carnis for-
mam transmutat.

NOTAE.

A locellorum mole lapidosus tu- Aegineta
mor cum diuulsione contractioné-
que superiacētium particularum &
hypochondriorum, & gracilentia,
palloréque, & cibi horrore, mensi-
um retentione, & mammarum tu-
more, tanquam suspicionem con-
ceptionis in quibusdam ab initio
statim inducunt, postea verò tēpo-
re discernuntur: molem enim pun-
ctionis sensum inferens dolor sub-
sequitur, nec in ea motus vllus, si-
cut in conceptione percipitur. Nō-
nullæ verò aquæ inter cutis suspi-

cionem præferunt. Caterum hoc ex
tumoris duritia dignoscendum, nec
sicut in hydropse manus aut digito-
rum impulsui cedat, & ex eo quòd
sonitus non redditur dum digitis
pulsatur, timpani modo.

Ex arab.

Mola & imprægnatio conueni-
unt, quòd in vtraque supprimuntur
menses, tumescit aluus mouetur-
que, mammae tumescunt, vertigo
& oculorum hebetudo sequitur, cor-
dis tremor adest, nausea & cibi in-
appetentia cum succorum variorum
vomitione, cutis defœdatur ei quæ
mola correpta est, palpebrae molles-
cunt, oculi cauantur, pupillæ gra-
cilescunt, toruos habet oculos.

Vix tandem ab vtero gerente di-
stinguitur quæ mola laborat, dis-
crimina tamen sequentia te certio-
rem reddent. Mensibus debitum

Ordinem servantibus vtero gerens
fit mulier, aliquando mola laborans
etiam. Intra trimestrem mouetur
mola in locellis, contrà foetus in lo-
cellis vtero gerentis.

Molâ cytissime tumescit aluus,
Foetus dextrorsum sinistrorsumque
mouetur, contrà mola nisi compri-
matur, aut mulieris motu excite-
tur, non mouetur.

In mola durior tactu aluus per-
cipitur, quàm in foetus gestatione.

Pragnans agilior est, quàm mo-
lam gerens.

Quamquam in mola aluus tu-
mescat, non tamen semper mam-
mæ tumescunt: molliores enim &
graciliores efficiuntur, quàm in vte-
ro gerente. Aequaliter mollescunt
maxillæ, manus pedesque in mo-
la, contrà in pragnante.

Vtero gerens parit saltem in vñ-
decimo mense, molâ vero laborans
sæpe in. 14. etiam interdum in. 4. an-
no aut quinto. &c. In hydrope pe-
des tumescunt, contrâ in mola.

Molæ motus est ab alto ad infer-
num.

PRÆSAGIA.

Acgineta Mola in quibusdam re vera in
hyderum transit ob iocinoris refri-
gerationem.

Nonnumquam verò incurabilis
magna ex parte morbus nascitur,
quibusdam sanè sanguis quoque ef-
fertur. Mola omnis & pauci
& multi temporis vix curatur.

Humorosa difficilius curatur quâ
flatuosa, porrò carnosâ difficillimè.

Molæ symptomata colicæ paria es-
se putantur. Mola innumeros
aberrare medicos coëgit.

VICTVS.

Primum omnium alimenta boni Aegineta
succu offerenda, ac vini potione vtē
dum moderata. mulier motu non
vtatur vehementi, is enim fluxio-
nem commouet: sed gestationibus
& deambulationibus, pedes etiam
decumbendo elatiores habeat.

Communis igitur decubitus ip-
sis in domo minimē ampla & opa-
ca confert, & modicē refrigerante
circa lectum immobilem: sublimio-
ra sint quæ pedes earum in quiete
fulciunt. Efficax quippē ad prouo-
candum omnem fluxum motio.

Sex rerum non naturalium tem-
peries esto calefaciens & hume-
ctans.

REGVLAE CVRANDI

l iiii

Aegineta

Tumores quidem duritiâsque e
ratione quâ in scirrhis vteri sclero
matîsque medebimur: sed aquo
sas parenchyfes, per ea quæ de hy
deris dicemus.

Eruptiones item sanguinis vuluæ
perinde atque fluxiones sanguini
alias, fluxumque curabimus.

Corpore vacuato cataplasmata
fomenta, infeffiones, pefsi, vnguen
ta, & cerata quæ relaxandi vires
habent, adhibenda, & ea quæ fœ
tum mortuum & fecûdas trahunt.
Humor concoquendus perinde at
que in menftruorum fuppreffione
ex pituita dictum eft. Euacuandus
item.

VENAE SECTIO.

Principio in plenitudine venæ
tubiti incidenda.

PVRGATIO PER

aluum.

Sanguine misso fiat purgatio per
catapotia foetida.

POTVS.

Acci. Hyperici, sabinæ, mentastri,
vtriუსque calaminthæ, smyrini, ar-
temisiæ, rubiæ passiua, pulegii. an.
m. f. anisi, foeniculi, schoenianthi,
seminis dauci & oreoselini, calami
odorati, galangæ. an. 3. i. acori, rha-
phani gallici. an. 3. i. aceti. 3. 3. mell.
lib. 1. fiat decoctio, cuius portio. 3. 4.
detur cum. 3. 2. pastillorum sequen-
tium.

Rx.

Cinnamomi, myrrhæ. an. 3. i. & 3.
i. f. rutæ, sabinæ, calamenti, pule-
gii siccatorum, rad. rubiæ, sagape-
ni, opopanacis. an. 3. f. cardamomi,
seminis iuniperi, mentastri. an. 3. 2.
cōfice ex his friatis pastillos pōd. 3. 2.

DE MORB. MVL.
INSESSVS ET
Balneæ.

Acci. Althææ rad. folia, caulis &
florum. m. 3. maluæ, branchæ vrsina
perdicii, chamæmeli, fertulæ campa
næ. an. m. 1. fœnigræci & seminis li
ni. an. lib. 1. confracta coquantur, &
decocto infideat agra, tenendo sac
culum super plenum his quæ deco
cta fuere.

VNGVENTA, CERATA
& emplastra.

A balneo os sacrû & pubes hoc vng
uento inungantur. quod R. Ol
amgdal. dulcium. 3. 1. f. olei lili
ni, adipis gallinæ, mucilaginis, se
minis lini & fœnigræci. an. 3. f. cera
albæ parum, confice vnguentum.
Gerata quæ vires relaxandi habent
adhibenda, qualia sunt quæ ex al

hæa, malua, chamæmelo, meliloto,
ænogræco, semine lini & similibus
parantur. Conueniet in hunc vsum
vnguentum dialthææ, aut empla- Fuchf.
strum de meliloto, diachylon fim-
plex admouere. Vel hoc,

Olei amygdal. dulc. 3. 3. liliacei. 3.
2. f. pinguedinis anseris, & gallinæ.
an. 3. 1. f. mucositatis seminis lini,
foenigræci. an. 3. 2. ammoniaci, bdel-
lii. an. 3. 2. rad. althææ, feminum ni-
gellæ, dauci. an. 3. 2. ceræ, quod satis
est, fiat vnguentum, gummi disso-
lutis prius in vino.

Inunctiones item & emplastra
fiant ex oleo rutaceo, oleo benedi-
cto, oleo ex castor. & aliis oleis cali-
dis.

Vtile erit vnguentum agrippæ, si
flatibus vterus sit infarctus.

CONFECTIONES.

Acci. Diacumini, diagalangæ, di-
 cinnamomi. an. 3. f. diambaris. 3.
 dialacca. 3. f. cinnamomi electi, hy-
 perici, calami odorati, perpen-
 rad. acori, seminis anisi. an. 3. 1. se-
 minis rutæ, zingiberis, artemisia
 marrubii, dictanni, saluiæ. an. 3. f.
 sacchari. 3. 6. solvatur saccharum ar-
 temisiæ & hyperici succo, fiat con-
 fectio in morsulis ponderantibus. 3.
 2. aut tres, detur morsellus quoti-
 die à cubili.

Post inunctionem rotulam sequē-
 tis confectionis comedat, deinde
 bibat momentum vini in quo dilu-
 tum sit asarum. R.

Cinnamomi. 3. 1. casia, aristolo-
 chia rotundæ, corticis casia fistu-
 laris, an. 3. 4. asari, lacca, ruthæ syl-
 uestris, seminis sabinae, croci. an. 3.

IONES. . facchari. ʒ. ʒ. liquetur faccharum
osmarini succo & rotulas concin-
na pond. ʒ. 2.

PESSI.

Pessi quoque subiiciendi ex bu-
tyro, adipe porcino, medulla cerui-
na, passulis, caricis, seminibus lini
& foenigræci confecti.

Acci. Rad. asari, acori, rubiæ tin-
ctorum. an. ʒ. 2. seminum rutæ, ni-
gellæ. an. ʒ. ʒ. maioranæ, nucis my-
risticæ, caryophyll. baccarum lauri.
an. ʒ. ʒ. fabinæ. ʒ. ʒ. castorii, euphor-
bii. an. ʒ. ʒ. Redigantur singula in
puluerem tenuissimum, & cum te-
rebinthina chesina formentur pessi.

Vel,

Rx.

Asphalthi, nitri, castorii, centaurii
grandioris, dictanni, veratri candi-

DE MORB. MUL.

di, galbani, gentianæ, opopanacis,
fabinæ, sagapeni, scammonii. an.
f. omnia friata porri succo excipia-
tur & in petiam raram indatur, di-
gerantur in pestos, qui immissi fili-
cruribus suspendantur.

SUFFITVS.

Suffiatur vterus vngula equi aut
asini, & omnia tandem fiant quæ in
mensibus suppressis descripta sunt.

Mirificè etiam confert vti bal-
neis naturalibus, potissimum si ma-
lum diuturnum fuerit.

INFLATIO VTERI

quam græci ἐμπνευµα-

τωσις dicunt.

CAVSAE.

Inflatur uterus frigiditate, aut
corruptione, aut incommodo partu
stiole connuente, sanguinéque in
exiguos globulos concreto, in eo-
dem cunei modo obstructo, quan-
doque sanè in concavitate locula-
menti sinuosi flatibus relictis, non-
numquam verò in laxationibus to-
tius corporis vuluæ.

Affidua comestio ciborum qui
flatus gignunt, vt raporum, casta-
nearum, panis filiginei. &c.

NOTAE.

Hanc comitatur tumor pectinis, Aegineta
atque ventris circa vmbilicum hy-
pogastrii appellati, cum duritia &
dolore punctuoso, vsque ad septum
transuersum, & stomachum, & in-
guen pertingente ac transeunte: &

ad digitorum pulsationem sonitus
tympani instar editur.

A tympanite discrimen habet,
quòd agrotæ hoc flatu correptæ nō
ita siti præmuntur, neque corporis
supernæ partes sensim liquantur, ut
in tympanite aquarum cutem sub-
euntium genere.

Adsunt ructus, & flatus per os
exeunt, qui has leuant.

PRAEDICTIONES.

Flatus in cauo locellorum sinu
contentus facilius discuti digerique
potest, quàm ille qui in angulis ip-
sorum consistit.

At qui locellorum villis & substā-
tiæ hæret difficillimè curatur.

NUTRICATIVS.

Quæ flatus gignunt cibaria vitāda,

comedenda autem sunt quæ status
discutiunt.

CLYSTERES

Clysteres conficito ex his quæ
status discutiunt, cum hiera picra
galeni.

VENAE SECTIO.

Medendum itaque, primò qui-
dem detractione sanguinis, si nihil
impedimento sit.

PVRGATIO PER aluum.

Inueterata autē affectione picra Aegineta
purgandum atque hiera.

Hieram archigenis exhibeto cum
decocto eorū quæ status discutiunt.

IRRIGATIONES ET epithemata.

Mox circa paroxismos inedia & Aeg net.
irrigationibus ex oleo rataceo fa-
ctis medendum. Epithemata præte-

m

DE MORB. MVL.

rea quæ emolliendi potētia regnāt,
puta polyarchium & diaspermaton
& diadaphnidon, applicanda sunt.

Vel, Filtrum nouum ferueat
in aqua cum cineribus, & aniso &
maratero, & calidum imponatur pu
bi & ossi sacro, sudorem prouocan-
do. Decoctiones sunt ex perdi-
cio, ruta, absinthio, artemisia, hedera
terrestri, abrotono, nepita, foliis viti-
cis, origano, calamēto, pulegio, sam-
psucho, thymo, serpyllo, ex quibus
etiam potiones propinabis.

INSESSVS.

Aegineta

Lucathismatis medendum ex de-
cocto rutæ, pulegii, artemisiæ, casia
& id genus aliis. Fiant etiam in-
sessus ex herbis calefacientibus &
siccantibus, & seminibus flatus dis-
cutientibus.

CATAPLASMATA.

Cataplasmatibus item vtendum,
quæ ex feminibus, apio, cymino, fœ-
niculo, aniso, ameos, hordacea fari-
na conficiuntur.

CUCURBITVLAE.

Cucurbitulis quoque leuibus in- Aegineta
anibûsque, & incisa cute scalpello
vtere. Cucurbitulæ (inquit A-
uice.) ignitæ sine scarificatione ma-
trici regioni admouendæ sunt.

OBSTETRICIS MV-
nus.

Cæterum obstetrix digitum an- Aegineta
tea illitum inferens, incumben-
tem sanguinem in frustula conglo-
batum si assequatur, auferat clemen-
ter ipsum resoluens, deinde rursus
cataplasmatibus modo imponenda, fi-
cus, nitrum & absinthium.

DE MORB. MVL.

PER METRANCHY-

tum iniicienda.

Origani, foliorum viticis, rutæ.
an. m. f. carei, anisi, ameos. an. ʒ. f. co-
quito in olei & vini. an. lib. ʒ. ferueat
vsque ad consumptionem vini, in
colamento solue hieræpicæ. ʒ. f.
& iniice. Hiera archigenis pari mo-
do iniicienda est.

PESSVLI.

Aegineta

Pessuli denique ex ruta, melle,
nitroque formentur, cum primis au-
tem ille accommodatus est qui fa-
berrime è ficuum pinguium con-
cussarū. ʒ. ʒ. cimini. ʒ. 2. spumæ nitri.
ʒ. ʒ. concinnatur, sed propter acrimo-
niam in lacte prius macerentur.

Pessuli postremò cuncti, qui emol-
liendi virtutem habent, ad eam pro-
uinciam sunt perquam idonei.

Acc. bdellii. ʒ. ʒ. f. xylobalsami, car-

CHY. opobalsami, costi. an. 3. r. origani, cy-
mini. an. 3. f. confice pessulos cum
oleo nardino & rutaceo, qui nocte
integra in locellis persistant.

PLACENTAE MOR-
fuli, & eclegmata.

Vtila sunt, Dianison, Diacymini,
hierarchicalogod, diacalaminthæ, Dia-
permatum, Diamarthæ, Diacucur-
mæ. Detur drachma vna eclegma-
tum aut placentarum prædictarum
ieiunæ ex decocto radicum aperien-
tiū & seminū status discutientium.

Rx. Specierum diacucurmæ, spe-
cierum diacumini. an. 3. 3. sacchari
albi lib. f. liquetur saccharum suc-
rutæ limpidiori, & in morculos dige-
rito, à balneo exhibeatur vnus mor-
culus cum vino tenui meracissimo;
in quo dilutum sit asarum.

POTVS.

m iij

Acc. malorum perficorum nucle-
os viginti, pistillo tunde cum ouo-
rum duobus luteis, quibus adde ga-
lagæ, cinnamomi, piperis longi, zin-
giberis, caryophyll. croci, nucis my-
risticæ. an. obolum vnum, adde de-
num saccharū & vinū tenue mera-
cissimū, feruere paulum omnia fini-
to, & calidum mulieri propinato.

IN VNCTIONES.

Inungendus aluus est oleis fla-
tus discutiētibus, puta oleo liliaceo
& rutaceo.

EMPLASTRA.

Acc. bdellii, gummi āmoniāci, an.
3. 1. feminis viticis, centaurii, abroto-
ni, origani, calamenti, casia, ameos,
an. 3. 2. terebinthinæ quātum sit fa-
tis, fiant duo emplastra, quorum al-
terum admoueatur ossi sacro, alterū
pubi.

SUFFITVS.

Suffiatur ladano, myrrha, gallia
moschata, & euphorbio.

INFLAMMATIO.
locellorum.

CAVSÆ.

Phlegmone vteri è pluribus sa- ^{Aegina}
nè causis originem trahit. E plaga
namq; ietive, ac mensium suppres-
sione, à frigore item & inflatione,
neq; minus etiam abortione, pariter
& ex partu propter malam foeturā.
Gignitur item vlceratione, concu-
bitu metas rationis excedente, sel-
læ nimis duræ in sessione, longissima
intentissimāq; deambulatione, sæpe
& transpiratione ob frigus prohibi-
ta. Ex sanguine demū, pituita, bi-
li flaua & atra gigni potest.

m iiii

NOTAE.

Gal.lib. Inflammatio in vulua est, quæ f
 definiti, cum dolore vētris inguinūque i
 qua cum febribus accidit sincipiti
 dolor, & oculorum cruciatus. Ab
 scessus autem in vulua est, quum do
 lor intensus est, pulsus fiunt, crucia
 Aegineta tus ad ingnina vsque & lumbos per
 tendit, febres accedunt. Comitatur
 autem locellorum inflammationē,
 pubis & lumborum dolor, febris a-
 cuta, dolor capitis & radices oculo-
 rum & cervicis, volæque seu iunctu-
 rarum, manuum & digitorum, nec-
 non colli conuulsio & inclinatio in
 contraria, affectionesque stomachi
 quæ per consensum exuscitantur,
 osculi matricis suffocatio, pulsus par-
 ui & densi. Et siquidē obscurior fue-
 rit inflāmatio, haud valide sanē, aut
 crudeli dolore vuluam afficit: sin ve

ro strēnue & fortiter inflammetur,
tum & ipsa quoque ab omni parte
quāta quāta est, pulsatoriē dolet.

Tota quidem inflammata, per totā
pariter ipsam, partē verò modo in-
flammatione affecta, iuxta hanc po-
tissimū significatur. Posteriore quip-
pe ipsius particula phlegmone infe-
stata, dolor circa lumbos excruciat,
scybalū hoc est stercus specie oleti
canini, in angustum redactō atque
oppressio recto intestino, moratur.

Partibus verò prioribus inflamma-
tis, dolor circa pectinē, vrinæque sti-
licidium, aut lotii difficultas oritur,
stricta atque in arctū redacta vesica.
Si autem latus locellorum inflama-
tione tentetur, non tam bubo-
nes intenduntur, quā crura etiā
aggrauantur. Quod si pygma, hoc
est posterior vteri pars inflametur,

partes vmbilico circumiacētes dolore potissimum cum tumore molēve infestantur. Vbi autē circa osculum inflammatio occuparit, graui laequentes secundum omnem ventris partem vmbilico finitimam, quam epigastrium græcè appellant, dolore afficiuntur, digitóque immisso atq; impresso durē ac grauiter subfident ostiolum atque succumbit. Si ex

Arabes.

sanguine lingua nigrescit, sequitur delirium, vrina rubēs, aut subrubēs est cum liuore, arteriæ motus magnus, plenus & vndosus, oculi citrii mali corticē colore referunt cū aliqua rubedine, venæ omnes tumēt.

Gal. de
arte cura
tiua ad
glauco-
nem.

Prima igitur inflammationis differentia secundum quam hanc quidem humidam, hanc verò siccam. Humidam quidē quæ ex calida fluxione membrum occupante con-

tingit: siccā verò quando nullo humore influente calor naturalis effervescit, hoc autem usque ad aliquid quidem veluti febris est membri. &c. Nam fluente sanguine altera flava bile altera, ambobusque simul humoribus, alia tertia. Et quidē in earum singulis vel iam putruit id quod influxit, aut in membro constrictū putrescit, & vel crassum est, vel tenue, & vel optimum, vel acre. Vide cætera lib. 2. artis curatiuæ ad glauconem.

Omnino eius fluxus, qui inflammationem efficit, vel flauæ bilis est, vel atræ, vel pituitæ.

Significat verò verbum inflammari, velut si per vri, succēdi, ignisque proditum sit.

Si ex pituita inflammatio, pituitosi succi notæ adsunt. Si ex bili atræ aut

Gal. lib.
2. de crisi
bus. c. 12.
Gal. in. 1.
aph. 30.
Ilia salu
berrima.

flaua, propriis notis deprehendes.

PRAEDICATIONES.

Auicē,

Apostemata vteri ex quacūque oriatur materia difficillime curatur, si in imo locellorū cauore aut profundo abscessus sit, aut inflammatio, vt plurimum nunquam curatur.

Acutorum morborum albo locello rum abscessus, aut inflammatio depingenda est, diebus etenim decretoriis iudicatur. Omnis inflam-

Arab.

matio, aut abscessus, aut resoluitur, aut per halitū dissipatur, aut in scirrū transit, quo fit si tumor discutiatur symptomāque quiescāt, inflammationis aut abscessus resolutionē propediem futuram signant, quòd si in pus desinat inflammatio, dolor pulsatilis & cætera symptomata sensim

augebuntur. Cæterum si pus exierit leue, album, æquale, ac boni odoris, bonum, si autem varium in colore fuerit, & diuersum in substantia cum tetro odore, animam aget propediem ægra.

Pus optimum est, si cædidum, leueque & quamminimè foetidū est, ^{2. predicti-} ^{tionum} maximè verò contrarium huic deterrimum est. 46.

Ex inflammatione & abscessu gi gnuntur sæpe scirrhus, cancer, rimæ vteri. In inflammatione aut abscessu locellorum, si percipias sudorem gelidum, vocis amputationem, animi deliquium, scito morituram actutū ægram. Maior inflammatio minore deterior. Vrinæ aut alui fluor in inflammatione bonus est.

VICTVS.

Aegineta Cibi quoque commendatur ab-
 stinentia per vniuersum triduū, me-
 dendum verò chondro ex melicra-
 to, aut pane, aut ouorum sotbitio-
 ne tertio die. In declinatione por-
 rò vteri victus ratio principio qui-
 dem tenuis, facta autem morbi rela-
 xatione pauca.

Fuchs. Aegram in domicilio obscuro,
 & moderatè tepido collocabimus,
 quietem imperantes, ac crura eius
 ab omni motione prohibentes, de-
 inde artus & extrema fricabimus.
 In cibo qui quantitate modicus sit
 vtatur ægra ptisanæ cremore, & ouis
 sorbilibus. Potus sit decoctum cin-
 namomi aut hordei. Vescatur iu-
 re pulli, à triplice malua, cremore
 hordei & hauenæ.

Aegineta **VENAE SECTIO.**
 Post abstinentiā triduanā, secta

vena cubiti, sanguis (nisi quid impe-
 diat) detrahendus est. In principio
 itaq; curationē aggressi, si neq; ætas
 neq; habitus corporis, neq; ani tem-
 pus obstiterint, neq; inflāmatio post
 abortū aut immēsam sanguinis eua-
 cuationē superuenerit, venā popli-
 tis secabimus ex Gale. decreto, quī
 in lib. de curādi ratione per venæ
 sectionē, inflāmatōnēve vteri à ve-
 nis in crure sectis iuvari scribit.

Fuchsius

Incipiendū à venæ axilaris inci-
 sione, postridie ambæ saphenæ secā-
 dæ sunt, aut altera ipsarum.

Arab.

SERAPIA & POTVS.

Serapiū violaceum, zulapia con-
 ficiātur ex refrigerantium herbarū
 decocto, aut liquore ipsarum stilla-
 titio.

DE MORB. MYL.

PURGATIO.

Per aluum subducendus humor
qui morbum genuit, casia fistulari
daetilis indicis (quos thamachindo
vocant) māna, fructuum cordialium
decocto. &c.

FOTVS.

In curatione itaque ante omnia
Aegineta quidem irrigatione ex cœnelæo, siue
œnorhodino semine tenuis & circa
ilia seu lumbos vtēdum, per obstru-
ctiones ē lana pura absque illigatio-
ne confectas.

CATAPLASMATA.

Aegineta Quinto autem die cataplasma
imponatur ex polline, semine lini,
fœnogræco, mulso maceratis com-
positum: capita quoq; papauerum
decocta sorbeantur, & ex oleo eade
applicentur. Si autem inflāmatiō

erysipelatosa existens, calefactiones
molestè ferat, illisque magis irrite-
tur fertulā cāpanā in passo elixans,
atq; conterens, adiucito ouorū cocto
rū putamina cū rosaceo, aut meli-
no, aut croceo, cataplasmatisque mo-
do applicato, aut palmularum dacty-
los vino temperato coquens, cū te-
nuissimo farinae polline leuigato, &
cum quopiam vngvine, factoque ca-
taplasmate impone.

CERATA, EMPLASTRA & inunctiones.

In inflammationis aut abscessus
aggressu emplastra epigastrio & vm Arab.
bilico admoueantur, confecta ex ro-
sis, lentibus reiecto cortice, balau-
stis, plātagine, mucositate herbæ
pulicaris, solano, labro veneris, sedo,

n

ramento cucurbitæ fatiux, santalis
fructibus adstringentibus, quæ om
nia aut similia excipiantur hordea
cea farina, & oleo rosaceo, ol. myr
thino, ouique albumine.

In vigore inflātionis, aut post
septimum diem acopa adstringent
bus misceatur, puta, lini seminis po
len & fœnigræci, farina volatilis,
chamamelū & ipsius oleū, rosaceū,
violaceū, & ouorū lutea. Vel tunc
imponere emplastrū Haly, quod R. fa
rinæ hordei & fabarum, malux, vio
larum, an. ʒ. f. caphuræ. ʒ. f. diluan
tur omnia & macerētur liquore stil
latitio aut succo corianni & labri
veneris, confice emplastrum addita
cera. Dolore sedato pubi & pecti
ni impone emplastrum sequens.
R. Chamæmeli, fertulæ campanæ,
rad. althææ, seminis lini, fœnigræci,

an. 3. 1. caricarū pinguiū . 8. numero,
 dactylos sex, friantur terenda, & o-
 uorum luteis quinque excipiantur,
 quibus adde violarū decoctum cū
 rosaceo, cōcinna emplastrum quod
 sedabit dolores, molliendo matu-
 randóque.

Malo remittente cerota nardina, *Aegineta*
 aut cyprina inferenda adglutinan-
 da est,

Cæterum aduersus ardentiores *Aegineta*
 inflānationes, ēplastrū *διακυλῶν*
 in diplomate vase cū rosacei lique-
 factione commisce cremorem plan-
 taginis, aut fereos, aut cichorii, aut
 intybi, vel si mauis sequente vtere,
 constante adipe anserino suilóve re-
 cente, pondo. 3. 4. cerota rosacea, aut
 fusina pondo. 3. 2. ouorum assatorū
 lecythis pondo. 3. 1. croco, pondo 3. 1.
 myrrha pondo triobuli, opii obolis

n ii

DE MORB. MYL.

duobus, vel opii loco capilis papaveris
 uerum decocto. In declinationibus
 bus matricis quas *πρεγκλίσεις* vocant,
 secundum paroxysmos quidam
 perinde atque inflammationibus
 medelis succurrendum. Verum in
 quietis tēpore & remissionibus morbi
 vehementioribus mollificatiuis
 sed inueteratis, cum his quæ assimi-
 landi virtutem obtinent, foris au-
 tem duritia existente, malagmatis
 utendum, puta eo quod ē fertula cā-
 pana cōficitur, *διαμελυνώτων* ap-
 pellatur, necnon malagmate man-
 sei & trefii, nigro serapionis, aut py-
 rina.

INSESSVS.

Cæterum per omnem medicatio-
 nem encathismatis quoq; ex deco-
 ctione foenigræci aut seminis lini,

maluæ, artemisiæ & oleo concinna-
is vtendum : at qui in his quæ hæc
non sustinent, ex calida aqua eius-
dem qualitatis rosaceo infuso fiant.

At vbi inflāmatio declinare cœ-
perit, ad ea veniemus, quæ quadan-
tenus, remittendi discutiendique vi-
res habent, ægrotam igitur in foeni-
græci, althææ, seminis lini, maluæ,
interdū artemisiæ, marrubii & sal-
uiæ decoctæ vsque ad lumbos sede-
re iubebimus.

DILVTIONES PER metranchytum.

Cæterum si ægra nodum solue-
rit herculeum iniice decoctū sequēs
in locellos in morbi aggressu.

Acc. ros. rub. lentium cortice reie-
cto, plantaginis, labri veneris, sola-

n iii

ni, endiuia, an. m. i. coquito ad fer-
tias, & cum metranchyto in locel-
los proiice huius decocti. 3. 6. tepido
vel R. decocti gallarum, balauftio-
rum, lentiū cortice exutarū, rhus c-
riariae, rofarū & seminis myrti. 3. 6.
iniice cum metranchito. Virgi-
nem porrò infidere facito decocto
dictorum & dicendorum, quæ cum
metranchyto in corruptæ vterū im-
mittenda sunt. Secundo demum
aut tertio die addes chamæmelum
semen lini & fœnigræci.

In morbi vigore fume maluæ, al-
thææ, chamæmeli, fertulæ cāpanæ,
fœnigræci, semi. lini. an. m. i. caricas.
20. coquātur, decoctum in vterū ini-
ce, vel ex ipso fiāt encathismata, aut
cataplasmata. In inflātionis vte-
ri inflātionē. R. sampsuchi, aut si-
sym. 3. 4. olei liliacei, aut de inula 3.

iniice. Vel ℞. liquoris stillatitii, fi-
lymbrii aut sampsuchi. ʒ. ʒ. pingue-
dinis galinæ, aut anseris. ʒ. ʒ. stactes,
galbani. an. ʒ. ʒ. olei liliacei. ʒ. ʒ. mista
iniice. Vel ℞. liquoris stillatitii
sampsuchi. ʒ. ʒ. medullæ cruris vitu-
li, pinguedinis gallinæ. an. ʒ. ʒ. sta-
ctes, ʒ. ʒ. ladanii. ʒ. ʒ. liquantur vnâ
& iniiciantur.

PESSI.

Pessi præterea, enchymatismi que Aegineta
sumendi sunt, ex hyssopo nempe &
butyro, medullâque ceruina, necnō
adipe anserino, & vnguento susino,
& cera lyrrhynica, in his quæ calidi-
tatem ferre nequeunt, aureus etiam
quem vocant pessulus conuenit, &
enneapharmacum, sed quæ ne hæc
quidē sustinere possunt, his ex ouo
& rosaceo, adipēque anserino seu

n iiii

DE MORB. MUL.

galinaceo cōficiātur. Quòd si vehemētissimus ac nimius infestet dolor succi papaueris lentis quātitatē cū lacte muliebri, & succo fœnigræci, ad subiiciendum in velere pessul modo porrige. Porro ad eas quibus duritia ac scirrhus cōiūctus est inflammationes, medicamentum rosaceo dissoluens, vel modo iam dicto subiice, vel infunde. Vel R^x. ladani. 3. 6. styracis, galbani. an. 3. 1. pinguedinis anseris. 3. 2. fiat pessus.

VNGVENTA.

Vnguantur hypogastrium & os sacrum oleo chamæmelino, rosacco violaceo.

EPITHEMATA.

Primis morbi diebus tale pubi

& ossi sacro imponendum est epi-
thema. R. succi plantaginis, succi
solani. an. lib. f. aceti. ʒ. i. sanguinis
draconis, glebæ armenia, a. ʒ. f. mi-
sc. prædictis addere potes oleum ro-
faceum, succū labri veneris, sedi, en-
diuiæ, quibus calidis diluere potes
petias, & eas madefactas dictis locis
imponere.

VOMITIO.

In incremento vomitus ciendus Arab,
est.

ABSCESSVS.

Abscessus dicitur foris impetētia.
De abscessibus vide Gal. lib. 2. artis
curatiuæ ad glauconem. Absces-
sus est mutatio corporis ex inflāma-
tione in materiam purulentam.

NOTAE.

Postquā inflammatio matricis ma-
 Aeginet, turuit, inque abscessum trāsit exi-
 que, intendi signa quæ memorauimus videas, ad hæc indicia quāquā
 inconstanter cū horrore proferunt
 sese, principio quidem intensis cum
 doloribus, postremò verò ad suppu-
 rationē perducto apostemate, impe-
 tus aliquantulū remittitur. Cæterū
 in eo quo disrumpitur tēpore, cru-
 ciatus sæpenumero acriores stimu-
 losē & quasi cū aculeis incidere vi-
 dētur, calorēque vehemētiore mo-
 lestant, atq; nōnunquā quidem vri-
 na supprimitur, interdum verò ole-
 tum, facto iuxta affectam vteri par-
 tem impedimēto, aliquādo verò tu-
 mor circa pubē apparet, & tanquā
 clydasmi sensus. Quū abscessus
 grandior fuerit, hoc verò in obuiis,
 quasque ad manus locis dioptris-

mo instrumento aut digitorum attactu deprehenditur, unde etiam dolores acerbiores infestare ob nervosū ipsius oris consueverunt. Quod si igitur id quod in fundo atque secū dum sinū dolore magis vacat, & digitorū attactu tumor minimè succūbit, ostiorū verò matricis gracilius videtur, ei quæ statim aut paulo ante inducta est suppuratio, cataplasmatibus sequentibus vtitor.

PRAEDICTIONES.

Prognostica lege lib. 3. crisium Gal. cap. 9. Gal. & 24. prædictionum lib. sententiā. 34. Qui tenuem crudamque. &c.

VICTVS.

Victus esto, vti earum quæ vteri inflammatione laborant.

CATAPLASMA.

Aegineta Cataplasmatibus ex fœnogræco, semine lini, hordeaceo autriticea farina, admixtis interim ipsis ficibus elixis, opitulandum aliquando etiâ colubæ stercore.

INSESSVS.

Aegineta Encathismatis præterea uti in inflammatione iugiter utendum.

PESSI.

Pessuli itē quum ita se res lāguētis habet, ex resina terebinthina, myrrha, hyssopo atq; butyro concinati laudantur.

RVPTO VTERI APO-
stemate, facienda.

Dum pus cōficitur, dolores ac fe-
bres accidunt magis, quàm iam cō-
fecto. 2. aph. 47. Gal. Si pus (inquit
Gal.) ex sanguine ortū habet qui fe-
minalē, vt quispiam dixerit, habet
transmutationē, nam mala simpli-
citer cum putrefactione fit olida, si-
cuti quæ simpliciter optima est ipsa
nutritio partium animalis: at quæ
pus generat mediū inter has obti-
net locū, neque à solo calore extra
naturam, neq; à solo secundū mate-
riam facta. Mixtus enim quodam-
modo ex vtrisque est calor inflam-
mationis. Fit autem dolor extenta
simul, ac calefacta præter naturā in-
flammata particula. Febres verò se-
quuntur principio calefacto, & hæc
ambo contingunt ex quadā veluti
ebullitione sanguinis, qui vbi ex to-
to exustus fuerit, residuū eius fit pus

quēadmodū ex lignorū exustione cinis: atq; ideo tēpore illo dolores sedātur, ac febres, præsertim quū pus fuerit excretū, vt pote iā consumpta materia, extincta autem ignea caliditate.

Aegineta Perlege cōmētariū Galeni in. 2. prædictionū Hipocratis, sententiā. 46. Pus optimum. &c.

POTVS.

Rupto porrò abscessū, siquidem pus in vesicam deferatur, quod scitur ex puræ vrinæ misto, lactipotatibus vtendum, cucumerisq; semen potandum. Potanda item sunt decoctum hordei, &. 4. seminū refrigerantium communium maiorū mucillago, serapiūmque violaceum.

CLYSTERES.

Si in intestinum rectum pus cō-
fringatur, lentium, corticūque
malorum punicorū elixatione col-
luendum.

Vel ʀx. Decocti hordei, libro pri-
mo duo lutea ouorū, olei rosacei. ʒ.
ʒ. mellis rosacei, ʒ. ʀ. fiat clyster.

PER METRANCHY-
tum iniicienda in vterum.

At si apostema sinū versus, quē
græci κόλπον nuncupant, ruptum
destuat, siquidē pus immistū purū-
que existat, rosaceum infundito, aut
amygdali cortice exuti atq; dealba-
ti oleū, aut tetrapharmacum regale,
recens denique butyrum, ferū ca-
caprillū melli rosaceo mistū inii-
ciantur. Vel ʀx. Hyssopi, absin-
thii an. m. ʀ. vini albi, lactis, an. lib.
ʀ. mellis rosacei. ʒ. 4. coquito ad ter-
tias, & decocti. ʒ. 6. iniicio.

Sed ubi sanies, aquosusve sanguis
quem græcè ἰχθῆρα dicūt, erupe-
rit, quemadmodum ex ulcere pas-
cendo repētē noma, maiorem tunc
constringendi stipticandique vim
immitendum enæma habeat, expe-
dit: id autem fiet, si ex myrtis, pal-
mularum dactylis, lenticulæque cō-
ponatur. Vel. R.

Arnoglossi, folani an. m. i. coquan-
tur, cuius decocti sume. 3. 4. lactis. 3.
2. albuginem vniū ouī, rudiculæ
motu misceantur & iniiciantur.

QVOMODO MANV medendum.

Quum autem in muliebrium lo-
cellorum ore natum apostema fue-
rit, neque illud confringatur post-
quam extenuaueris circū iacentia
puri corpora, ad puris excretionem

chirurgica manu vtamur.

EXVLCERATIO LO- cellorum.

CAVSAE.

Exulceratur subinde vulua mu- Aegineta
lierum, vel ob difficultatem partus,
vel embryulciam, vel corruptionem
ex medicamentis acribus, vel ex
fluxu, vel ex ruptis denique absces-
sibus.

Causæ vlcерum quæ in vulua ser- Gal.lib.
definitio
punt, interdum abscessus, nonnum-
quam etiam pessus, id est casus vel
callus corruptus, tabidusve, aliquā-
do in vulua durities aut varix.

NOTAE.

Si in promptu quidem & expedi- Aegineta
ta fuerit exulceratio, per dioptrismū
deprehenditur: at si ex profunditate
ab excrementis, liquidum namque

excernitur & diuersum: Inflammato quidem vlcere exiguum, sanguinolentum, aut feculentum cum ingenti dolore. Si sordidius fuerit vlcus, & ichores, cum minore negotio atque labore, at si depascendo serpat, teterrimi odoris fluxū emittit atrūque, nec sine doloribus vehementioribus, aliisque quæ inflammationem subesse insinuant indicis est. Diarethrisimus ad chalaistica medicamēta, sed ad contrariacuphismus. Mundo autem existente humor exiguus, leuis & æqualis, insipidus, crassus, albicans, cum facilitate quadam promanat.

PER METRANCHY-
tum iniicienda.

Aegineta Inflammato quidē vlcere, eis quæ
superius ad inflammationem con-

ducere docuimus, remediis vtēdū.

Quum sordidum fuerit ptisanæ cremore, adiecto melle, colluendū, siue tetrapharmaco, cum susino, siue mulso in quo elixa sint fœnum-græcum, aut malua, aut furfures, aut lens deniq; pelle detracta. Cæterum quo exactius ad viuum, vt aiunt, expurgetur, etiam marrubium, aut eruum, siue mel, admista erui farina, aut iri, aut alumine rotundo, vel non absimile quiddam immitte.

Si noma fuerit cum inflammatione, immittendus succus plantaginis, strychnii, seminalis, fereos, primitus quidem per se, deinde verò cum vino austero, siue aceto.

Noma verò citra inflammationē vrgente, immittenda sunt efficaciora: exempli gratia, decoctum mali corii, rosarum, thaliæ, cupressi, ma-

lorum cotoneorum, rubi, myrtorū,
 lentisci arboris virgultorū, rhu quo
 vtuntur coriarii, è vino stipante,
 postremó verò aluminis quoq; & a-
 caciæ, lycii, hypocystidisque elixatio,
 Porrò ex iisdem decoctionibus in-
 fessus etiam constituatur. Quòd si
 nichil proficiatur, primò quidem
 compositionem è charta immitte,
 deinde verò acetum, aut antheram,
 aut chalcitam, aut atramentum su-
 torium, quæ liquoribus dysentericis
 quoque congruunt.

In exulcerationes vteri principio
 immittēda sunt quæ vlcus mundāt
 & abstergunt, deinde exsiccantia; &
 demū quæ carnem deperditam re-
 cuperant deterguntque vlcera locel-
 lorum, vtile erit hydromeli iniectū
 cum iridis absinthii & mellis deco-
 cto, aut agrimonix, vel mel rosaceū

cum hordei decocto.

Quòd si vlcus in locellorū profun-
do infideat, cum putrefactione aut
corruptione, Acci. vini albi. lib.
℥. aluminis vsti, viridis æris. an. 3. ℥.
macerentur tribus horis ante inie-
ctionem, in incremento.

Decoctum balauftiorum, sidia, gal-
larum, aluminis & agrimonie inii-
ciatur. Si vlcus comitetur venarū
erosio, Asclepiadis succus concre-
tus, myrrha, thus, gleba armenia,
crocus, & aristolochia friantur, & li-
quore stillatio plantaginis & rosa-
cea diluta immittantur.

SARCOTICA IMMIT- tenda.

Acci. lactis vaccini. 3. 6. thuris, aloes,
myrrhæ, glebæ armenie, sarcocollæ
corticis cannæ vsti, cineris cucur-

o iii

bitæ vstæ. an. ʒ. f. friato terenda, hu-
 ius semuncia ramenti lacti prædicto
 immisce, & iniice tepidè quotidie à
 cubili & ad cubile. Tandem si pus
 multum defluat, ter aut quater in-
 terdiu iniice sequentem confe-
 ctionem, quæ accipit Cerussæ, li-
 thargyri, sanguinis drac. glebæ ar-
 meniacæ, lachrymæ arabicæ. an. ʒ.
 1. fracta in olei rosacei. ʒ. 6. & lactis
 lib. 3. fiat ebullitio ad tertias, cuius
 colo traiecti ʒ. 6. iniice in locellos,
 prædictis addere potes ceræ luteæ.
 ʒ. 2.

VNGVENTA.

Acci. Lithargyri, cerussæ, sarco-
 collæ. an. ʒ. f. excipiantur sufficienti
 quantitate rosacei olei & ceræ.

Quod si vlcus sordidum fuerit, ad-
 des nonnihil rubiginis æris.

Iisdem porrò ipsis extrinsecus quo-

que cataplasmatibus modo vlcera illi-
nito, quæ in sordido vlcere dicta sũt
à chirurgis, mulso tufis & macera-
tis. Mundato vlcere, Acci.tuthiæ
ablutæ partes duas, cadmiæ argenti,
sarcocollæ.an.partem vnā in pol-
linem tenuissimum redacta excipe
in vnguentum addita pauca cera.

P E S S I.

Peculiaris proximum sordido vl-
ceri opitulatur medicamentum.
Crocus optimus leuigatur lacte mu-
liebri, deinde cerata rosacea exci-
pitur cū adipe anserino, floccoque
illinitur. Exquisitius autem fuerit,
industriūque magis, atque ad in-
gentes dolores competens illud:
Capita papaueris in passo diluto ir-
rigantur per triduum, mox deco-
quũtur vsque ad subactionem, dein-
de teruntur foliorū rosarum.3. quin-

o iiii

que croci. 3. 3. admixta capitum pa-
 paueris elixatione, postea macerās
 perfundito cū rosaceo, ceræque. 3. 3.
 & illiniens rosaceo in pefso subiice
 Cōfert verò & id quod ex ouis cro-
 cóque, ac rosaceo, adipe anserino,
 medulláque ceruina cōtexitur. Nec
 non Aegypta sine rubigine ad vteri
 vlcera mirificè cōducit. Noma ve-
 rò vbi fuerit cum inflammatione
 quidem panis tepida maceratus, &
 tritus, ex hydromelite, oleo, althæa,
 fœnogræco, palmularumque dacty-
 lis pinguibus cataplasmatibus modo
 illiniendus est.

EMPLASTRA.

Aegineta Expurgato vlcere foris epigastrio
 atque coxendicibus emplastrū nul-
 lam cicatricem inducens imponen-
 dum. Quemadmodum enim ca-
 taplasmatum, ita & emplastrorum

potentia per abditos & obscuros
transfertur meatus.

VENAE SECTIO.

In vlcerum locellorum principio
mittatur sanguis ex vena axillari,
perendie autem ex saphena, iudicio
oculati medici.

Arab.

NUTRICATIVS.

Alimenti porrò perexiguum mi-
nistrato, expurgato verò iam vlce-
re, lauare crebrius, alere item, & vi-
num præbere, quo incarnatio fiat,
oculus expedit.

Aegineta

PRAEDICTIONES.

Quanto altius in locellis insiderit
vlcus, præsertim si vteri substantiæ,
hæreat, tanto exitius. Si id quod
ex vlcere profluit spissum est, bono
est, maxime si tunc leuetur æger.

Virus, & succorum crudorum redundans fluxus, sordidi vlceris ac putridi indicio est. Facilius curatur in puellis, & ætate florentibus, quàm in senio confectis. Si huiusmodi vlcus probè curatum non fuerit, vt plurimum, in aquas cutem subeuntes desinit.

ABSCESSVS VTERI
pituitosus, οἰδημα, œdema.

CAVSAE.

Aegræ victus fuit pituitosus, puta, hesitauit fructus recentes, piscésque, & reliquos cibos pituitam gignent. &c.

NOTAE.

Tumet epigastrium cum ponderositate & paucò dolore, temperies

corporis pituitosa est, cum oscita-
tione assidua & pandiculatione, an-
i temperies & victus pituitosus, æ-
as item. &c. accidentium remissio.

CVRANDIRATIO.

Victus esto qui pituitam extermi-
net, & arceat. Potiones & pharma-
ca exhibeantur, quæ pituitam pro-
fligandi vim habeant. Non utaris
repellentibus neque refrigeranti-
bus, quoniam ex ipsis sclerosus red-
deretur abscessus: sed digerentibus
incidentibusque, & euacuantibus pi-
tuita, crassosque succos. Emplastra
calida cōcinentur ex dissoluētibus
& concoquentibus, disuicientibus-
que.

INIICIENDA CVM

metranchyto.

Immitte decoctum fertulæ campa-

næ, chamæmeli, sabinae, origani, an-
temisiae, foenigraci, seminis lini, cu-
immisce axungiam gallinae, anatis
& coturnicis, oleumque lilinum &
nardinum, & iniice.

In primis, hoc est in morbi aggre-
su. Acci. Lycii, thuris, aloës, cype-
ri, acaciae, croci ammoniaci. an. 3. f.
quæ omnia brassicae succo diluta co-
paucio aceto iniice.

Si abscessus resoluendus sit, in vi-
gore & inclinatione sequentia iniice.

Aluminis, sulphuris, myrrhae, salis.
an. 3. f. rosacei .3. 3. paucio aceto
excepta iniice. Si abscessus matu-
rus sit, neque disrumpatur, semi-
nis lini, & ficuum decocto macera-
fimum columbinum & fermentum,
& iniice.

EMPLASTRA.

Radices lilii, cepas assas, limacias,

mentum & semen lini pistello
unde, & axungia butyróque con-
ce emplastrum, quod epigastrio
nponatur.

Si in osculo aut colliculo fuerit
alis abscessus, manu secetur. Rupto
bscessu detergētibus prædictis vte
e, quibus addes nonnihil succi a-
ii. Demum (vt diximus) sarcotica
dmouere debes.

SCIRRHVS ET SCLE-

roma vteri.

Scirrhus durities est vix sentiens.
Scirrhū nominamus tumorem du-
rum, qui sine dolore est, non tamen
omnino sine sensu. Vel, Scir-
rhus exquisitus est tumor præter na-
turam, sensu priuatus durusque, nō
exquisitus verò non omnino insen-
sibilis est, difficulter tamen omnino

Gal. lib. 2
de mor-
bis curan-
dis.

Gal. lib.
14. de
morb. cu-
randis.

Gal. lib 2
artis cu-
ratiuæ ad
glauco-
nem.

Gal. lib.
defi.

sentitur. Vel, Scirrhus tumor
corporis cum duritie & grauitate
& mouendi difficultate cum insensibilitate.

CAVSAE SCIRRHI.

Fit autem ex humore lento & crasso scirrhus insolubiliter induratis partibus infixio: interdum itaque statim à principio congregatur paulatim & augetur, crebrius verò medicorum imperitia paratur, quum vehementer Erysipelata & inflammationes astringunt, & infrigidant. Si quis igitur medicamenta vehementer dissolutiua induratis corporibus adhibuerit, quæ manifestam faciant scirrhi diminutionem, breui tempore non sperauerit perfectam curationem.

Gal. art.
curati, ad
glauc. lib
2.

Aegineta

Obdurefcit vterus, quandoq; sanè de repente nulla perspicua occa-

ione, plerumque verò ex inflam-
natione quæ præcessit, & soluta nõ
est, neque dissipata, neque in ab-
cessum permutata.

SCLEROMA conforme est *Aegineta*
cirrho, circa vuluæ ceruicem ma-
gna ex parte consistens, tumorem
quidem habens eodẽ pacto, sed mi-
nus durum, cum dolore mediocri.

NOTAE.

Comitatur autem hæc declinatio *Aegineta*
ad contraria & opposita, tumor ad
magnitudinem morbi fortiter, con-
trarius cum grauedine, & difficili
motu, non crurum modo, sed vni-
uersi corporis, desidiaque ad exe-
quenda opera. Accidit enim non
rectè tractatis, malus corporis habi-
tus aquosus.

VENAE SECTIO.

Principio igitur in huiusmodi cu- *Aegineta*

ratione sanguis secta vena anferen-
dus est.

HVMORIS NOXII subductio.

Aegineta Eligenda purgatio cum Archige-
nis hiera, si verò corpori robur nō
desit, etiā helleborismus probatur.

CATA PLASMA TA, MA- lagmata & emplastra.

Si quis medicamenta vehementer
dissolutiua induratis corporibus ad-
hibuerit, quæ manifestam faciant
scirrhī diminutionem, breui tempo-
re non sperauerit perfectam curatio-
nem. Nam verè ignora quòd resi-
duū passionis hoc curationis modo
incurabile redditur, tenuiori enim
ex eo dissoluto humore, residuum
exsiccatū lapidis duritiem assequi-

ir. Non igitur curandæ sunt partes
aduratae medicamento immodicè
siccan- te, sed cum eo quod calorem
habeat tepidum, humiditatem ve-
rò, nec multam, nec omnino mini-
mam. Quod enim superfluum hu-
morem habet, nihil omnino dissol-
uit: quod verò minimum, plusquàm
oportet exsiccat. Oportet autem in-
duratū corpus à medicamēto quod
auxilio futurum sit, simile quid pati
his quæ sub sole funduntur. Vocan-
tur autem mollificantia huiusmodi
medicamenta, de quibus ampliùs
diximus in quinto tractatu libri, quò
de simplicium medicamentorum
viribus inscribitur. Exempla quoq;
(vt dictum est) ex simplicibus sunt
omnes medullæ atq; adipēs, ex me-
dullis primas partes obtinet cerui-
na, deinde vitulina, ex adipibus au-

P

tem adeps anseris in volucrum genere, leonis verò in pedestrium cacteris præstat: at vero qui ex gallinæ fumitur, anserinum, & qui ex parudo, leoninum sequitur, ac deinde ursinum atque taurinum: at qui ex capris accipitur & crassior & sicci-
or prædictis est, idq; magis si ab hircoco accipiat, Hæc Galenus in 2. lib. artis curatiuæ ad glauconem. Vide ibi historiam curæ Cercili pueri.

Aegineta Cataplasmata ex ficibus aridis, hyssopo, nitro & absinthio, Malaginata nempè polyarchion, & diaspersmaton & diadaphnidon.

Ceratum quod sequitur epigastrio, aut loco tumentis, modo non adsit cancer, imponatur.

Acci. maceratum ficium immaturarum coctarum 3. r. f. adipis suillæ,

fopi vdi. an. 3. 1. picis naualis, ceræ
teæ. an. 3. 10. olei liliacei. 3. f. diachy
on. 3. 2. liquantur simul, quibus ad-
de rad. iridis friatæ. 3. tres, cinerum
orticis salicis. 3. 2. concinna cero-
um, quod extensum panno bombi-
cino, aut corio imponatur.

VNGVENTA.

Locus durus hoc iungatur vn-
guine. Acci. olei chamæmelini. 3.
tres, olei spicati. 3. 1. f. medullæ cru-
rium vituli. 3. 1. ceræ quātum sit sa-
tis, adde rad. iridis tufæ. 3. 1. Vel,
Olei liliacei, olei sambucini,
adipis cuniculi & coturnicis, me-
dullæ coxarum vaccæ & cerui, olei
amygdal, dulcium, butyri. an. 3. 1. cō-
ficiatur vnguentum, quo internæ
& externæ locellorum partes inun-
gantur.

DE MORB. MVL.

CUCURBITULA.

Cucurbitula imponatur post purgationem cum scarificatione.

IN SESSVS.

Aegineta Enchathismata facta ex elexatione ne ficuum ischadum, artemisiæ, purgationis legii & althææ utilia sunt.
Vel, Acci. chamæmeli, fertulæ cāpanæ. an. m. i. f. althææ cum rad. m. 4. fœnigræci, seminis lini. an. lib. terantur & coquantur, decocto in fideat ægra.

CVM METRANCHY-
to immittenda.

Decoctum fœnigræci, seminis lini, cum oleo anethino & sabucino, & chamæmelino & lilino, ini-

in locellos. Vel, Acci. olei li-
 racei, olei chamæmeli. an. 3. 2. adi-
 pis anatis, medullæ cruris vituli aut
 erui. 3. 2. bdellii in vino liquati. 3. 3.
 teum oui affati, quibus adde pos-
 sam quantum sit satis, iniice. 3. 6. re-
 idè. Vel, R. Thuris ammo-
 iaci. an. 3. 1. mastiches, castorii, sta-
 tes, adipis anatis, olei chamæme-
 ni. an. 3. 2. gummi melle soluantur
 & poscâ, & omnia liquata & tusa
 niiciantur.

PESSI.

Pessuli componantur è resina te-
 rebinthina, galbano, myrrha, iri,
 myssopo, dropace.

Pessulus vim habens molliendi.
 Accipe ceræ ponticæ, vnguenti nar-
 dini. an. 3. 3. irini, gleucini, cyprini,
 singulorum. 3. 2. adipis agnini, & an-

p iii

Aegineta

ferini, butyri, hyssopi, medullæ ceruinae, resinae terebinthine. an. ʒ. ʒ. confice pessulos. Vel. R. polii. ʒ. 2. myrrhae. ʒ. 4. cum vino mendacio conterens, irinóque immergens ad subiiciendum exhibe.

Vel, Ceræ tyrrhenæ, adipis vitulini, resinae terebinthinæ, medullæ ceruinae, mellis attici, olei veteris æquis portionibus cum syncritico. Sequens pessus utilis est & ad tumores. R. Vuæ passæ candidæ demptis acinis. ʒ. 3. foliorum rutæ viridis. ʒ. 2. aquæ marinæ. ʒ. 1. f. cymini. ʒ. 4. mellis quantum satis est, illiniens autem pessum immerge oleo cyprino, atque subiice.

Cæterum aureus pessulus atque libanius, necnon enneapharmacum accommodata sunt huic effectiōis verum peculiarius, qui ē calce fic

itianus.

CANCER VTERI.

Aegineta

Ex canceribus que in mulierum
ocellis oboriuntur, partim quidem
um exulceratione, partim verò si-
ne vlcere proueniunt.

CAVSAE.

Gal. lib.
de mor-
boru dif-
ferentii.

Ab atra bile oritur cancer. Etiam
ex scirrho gignitur.

NOTAE.

Aegineta

Quocirca quæ citra exulceratio-
nem emergunt, in his utique tu-
mor, circa hystera ostium durus,
varius, tumens, colore feculentus,
rubicundulusque deprehenditur,
interdum verò etiam subliuidus
& pergravi dolore tentantur se-
cundum inguina, quæ græci bubo-
nas appellant, & epigastrium, su-
menque & lumbos: stomachantur-

p iiii

que & exacerbatur manuum attritionibus, & vario magis medicamento. At si cum ulcere cancer est, præter dolores & duritias, tumoresque, exesa ac aspera speculantur ulcera, magna quidem ex parte fordidæ, ponderosa & albicantia: quod si labores humore concreto turgidos habeant, & quæ oculis usurpantur, pura, feculenta, lurida, rubentia & cruenta apparent, continuo inde ichor tenuis, aquosus, ater, aut pus tetri graueolentisque odoris excernitur: nonnumquam verò etiam sanguis profluit, cæteraque indicia quæ in sermone de vtero inflammato enumerata sunt.

PRAEDICATIONES.

Hic sanè morbus immedicabilis est, ceu alibi ipse quoque asserit Aegineta Hippocrates.

Cancros occultos omnes melius
est nō curare : curati enim citò pe- 6, aph. 36
reunt, non curati verò longius per-
durant. Galenus in glessemate in-
quit: Occultos cancos dixit, vel e-
os qui sunt sine vlceratione, vel ab-
sconditos, hoc est, non apparentes,
quod rursus idem significat ac si di-
ceretur, qui in profundo corporis
sunt. Sed & curare duplex est.

Vnum quidem omnia agere, vt
particula patiens ad salutem perdu-
catur. Alterum autem eam adhibe-
re prouidentiam quæ passioni con-
gruat, hoc est ipsam mollire ac mi-
torem facere, & tum præcipuè, quū
adeſt exulceratio.

Tunc enim est necessarium, vt si
non aliud agamus, saltem saniem
abluamus, humido aliquo vtentes,
non quocunque, sed vel per expe-

rientiam, vel per indicationem in-
 uento, quod neque putrefacere, ne-
 que irritare partem patiētem, sit na-
 tura aptum. Ab hac igitur curatio-
 ne, neque absistere conuenit, neque
 illi qui sunt sine vlceratione cancri
 indigent ea: aliam verò que fit per
 sectionem, vel vstionem (quæ sola
 sunt remedia cancrorum) consulit
 vt in cancris occultis non adhibea-
 mus. Quòd igitur illi qui sunt in
 partibus penitioribus talia remedia
 non desiderant, etiam expetientia
 docet. Equidem scio omnes qui hu-
 iusmodi cancos curare tentarunt,
 magis illos irritasse, & breui homi-
 nes interemisse. Nam & qui can-
 crum in palato constitutum, & in
 sede, & in sinu abscondito mulie-
 bri, vel vsserunt, vel secuerunt,
 non potuerūt vlcera ad cicatricem

perducere, & homines in cura afflic-
tos ac maceratos vsque ad mor-
tem colliquarunt, quæ si nullam cu-
rationem adhibuissent, longiori tē-
poræ vitam cum minori molestia
transegissent. Tales igitur cancri
nullomodo curare tentemus. Ex
eis verò qui in summa parte corpo-
ris hærent, illos tantummodo quos
possumus vnâ cum radicibus ipsis,
vt quispiam dixerit, resecare.

Neque enim malum est, veluti
radices quasdam cancri, nominare
eas quæ plenæ sunt sanguine melan-
cholico venas, & vsque ad loca cir-
cūstantia distenduntur.

Multi enim magnæ autoritatis.
Medici, neque hos manus opera
curari permittunt, sed illos tantum
qui exulcerati, simulque laboran-
tes molestant, adeo vt ipsi vltro ma-

nu curari desiderent, & simul sunt in talibus, partibus siti, quas possumus vnà cum radicibus resecare & exurere. Quidam neque hos amoliri permittunt, sed omnino abstendum consuluit à remediis potentibus in omni natura cancri.

Quòd verò Hippocrates nunquam consulisset curare potenter cancos in partibus corporis penitioribus conditos, ex ipsa passionis natura licet coniectari, sed & eos qui in summa parte corporis hæret absque vlcere incertum est, quātum ex verbis aphorismi coniici potest.

Ipsū scripserunt Artemidori & Dioscoridis sectatores, vsque ad ea verba: Non curare melius est.

VICTVS.

Alimenta porrò ritè benèque dis-
posita, & inculpati succi, sunt exhi-
benda: verbi causa, paucissimum a-
quosum, fugientes acriores cibos
omnes, & cibi satietatem, promptis-
simè namque ipsis cibaria corrup-
puntur. Quæ item bilem atram
gignunt fugienda sunt. Potiones
purgationesque propinentur, qui-
bus atra bilis profligari arcerique
possit. Smaragdus, saphyrusque si
potentur iuuabunt. Gamari si he-
sitantur proderunt.

Aegineta

SANGVINIS MISSIO

è vena.

Vtile erit venam humeralem
aut saluatellam incidere.

ENCATHISMA.

Placandus est ipsarum mulierum Aegineta

DE MORE. MVL.

dolor infessibus quidem ex sceno-
græco maluâque paratis, atque id
genus cataplasmatibus.

POTVS.

Theriaca ex vino albo potui de-
tur, Pastilli item ex viperis.

CATA PLASMA TA ET
cerata.

Aegineta

Cæterum valde consolantur in
exacerbationibus, malua, aut althæa
in mulso subacta, colliquatâque cū
paucō rosaceo, & instar cataplasma-
tis adglutinata: nec non compōi ex
ficubus aridis, & fertulis campanis,
ruta, thure, napique herba accuratē
cum oleo contusa. Lenit item cata-
plasma ex palmularū dactylis in pas-
so decoctis, adiectis ouorum puta-
minibus, atque farina, aut ex papa-
uere cum coriano, aut seminali, aut
sercos. Hæc quidem in ipso: crucia-

tus tempore. Post hæc verò abster-
gatur cerotâ ex rosaceo, aut myrti-
no, aut ænanthino, aut melino cum
palmulis in passo elixis. Peculiariter
verò hinc negotio quadrat cata-
plasma ex fece officinarum fabriliū,
que assata leuigatur, cerotâque ro-
sacea excipitur, tantisperdum cras-
situdinem emplastro ideoneam in-
duat. Hæc quidem extrinsecus ad-
hibentur.

VNGVENTA.

Rx. succi granorum solani vessicariū
(quod allzelzenge vocant). ʒ. 4. olei
rosacei. ʒ. 8. ceræ citrinæ. ʒ. 6. liquen-
tur vna in mortario plumbeo addē-
do friamento sequentiū pharmaco-
rum. Rx. cerussæ lotæ. ʒ. 2. plumbi v-
sti & loti, tuthiæ præparatæ. an. ʒ. 1. f.
thur. ʒ. f. æris vsti, atimonii, balaust.
rad. chelidonii, sagui. drac. cadmiæ,

argenti, pulueris vermium terrestrium, an. 3. 2. ita tondetur in mortario quoad vnguinis spissitudinem induerint, quo inunge canceri locum internum. Vel, R. lichargyri & cerussæ partes æquas rosaceo in mortario tam diu tonde quoad vnguēti formam suscepit, quibus inunge partes canceri proximas, aut ipsummet cancerum. Ex dictis vnguentis potes conficere iniectiones, quas per metranchytyum iniicies.

Ex lichargyro, oleo rosaceo & aceto confice vnguentum, pro cancro ulcerato.

INTRINSECVS PER

metranchytyum adhibenda.

Aegineta

Interius verò mitigat locos oleum: Vbi autem exulcerati redduntur, lac quoque muliebre infusum, tepidusque plantaginis cremor. Si

anguine conspergantur, succus femininalis herbæ cū pauco thure, com-
mulsct. Omnium verò efficacissimè
operatur, & aduersus etiam sedis af-
fectiones illud, quod Accipit spumæ
argenti italice lotæ. ʒ. 6. thuris mas-
culi hyssopi, adipis porcelli nouitiū,
butyri recentis, ceræ thyrranicæ, sin-
gulorum. ʒ. 2. rosacei. ʒ. 4. spumam ar-
genti contritā, in cremore sereos li-
quefactis reliquis iniice

Vt non vlceretur cancer, & si
vlceratus fuerit, ne vicinas de-
spascatur partes. R̄ succi solani pu-
rioris limpidiorisq̃, aut ipsius li-
quoris stillatitii. ʒ. 6. tuthiæ præpara-
tæ, plumbi vsti, an. ʒ. 1. caphuræ. ʒ. 1.
commoueat̃ cum pistello in mortario
diutissimè, & iniiciatur in locel-
los.

Ad vlceratum cancrum exper-

tissimū. ℞. Herbae roberti, stommi,
scabiosae, capuifolii, anethi oletu-
li humani, aquas partes, vranur,
quorum cineris. 3. 3. excipiantur. 3. 6.
liquoris stillatitii solani, & ducan-
tur pistello in mortario & iniician-
tur,

Rhagades,

CONDILOMATA

& hæmorrhoides
vulvæ.

Circa feminarum naturalium
ostii, rimæ (quas græci *παρυαδᾶς*
vocat) proveniunt, aut scissuræ.

Condylomata, tubercula sunt ex Gal.lib.
inflammatione nascentia. Vel sunt definiti.
rimæ inueteratæ in callum transen Aegineta
tes.

Hæmorrhoids est enervatio vaso- Gal.lib.
rum quæ sedem ambiunt, aut prote- definit.
gunt.

CAUSAE.

Rhagades quandoque ex labo- Aegineta
gii

rioso partu & violento proueniunt.

NOTAE

Aegineta Rhagades primū quidem recentibus etiam dum ex puerperio doloribus delitescentes fallunt, postea verò paulatim sensu precipiuntur, nonnunquā manu etiam admodum ta deprehenduntur, interdum verò & in congressu venereo, dum ex attrito polluantur cruore, arguuntur. Præterea & sinus indicantur stillicidio, rupturæ namque in corona ostii speculantur. Hemorrhoides præterea in mulierum naturalium ostio siue ceruice exurgunt: quæ quidem partibus dioptrismo tentatis, ex eo deprehenduntur, quia in paroxysmis quidem sanguinolentum, subrubrum, dolorificum quiddam eximie apparet. In relaxationibus

erò fluxus dolore vacans subliui-
us & strangulosus.

PESSI ET EPITHE-

mata.

In rhagadis sanò chirurgia, & ero- Aegineta
lendi mordēdique virtute prædita
medicamina abhorrēda: mitioribus
erò & simplicibus epithematis at-
que pellis vtendū, seraccōmodatum
porro habetur eisdem scissionibus
tetrapharmacū dissolutum, quòd si
callosis labris fuerint rimæ, com-
positione ex charta, cū rosaceo vtē-
dum. Quum autem vehementiam
eius laborans non tollerat, irim illy-
ricam resina terebinthina excipiens
imponito. Vlcusculis verò pereun-
tibus euanescentibúsq; , magno
cum emolumento adhibetur me-
dicamentum ē cadmia, aut eorum

q iii

aliquid, quod ad sedis affectus placandos & persanandos est compositum, & ob id hedicum appellatum cuiusmodi est ea, quæ ex spuma argenti contextitur confectio.

Aegineta Postquam autem eiusmodi diuisiones inueteratæ in callum (quem condylomata dicunt) transeunt, consimilibus atque eiusdem planè facultatis medicaminibus uti expedit. Callus emollientibus quidem discutiendus, & in cicatricem redigenda sunt condylomata.

Aegeneta Hemorrhoidibus quibus igitur opus est, siquidem fieri potest, in remissione exsectione utitor, Mydio apprehendens: sin verò minus, cum medicamentis ipsas confringito: nunc quidem aridis malicoriis, adiecta galla, aut quopiam eiusmodi applicatis: nunc verò his que in san

guinis vteri profluuiio posita sunt
 idhibitis, quæque diarrhis, & sangui-
 nis fluxum patientibus congruunt
 deprehensis continua vuluæ ex in-
 teruallis cruentatione: neque id qui-
 dem in menstrui expurgationis tē-
 pore solum, sed aliàs etiam iugiter.

MV LIEBRIVM CLAV-
 sura locorum, *φίμων φίμων.*

Fit angusta quædam interdum
 circa muliebrium locorum os præ-
 clusio, quam *Aegineta* appellant.

CAVSÆ.

Id fit aut propter exulcerationem
 quæ præcessit, aut duratam inflam-
 mationem. *Aegineta*

INSESSVS, ET CA-
 taplasinata.

Medendum igitur est encathil- *Aegineta*

q̄ iiii

matris mollificatibus, quæ constituuntur ex hydræleo & fœnigræci elixatione. Cataplasmata consimiliter sunt applicanda.

PESSI.

Aegineta

Pessi item qui emolliendi vim habent adhibendi. Discutit præterea eiusmodi nexum etiam pessulus ex hyssopo, mintro, resinâque terebinthina contextus, si nihil aliud quàm clausura ostii vulvæ coarctetur.

SUFFITVS

Aegineta

Quòd si inueterauerit id malum, suffimētis vaporibúsque aromatum vtendum.

FOTVS ET LOTIO-

nes.

Aegineta

Connitentes porrò & clausas mulierum vulvas aperire conuenit, fragrantibus lauando & fouendo cō-

fectionibus ex malua & semine lini, foenigræci, & oleo, interdum etiā melle. Vehementioribus item artemisia, videlicet, monyza & nepita, & pulegio, & anthemide (quam chamomilam vulgò vocant) ad hæc resina quoque terebinthina, nitro, cucumere syluestri, Elaterio, cassia, horopissa.

HIA TVS OSTII

vteri.

Quibus ostium vteri hiat, his diætæ quidem, & fatus, & medicamenta aridiora, & constringentia, cytini maiorum punicorum, & rotundus iuncus odoratus, & rubi radices, & myrtha, & breuiter quæcumque in humidiorē vulua expediunt, accommodatissima censentur. Ad vuluā adstringendam. ℞. rad. symphiti,

aluminis, balauft, myrrhæ, liba, mastiches, colophoniæ, glebæ armeniacæ galbulorum cypressi, cornu cerui. vsti. an. quantum volueris, in pollinem tenuissimum friato, potui datur ex vino adstringente. 3. 2. ex reliquo decocto astringente misto calidè foveatur locelli. Vel, ex dictorum decocto fiat epithema. Vel si mauis lana aut coto excipere confice pessos, qui ad cubile indantur. Foveantur etiam locelli decocto ex vino & aceto mastiches, lacrimi arabici, pilularum cypressi, gallarum, aluminis saccharini. an. 3. 1. Vel confice pessos aut suffitus. &c. Aluminis myrrhæ, agallochi, pilorum leporis tenuissime incinsum, rutæ, baccarum lauri, doronici, pilularum cypressa. an. 3. 6. styracis. 3. 2. ambaris. 3. 1. moschi. 3. 6. friato, &

leo myrtino excipe in pesos vel
rangito & cum infundibulo vterus
affiatur.

CONTORTIONES

peruersionesque vuluarum.

Fometationibus, quas pyrias di-
cunt dirigito & corrigito, & quæ
vim habent emolliendi cathetis.

STERILITAS.

Causæ.

Causa sterilitatis duplex, vna à Gal.lib.
viro, altera, à femina prodit. Ab defi.
hac, vel propter humiditatem nimi-
am, aut pinguedinem vuluæ: A ma-
ri autem quando ipse est spado fa-
ctus & testiculis caret, vel alio quo-
vis pacto ægritudine detentus.

Quæcunque frigidos & spissos

Hippe. 5.
aph. 63.

uteros habent non concipiunt. Et quaecumque praeumidos uteros habent, non concipiunt: extinguuntur enim in eis genitura. Et quaecumque siccos magis & adurentes: nam ex defectu alimentum corrumpitur semen. Quaecumque verò ex utrisque mediam habent temperaturam, haec fecunda sunt.

Bene temperati uteri ad conceptionem sunt idonei, malè autem temperati, si parum à bonitate recedunt, difficulter concipiunt: Si verò nimium, mulieres steriles fiunt, ita quòd simul datur intelligi unde viri sint steriles, sed hoc multos latet. Qui verò ea quae dicta sunt diligentius considerat, primum quidem sciet quā ob causam, & quidam viri omnino steriles sunt. Secundo loco post hoc de viris quidem, ac mulieribus

bonam habentibus temperaturam,
quòd semper generabunt, etiam si
cum malam habentibus coeant. De
habentibus autem malam tempera-
turam, quòd cum solis his qui con-
trariam habent coeunt, gignent.
Prius autem dicetur de mulieribus
sterilibus, quarum, vterus statim ab
initio est male temperatus, exupe-
rante scilicet vel vna duarum qua-
ritatum, vel duabus, quèadmodum
in còmentariis de temperaturis de-
terminauimus. Vbi igitur frigiditas
modica exuberat, adeò quòd vte-
rus spissior efficiatur, angusta qui-
dem sunt supramodum ora vasorum
quæ ad ipsum pertingunt, mulieres
verò steriles, quum secundæ non pos-
sint adnasci ad ora vasorum, neque
si hoc fiat aliquando possit bene nu-
triri conceptus: vel enim nullo mo-

do fiunt hisce mulieribus purgationes, vel omnino paucae, & hæ ipsa vitiosa, solo tenuiore atq; aquosiore sanguine perlabente. Sed & hæ quoque ora facile obstruuntur, & propter nativam angustiam, & quoniam magna ex parte hæ mulieres humorem aggregant pituitosum, siquidē & corpus totum ut plurimum est uteris simile. Contingit & maris semen in talibus uteris refrigerari, nisi sit natura calidissimum. De prima itaque frigida temperatura Hippocrates fecit mentionem, inquit. Quaecumque frigidos & spissos uteros habent, Non per iouem volens simul coniungere in ipsis cum frigiditate densitatem, veluti si succitatem aut humiditatem addidisset. Harum enim neutra semper consequitur frigiditatem, & præterea ipsi,

modo una, modo altera adiungitur.
Densitas verò ex necessitate valde
rigidos uteros comitatur, ob quam
causâ possunt concipere, ut diximus,
quare ita sermonem totum huius a-
phorismi audiemus. Quæcunque fri-
gidos uteros habent non concipiēt,
propter substantiæ ipsorum spissitu-
dinem: Cur verò spissitudo aduer-
setur conceptioni, dicere prætermi-
sit, ut nobis potentibus intelligere,
Et quæcumque uteros nimis humi-
dos habent non concipient: extin-
guitur enim genitura, quemadmo-
dum in terra palustri cerealium semi-
na: Et quæcumque siccos siue adu-
rantes habent uteros, propter defe-
ctum alimenti non concipient: nan-
c in siccis v. etis tale quid accidit,
quale ubi aut harenæ, aut argillose
terræ, aut petrosæ mandantur semi-

na. In habentibus autem immodicā caliditatem, quale vbi valde calida terra semina committuntur, quemadmodum in aestibus sub cane contingit, sic quidem quatuor qualitatum Hippocrates meminit singularum seorsum facultatem exponens, vt si quando inuicem misceantur manifesta sit earum commistio. Post hæc autem inquit: Quæcumque verò ex vtrisque modicè temperatæ sunt, fecunditatem habent, ex vtrisque autē non qualitatibus scilicet (sunt enim quatuor) sed quæ sunt secundum ipsas oppositionibus. Vna quidem est bona temperatura mistis modicè inuicem calido ac frigido, Altera verò humido ac sicco: & fieri potest, vt sit aliquis vterus secundum vnā quidem oppositionem bene temperatus, secundum

teram malè. Sed ne mulier con-
cipiat, potest altera efficere tempe-
ratura. Mulierem verò esse for-
mandam sine ambabus bonis tem-
peraturis est impossibile. Hippocra-
tes quidem, sicuti totum sermonem
interiorem de muliebribus scripsit,
et & nuper dictum de his quas ha-
bent utriusque temperaturis, non tamen
etiam addidit de viris sermonem,
vel quia promptum nobis sit ex his
quæ dicta sunt, easdem intempera-
turas ad semen transferre, vel quia
distulit ad sequentia, sed postea o-
missus est. Licet nobis ad viros
transcendentibus dicere, quòd prop-
ter temperaturæ frigiditatem non
bene semen cōcoquitur, atque, ideo
si mediocris quidem sit intemperatu-
ra, in ipso indiget utero calido suffi-
ciēter. Si verò immodica sit, est om-

nino sterile, vel propter humiditatem, rursus neque concoquitur, & hoc etiam indiget si modica sit in temperatura, vtero calidiori, ac sic ciori: si verò immodica sterile est eodem modo & propter excedentem calorem semen fit tosto simile. Ob siccitatem verò ubi primum excidit neque extendi potest, quod maxime fit necessarium si mulier debeat concipere. Ostensum est enim in sermone de semine quòd nisi per vteri capacitatem parte plurima semen extendatur, mulierem non concipere.

Leonar-
thus.
Fuchf,

Sterilitas aut viri, aut mulieris ratione accidit. A viro est, quum semen eius vel feruidum & veluti torrefactum, vel frigidum, tenue, aquosum, languidum, quale decrepitorum est, vel crassius quàm oportet,

emittitur: vel quòd viri semispado-
nes sint, penemque breuissimum ha-
beant, vt in vuluæ recessum semen
iaculari nequeant. Quod etiam in-
terdum nimia obæsitate contingit,
obæsi enim tam ventricosi euadunt,
vt semen ad profundiores vteri par-
tes iaculari non possint. Mulier
verò sua ipsius ratione non concipi-
pit, quòd vterum habeat vel calidum
& igneum, vel frigidum & humi-
dum, vel squalentem & aridum.
Hippoc. quæcumque frig. &c. Cæte-
rum crassæ admodum & obæsæ haud
conciipiunt. Hipp. Quæcumque præ-
ter naturam non concipiunt vtero,
iis omentum os vteri comprimit,
& priusquàm extenuentur non concipi-
piunt. Graciles denique & macilè-
tæ non concipiunt, aut si concipiunt,
abortiunt, eodem Hipp. teste. Quæ-

5. Aph,

46,

S. Aph.
44.

cumque præter naturam tenues ex-
istentes vtero gerunt, abortiunt pri-
usquã crassescant. Quædam etiam
non cõcipiunt, eo quòd vterus earum
debilis est, vel angustus, vel brevis
aut quòd vasa eius obstructa clau-
sæque sint, aut cicatricis superuentu
excoecata, aut que vteri ceruix in o-
bliquũ ducatur, aut quòd os eius ve-
nimis angustũ vel nimis amplũ sit.

Causæ internæ sterilitatis fiunt,
aut testium vitio, aut colis, aut alicu-
ius membri organici, vt oris ventri-
culi, renum iocinoris. &c. Testium
vitio fit, quum peculiari eorum calo-
re semen vritur, vel ita in testibus
concretũ est, quòd ineptum prorsus
generationi redditur. Testium item
abscessus, vel simile quippiam steri-
litem gignit, vlcus etiam factum
in calculi renum aut vesicæ extra-

ione, colis item longitudo, aut bre-
uitas, foraminis obliquitas, penis
molities, cōuulsiōe aut vlcus. &c.
Penarum post aures incisio, Aetas
etiam sterilitatis est causa: nam (au-
thore Aristotele lib. 4. de partibus
animalium) viri post. 7. annos nul-
lum genitale semen generationi ap-
pungunt. Mulieres post quin-
quagesimum annum steriles omni-
no sunt, quanquam & viris & mu-
lieribus (vt vidimus) aliquando con-
trarium accidat. Hermaphroditæ
non vtero gerentes efficiuntur.

Causæ externæ viris mulieribús-
que communes sunt. Aër plusquam
par sit aut calidus aut frigidus, exer-
citium, quies, somnus, vigilia, animi
accidentia, mœror, gaudium, coitus
superfluus, innanitio, repletio, aquæ
frigida potus non consuetus, frigi-

clorum aut calidorum vsus nimius, ebrietas.

Quædam peculiari temperatura sterilitatem causant, aut gestata, aut ore sumpta, verbi causa, Caphura, squama ferri, vermes noctu lucentes. Testium item illinitiones ex validè refrigerantibus, vti hyoscyamo, opio. &c. Alicuius etiam animus aut præstigiatrix forte. Amore coniugum vehementissimo sæpè numero impeditur conceptio.

NOTAE.

Signa quibus diuersitas causarum discernitur, hæc sunt.

Fuchs.

Calidius siquidem temperamentum viri facile deprehenditur ex pilorum copia, potissimum verò nigrorum in partibus genitalibus, & omnibus quæ circumstant, supra quidem usque

d media fœmora. Petulca etiam
st hæc temperatura, & ad libidinē
rona: statinverò satiatur. Vteri cali-
litas ex reliqui corporis caliditate
cognoscitur, quódque pauca men-
strua, & cum dolore deferuntur, vt
genitalia interdum mulieris exulce-
rentur, sed & quæ educuntur, nigrio-
ra sunt. Hanc etiam temperaturam
insignis salacitas, & totius corporis
siccitas sequitur. Tactu calor de-
prehēditur, & in seminis emissionē,
calidū sentit mulier. Testium tem-
peratura calida coitum summè desi-
derat, futuere incipit ab adolescētia,
vel saltem venere stimulatur.

Fuchsius

Ex Aegi.

Frigidius tēperamētū mōstrāt par-
tes circūpositæ testibus glabræ. Ne-
que etiam hoc temperamēto prædi-
ti ad libidinem proni sunt. Viri fri-

r lili

Arab.

ginitatem arguunt, semen genitale
frigidum sentitur, tardéque exit pa-
ca cum voluptate, nulla futuitionis
appetentia, in mulierum cætu rubo-
re suffūdatur, arteriæ motus tardus,
lotium colore remissum, coles vix
tument aut erigitur.

Aegineta

Frigidiores igitur vteros propriè
arguit mensium retentio, victus ra-
tio gelidioris potentiæ, & crassi suc-
ci, quoniam stuporem inducit cum
circa fumen seu pectinem, tū lum-
bos, tum etiam crura. At quædam
sunt ad summum perfrigeratæ, ne-
que in venerem admodum procli-
ues feruntur, neque appetunt.

Fuchf.

Humiditatis verò vitio fœcundita-
tē frustrari indicat, si in coitu humo-
re admodū perfundatur, & si iis fue-
rint tenuia copiosaque menstrua,

Arab.

pili molles, venus sopita, quæ si conceperint in incremento fetus abortum patiuntur.

2. Siccitas vteri cōtrariis planè deprehenditur notis, paucus etenim mēsum fluxus, os siccum, labra scissa, coitum appetunt vti sicca terra rore, facile irascitur, corpore tenuis est in actu venereo ferè nihil seminis emittit.

Fœminis fatiffacere non possunt viri, qui natura timidi actus exercēt muliebres, vocēque fœminas referunt, pudenda pilis nudata sunt, barba exiles paucissimósque alit pilos, huiusmodi quum gelidam testium habeant temperaturam nūquam generationi inseruient. Is etiā sterilis censendus est qui futuit cum pluribus mulieribus aut puellis,

nullus tamen ex eorum futuitione
 ortus est foetus, Mulier item sterilis
 dicenda est, cuius crassa vox est, pi-
 lique multi & duri rigidique pubē
 obsepunt, mystacem mentūque
 barba circūdat, quæ etiam plurimo-
 rum virorum amplexus experta est,
 nec vtero gessit.

Locellorum vitio sobole priva-
 tur, si callus, aut carnis excrescētia,
 aut tuberculum, aut acrochordon,
 aut pinguitudo nimia, aut resolutio,
 aut cōuulsio, aut vlcus, aut aliquid
 id genus vtero infideat.

Quibus os vteri hiat, aut claudi-
 tur plus quàm par sit, aut meatus se-
 minarii in obliquum tendunt (nam
 talia visu tactūve deprehendes) steri-
 les aut difficulter gignentes efficiū-
 tu. Suppressione mensiū si id mali
 acciderit, mulieris querimoniā nos

es. Si sortilegio contigerit, cacoda- Gal. in
 nonū famulis has remitte, vel quod glossema
 sanctius iustiusque est christum in- te. 5. aph.
 uoca ac precare nodum hunc vt sol 62.
 uat. Plato inquit hoc esse maximū Pronuba
 opus obstetricum scire coniungere barū of-
 inuicē corpora apta ad cōceptionē, ficiū.
 & simul posse discernere, qui viri
 sint infœcūdi, & quæ mulieres steri-
 les, immodicæ nā intēperaturæ ho-
 rū sunt causæ. Modicæ verò si sunt,
 & cōtrariis cōiūgūtur, tūc cōcipiēt
 mulieres: si verò similibus, non con-
 cipient. Neque enim fieri potest, vt
 frigidū semen in vtero frigidiorē
 sit fertile, neque succum in sicciore,
 & aliorum utrūque eodem modo,
 sed indiget semē quidem frigidius,
 vtero tanto calidiorē, quanto deficit
 ab optima tēperatura, & humidius
 sicciore, & in aliis eodē modo. Co-

gnitio autem omnium immodica-
rū vteri intemperaturarum est, quā
paulò atea dixit Hippocrates in suf-
fitu, qui per aromata fit, frigiditas e-
nim spissitudinis ratione nō permit-
tit vsque ad os & nares ferri aroma-
tum exhalationem: eodem modo &
ficcitas. Humiditas verò sicuti ab ip-
so dicta est extinguere geniturā, sic
& aromatū qualitātē: reliqua est ve-
hemens caliditas, siquidē ea ratione
quod vincit aromatum facultatem,
alterat atque corrumpit, ac propte-
rea nō permittit ipsa seruātia sui na-
turam syncerā circa os & nares re-
ferri. De hisce autem naturis ex suf-
fitu aromatū sufficiēs cognitio prae-
stabitur si verò non potest hac suffi-
ciēter haberi, ex aliis indiciis nobis
erit talis natura inuestigāda, hoc ip-
sū cognoscētibus, quòd rara admo-

dum est huiusmodi temperatu-
ra in mulieribus. Siquidem foemina
est mare frigidior, unde ob hoc ea
quam facit Hippocrates ex aroma-
tū suffitu dignotio in sterilibus mu-
lieribus vtilissima est, vel quia om-
nis immodica intemperatura isti
subiicitur, vel quia rarissime vna ip-
sam subterfugit in mulieribus illis
quæ tenues apparēt, & nigræ & hir-
tæ, ita quod ex his signis percipitur
earum immodica intemperatura si-
ne suffitu aromatum.

PRAEDICATIONES.

Neque crassi pinguesque progi-
gnendis pueris satis sunt idonei, tū
quod inepti sunt pudendis, tū quod
eiusmodi pauculū genitalis feminis
emittunt. Neque sanè admodū ma-
cilentī supràque modum extenuati,
procreādis liberis prouinciæ suffi-

§.aph. 46 ciūt. Quaecumque præter naturam
crassæ non concipiunt vtero, his o-
mentū os vteri comprimit, & prius
quàm extenuentur, non concipiūt.

§.aph. 59 Si mulier non cōcipit, scire autem
velis, an conceptura sit, pannis cir-
cum tectam desubter suffias, & si o-
dor videatur per corpus ire ad na-
res & os, scito quòd ipsa nō ex se ip-
sa sterilis est. Verbū, suffias, materiā
Galle in
gloss. indicat quæ naturam habet, vt suffi-

§.aph. 62 ri possit, thus videlicet & myrrham,
& quaecumque alia talia que calidā
habent temperaturā, & sunt satis o-
dorata. Quæcūque frigidos & spis-
sos vteros habent non concipiunt,
& quaecumque præhumidos vteros
habent, non concipiūt, extinguuntur
enim in eis geniura. Et quæcūque
ficcōs & magis adurentes, nā ex de-
fectu alimēti corrūpitur semē. Quæ

cūque verò ex vtrisque mediocrem
habent tēperaturā, hæc foccūde sunt.

Similiter autē & in maribus. Aut 5.aph, 63

enim propter corporis raritatē spi-
ritus extrā fertur, vt semen nō trās-
mittatur ad os, vel propter spissitu-
dinē humor nō exit foras, vel prop-
ter frigiditatem nō cōcalefcit, ita vt
ad hunc colligatur locū, vel propter
caliditatem hoc idem accidit. Gale-
nus in cōmētario dānat hūc apho-
rismū, asseritque nō esse Hip. Qui-
bus secundū aures secantur venæ,
coēūt quidē ac emittūt: sed paulum

quid & minimē fecūdū. Semē ge-
nerationi aptū sit albū, splēdidū, glo-
bosum, storū sambuci modo odorū,
quod in aquā iniectū, fundū petat.

Coti flocco in pelsū excipe melle
friamentū aristolochiæ, & ad cubile
immitte in locellis, si oris sputū dul-

Ari. 3. li:
& 7. de
partibus
animaliū
& 7. de
genera-
tione ani-
mal.
Et Auic.
21. tertii,

cescat foecunda iudicatur, aliàs steri-
lis est. Mulieris lotio aspergatur
malua viridis, aut lactuca: pari modo
fiat ex viri lotio, & cuius, malua ari-
da fuerit, hūc vel hāc sterilē dicito.
Vel, Vterque habeat vas furfure
plenū in quo nouē diebus ipsum fur-
fur vtriusque lotio diluatur, & in cu-
ius vase vermes affuerint, sterilem
putato. Simile fit ex fabis aut hor-
deo. **Auic.** Mulier quæ vtero gerēs sæpe
fit, minus ægrotat quā sterilis, cor-
pus tamen valentius habet sterilis
vtero gerente, nec ita citò senio cō-
ficitur, quanquam innumeris obno-
xia vt plurimum, fit morbis.

Si à mensium fluore madeant lo-
celli, semen iniectum tanquam per
lubricum iter à locellis labitur.

VICTVS.

Sine itaque discrimine vtrique
exui tam mari quam foeminae con-
gruit, corpus vniuersum in media
& inculcata temperie conseruare, &
sine omni excessu in symmetria la-
borum, ciborum, lauacrorum, atque
reliquorum omnium. Hoc quippe
maximum neutiquam despicere, vt
præpinguem sibi comparet habitu-
dinem. Conferunt opis plurimum
ita affectis cuncta quæ calefaciendi
paululumque inflandi vim obtinēt.

Vinum itaque calidæ naturæ cum
modo, & ne quid nimis accipito. Et
ex oleribus erucam & nasturtium
syluestre, quod Erysimon græcè no-
minant, & herbam geminalem, &
id genus alia. Ruta verò & nepita
manibus pedibusque quouis alio
sunt fugienda. Quum autem pro-
pter malos humores & cacochymia

f

Aegineta

quandam impeditur conceptio, eodem expurgare, aut vtili victus ratione temperare expedit, priuatim vero mulieribus cōpetit, vuluam magna industria consultoque aggredi, & absque vlllo impedimento moliri euacuationem. Pro foribus igitur iam existente purgatione, nō tam esculentorum, quantacumque fieri potest mediocritate curato, & quippiā eorum, quæ ad purgationem stimulant ac prouocant steriles, sumere neutiquam detrectent: cuius farinae sunt cum holera odorata, tum quæ acrimoniam præferunt, puta, scandix, batis, fœniculum, apium, myrrinum. Caterum prauam vuluæ temperaturam emendato, & in viam, ut ita dicam, reducito.

Calidioribus mulierum locellis succurrito rebus mediocriter hume

stantibus, & perfrigerantibus: cuius generis sunt holera, lactuca, malua, colitum, cucurbita sativa, cucumis & pepon, atripléxque portulaca, atque id genus esculenta.

Si propter humiditatē muliebriū locellorū infœcūda partū nō cōcipiāt, victus ratio accommodata est aridior, pariter & labores frictionesque infernarū partiū, simul & vomitiones, ariditasque, & frugalitas cibi.

Hysteram aridiorem curato hordeaceo nutritatu, vino præterea mediocri, neque admodum perueteri.

Si quis cum crassioribus humoribus mordax humor infestet, amicū præsidium est, victus rationem exquisitiore & cōmodiorem dispicere.

Pituitosos humores laboribus evacuare expedit.

Quando autem emendatio, men

f ii

fibus commodè & suauiter progredientibus, perspicua conspicitur, tunc cessante purgatione in venerè congre-
gredi expedit.

Medendum flatui ac peditui venter, primùm quidem prætenuem necessitatique vix sufficientem præscribendo dietam.

Coitus postremò qui fit à tergo plurimum vtilitatis ad partus conceptionem conferre videtur.

Plinius
lib. 28. c. 8.
Sterilitatem mulierum emendari hyenæ oculo cum glycyrhiza & anetho sumpto in cibo, promisso inter triduum conceptu.

Plinius
lib. 28. c. 19.
Conceptus adiuuari vaccini lactis potu aiunt: Sterilitatem ob partus vexationem fieri, certum est.

Hanc emendari Olympias thebana affirmat felle taurino, & adipose serpentum, & arugine, addito mel-

e, medicatis locis ante coitus.

POTVS.

Thelygoni potu foeminam concipi narrant, Arsenogonon ab ea semine olex, nec alio distat: huius potu mares generari perhibentur, si credimus. Sunt qui florem cratægoni bibentes mulieres, intra quadragesimum diem concipere tradāt.

Plinius
lib. 28. c.
15.

Plini. lib.
27. c. 8.

Plini. lib.
20. c. 15.

Tradunt enim facilius concipere eas, quæ odorentur ammi, quod & cuminum Aethiopicum & regium dicitur, per coitum.

Si vterus frigidior, huius rei gratia potare expedit castorium & fragrantia semina, & cyminum, & anisum & pulegii comam, & viniperorum baccas seu fructum, vnicuique interim pipere commisto.

Aegineta

Oportet præterea in pharmaco,

f iii

si humor mordax cum pituita infestus
 stet, epithymum, euphorbium, piperis
 ris semen, dauci semen & petroselinum,
 omnia inquam contrita & macerata pond.
 2. drachmarum potui dare. Hoc per ventrem
 etiam pulcherius deducit, vuluamque calefacit
 quemadmodum sæpe iam numero
 menses dissoluit & rupit his quæ non
 erant purgata.

Vbi flatus ac peditus in vtero mulieris
 contenta, conceptioni obstaculo sunt,
 conducunt cuminum, anethum, & apii
 semen, rutæque & anisi, & esculenta
 multa potui exhibita.

SI PITUITA sterilitatis parens est, R. Rubiæ passivæ.
 3. 2. rad. rusci, asparagi, graminis,
 cyperi. an. 3. 1. artemisiæ, fabi-
 næ, apiastri, mentæ, callitrichi, adi-

anti, scolopendrii, sampfuchi, origa-
ni, calamenti, rad. fu. an. m. f. semi-
nis seseleos. 3. 6. anisi, carei foeniculi,
ameos, spicæ nardi. an. 3. 2. xylobat-
sami, carpobalsami. an. 3. 1. glycyrrhi-
zæ, vuarum passerarum. an. 3. 1. florum
rosmarini, & stæchad. arab. an. 3. f. ra-
menti eboris, calami odorati, san-
tal. rub. an. 3. f. terantur parum & co-
quantur, ex decocto confice serapiū
cum sacchari candidi lib. 3. & aceti.
3. 3. quod odorū reddatur cinnamo-
mo probo, & casia, moschique gra-
uis. 4. Sume dicti serapii sesquiun-
ciam, decocti cicerum arietinorum,
aut liquoris stillatitii artemisæ, bi-
pinnellæ, & florum sambuci. an. 3. 1.
misceto, exhibeto quotidie à cubili
ieiunæ quoad pituita attenuata sit.

Serapia officinis communia sunt,
hyemis præsertim tēpore, Oxyme-

f. iiii

li scilliticum & diureticum, Serapia
ex absinthio, S. ex radicibus aceto-
sum, S. ex artemisia.

℞ Oxy mellitis scillitici, serapii ex
radicibus acetosi, serapii ex artemi-
sia. an. ʒ. i. f. decocti bipinnellæ, radi-
cis fœniculi & artemisiæ. ʒ. ʒ. imisce
sunto. ʒ. portiones à cubili potui dā-
da, quælibet portio esto. ʒ. 4. f.

SI BILIS FLAVA.

℞. Serapii acetosi simplicis, aut oxy-
sacchari simplicis. ʒ. 2. serapii ex la-
ctuca sylvestri (quam endiuia vocant)
ʒ. 1. decocti vtriusque cichorii,
lupi salutaris, & buglossi satini. an. ʒ.
2. misce, bina esto portio.

Serapia quibus profligatur bilis, po-
tui dato: verbi causa, zulapiū rosace-
um, violaceūve, Serapium ace-
tosum simplex, Oxy saccharum sim-
plex. Serapium ex lactuca sylvestri.

℞. Florum vtriusque buglossi, rosa-
rum rub. an. m. f. violarum, lactuca-
rum, foliorū papaveris candidi, vtri-
usque intybi. an. m. i. seminum lactu-
cæ sativæ & sylvestris. an. ʒ. f. 4. semi-
num communium refrigerantiū ma-
iorum. an. ʒ. f. fiat decoctio, quæ colo-
traiecta, vt palato arrideat dulcis ef-
ficiatur sacchari lib. 2. aceti albi. ʒ. 4.
vini granat. lib. 1. f. cum citrinis san-
talis aromatizando, sicque confice
serapium, quo vtere cum decocto bi-
lem profligante.

SI ATRABILIS CON-
ceptionem impediat.

℞. Serapii ex radicibus acetosi. ʒ. 2.
serapii ex fumaria. ʒ. 1. decocti buglos-
si vtriusque asplenii & artemisiæ. an.
ʒ. 2. bina esto portio, quibus addere
poteris nonnihil cinnamomi.

Vel, vt volūt arabes. ℞. Liqueoris stil-
latitii buglossi vtriusque, bipinnel-
læ, fumariæ, scolopendrii, & artemi-
siæ. an. ʒ. ʒ. sacchari albi. ʒ. 4. aceti. ʒ. 1.
addito cinnamomo confice zupapiū
pro bina portione. Vel,

℞. Calamenti, origani, stœcha-
dis, eupatorii, florum vtriusque bu-
glossi, querculæ, artemisiæ. an. m. ʒ.
scolopendrii. m. 1. Corticum genestæ
& fraxini mediani. an. m. ʒ. vuarum
passarū. ʒ. 1. fiat deco. in fine decoctio-
nis adde epithymi. ʒ. 1. & cū saccha-
ri lib. 1. & mellis lib. ʒ. ʒ. & aceti passu-
lati. ʒ. 2. confice serapium cinnamo-
mo conditum, cuius quælibet por-
tio esto sesquiūcia cum decocto eo-
rum quæ bilem arcent atram.

POTIONES PUR-
gantes.

SI PITUITA, Medullæ cassiæ fistu-
laris. ʒ. i. quæ secerniculo traiecta sit
decocto chamædryos, cassuthæ, hys-
sopi, stæchadis, artemisiæ, anisi, gly-
cyrrhizæ, & vuarum passerarum, cui
addatur diaphœnicon. ʒ. ʒ. serapii ex
radicibus sine aceto. ʒ. i. fiat potio, ad-
dere prædictis potes eclegmatis in-
di. ʒ. i. Agarici electi. ʒ. ʒ. zingiberis. ʒ.
i. salis gemmæ, grana sex, macera
agaricum, zingiber & salem in sero
caprillo addita vncia vna mellis ro-
facei horis duodecim, deinde fortis
fiat expressio, cui adde cassiam fistu-
larem & eclegma.

SIBILIS FLAVA.

℞. Medullæ cassiæ fistularis, seu
mannæ. ʒ. i. excipiaturo decocto adiā-
ti, Florum buglosæ. Viol. prunorum
& thamarindorum, adde eclegma-

DE MORE. MVL.

tis ex rosarum succo, vel confectio-
nis ex rore syriaco. ʒ. 2. ꝑ. syrapi, viol.
ʒ. ꝑ. cōfice potionem. Loco eclegma-
tis ros. potes addere rhabarbari im-
mersi in fero caprillo cum vini albi
momēto. ʒ. 2. spicæ nardi grana sex,
immersio esto sex horarum.

AB ATRABILE.

ꝑ. Adianti, florum vtriusque bu-
glossi & viol. chamedryos, scolopē-
drii. an. m. ꝑ. vuarū passerum. ʒ. ꝑ. co-
quantur in fine decoctionis, adde e-
pithymi. ʒ. ꝑ. colamento solue medul-
læ cassiæ fistularis aut mānæ. ʒ. ꝑ. cō-
fectionis hamech. ʒ. 2. serapii viola-
cei. ʒ. 1.

CATAPOTIA.

SI PITVITA.

Aegineta Si crassus humor mordaxque sobo-
lem arceat, familiare atque amicum

præsidium est, maximè ex aloë contexta picra.

Si viribus valeat mulier. R^x. globulorum foetidorum 3. 1. scammonii grana. 2. excipe in globulos qui erui magnitudinem æquant serapiis pituitam destruentibus. Vel R^x.

Hieræpicræ. Gal. 3. 1. f. benedictæ. 3. 2. scammonii, interioris farcti colocynthidis. an. 3. f. digere in globulos excipiendo serapiis pituitam attenuantibus, detur incoenatæ ad cubile.

SI BILIS FLAVA.

Catapotia aggregatiua, Globuli ex rhabarbaro.

SI BILIS ATRA.

Pilulæ ex lapide cyaneo, quem lazulum vocant.

CATHARTICVS BV-
cellatus, & eclegmata aluum

subducentia.

Si pituita, diaphœnicon, Eclegma indicum, Eclegma diacnici hoc est cartami, Hieralogodion, Hiera ru-
fini. ℞. diaphœnicon, vel ecleg-
matis indici. ʒ. f. sacchari electi quā-
tum sit satis, confice bucellatū quod
auri bracteis tegatur. ℞. Rosarum,
cinnamomi. zingiberis. an. ʒ. i. santa-
lorum alborū & rub. an. ʒ. f. hermo-
daetylorum. ʒ. i. f. scammonii, rad. tri-
polii elect. an. ʒ. 2. mastiches. ʒ. i. sac-
chari candidi, lib. f. liquetur saccha-
rum artemisiæ limpidiore succo, &
bucellatos purgantes. ʒ. f. ponderan-
tes confice, exhibeto aliquando vnū
à cubili. Ex dictis pharmacis fria-
tis nonnihil cum cicerum arietino-
rum decocto, aut vino calido potui-
dare potes. Delphinii friati, quod
pulverem senæ uocāt. ʒ. 2. f. cum vi-

no, aut cicerum decocto dato.

SI BILIS FLA V A.

Rx. eclegmatis ex ros. succo, aut cōfe
ctionis de māna. ʒ. ʒ. ꝑ. ꝑ. sacchari quā
tum sit satis, bucellatum confice ca
tharticum auro bracteato velatum.

Si vitellina bilis, confectio ex
palmulis, quam *διαφενικῶν* vo
cant, Eclegma indicum.

Si atra bilis, Rx. confectionis ha
mech. ʒ. ʒ. ꝑ. ꝑ. sacch. q. f. confice bucel
lam purgantem.

VENAE SECTIO.

Si sanguis redundans sterilitatem
inducat, ex duabus saphenis ad pe
dis maleolos multus detrahendus
est sanguis, at si bilis flaua paucus:
nam bilis flauæ frenū sanguis est.

BALNEA, INSESSVS

& fetus.

Aegineta

Expedit perfrigeratis cum alia
quædam faciendo, tum pyriis om-
nibus, tum iis quæ è vaporibus fiût
calefactionibus reuocare calorem.
Ipsarum verò vuluarum fatus, par-
tim quidem vapores sedentibus in
sede constituunt, partim verò cali-
da aqua alluendo fiunt, in qua eli-
xa sunt saluia, artemisia, ruta, cype-
rum, pulegium, acorum, & quæ bo-
num emittunt odoris fluxum semi-
na.

Aegineta

SI PROPTER HUMI-
ditatem muliebrium locellorû, ex
re vsûque haud mediocriter sanè fu-
erit, ipsam quoque vuluam medica-
minibus acerbis tueri, è quorû nu-
mero habetur lentisci elixatio, &
myrtorum & rosarum, & rhu, præ-
terea mali punici floris, & rubi te-
nellorum, atque gallæ. Histerâ con-

rà aridiorem, lauacris curato. Si ex
crassiori humore mordacique post
purgationē ex picra, serò lactis vul-
uam eluere amicū præsidiū est.

Si pituita. Purgata pituita si præs-
stet viribus mulier, lauacris natura-
libus lauetur, à cuius egressu mithri-
datidis confectionis. 3. i potui detur,
talibus balneis lauetur diebus decē
aut quindecim. Balneorum natura-
lium loco, tale lauacrum confice,
quod 19. Artemisæ, betoni-
cæ, chamædryos, chamæpithyos,
chelidonii, callitrichi, foliorum
lauri, maluæ, maioranæ, apia-
stri, origani, ocyni, pulegii, rorisma-
rini, zingiberis, sabinae, vtriusque
stæchadis, vitis albæ, hyperici, hysso-
pi, chamæmeli, fertulæ campanæ.
an. m. 2. carei, cymini, sileris monta-
ni, anisi, seminis anethi. an. 3. 3. semi-

t

nis lini, foenigræci. an. 3. 2. rad. symphyti, rad. valerianæ, rad. petroselinis. an. lib. 1. ex his confractis fiat decoctio, & ex pharmacis decoctis sacculus impleatur, cui in balneo mulier infideat, lauetur mulier bis in die à cubili scilicet & ad cubile, diebus decem saltem, renouando pharmacam & decoctionem.

SIBILIS FLAVA.

Rx. Maluæ vtriusque cum radicibus. an. m. 3. foliorum violarum, salicis, vitis vuas albas portantis, rosarum, nymphaeæ. an. m. 2. foliorum malorum cotoneorum. m. 3. foliorum ulmi. m. 1. foenigræci. lib. 1. coquenda curato: decocto tepido infideat mulier ieiuna, & ad cubile, discoperto folio cauendo sudorē. Ex decocti herbis sacculus repleatur, cui

insideat mulier. Ex dictis herbis
euaporatorium constitui potest.

SI ATRA BILIS.

Chamæmeli, fertulæ campanæ, cha-
mædryos, chamæpithyos, hyssopi,
foliorum lauri lauendulæ. an. m. 2.
artemisiæ. m. 4. althææ cum rad. m.
f. feminis lini, fœnigræci. an. lib. r.
rad. valerianæ. lib. r. f. conterantur,
& in sacculum indantur, coquan-
tur, decocto lauetur, & sacculo insi-
deat mulier.

SI EX SOLA SIC- citate.

Arietum plura capita in vase æ-
neo quoadusque caro ab ossibus spō-
te separetur decoquenda curato,
quibus decoctis adde, vt coquatur,
foliorum vitis, salicis, violarum,
chamæmeli, meliloti. an. m. 2. althææ

DE MORB. MVL.

cum rad. m. f. fœnigræci, seminis li-
ni. an. lib. 2. rad. valerianæ. lib. 1. f. In
tali decocto sæpissimè mulier bal-
neetur.

ECLEGMA TA.

Si pituita. A balneo mithridati-
dis. 3. 1. ex vino detur. R. Tri-
pheræ magnæ sine opio, pliris cum
mosco, diambaris, diasatyrion. an. 3.
f. ramenti eboris, seminis mercuria-
lis. an. 3. 2. coaguli leporini & matri-
cis eiusdem. an. 3. f. feseleos. 3. f. sac-
chari albi. lib. f. saccharum solue li-
quore stillatitio apiastri, quūque sac-
charum probè coctum fuerit, adde
conseruæ corticum mali citrii. 3. 1.
conseruæ florum rorismarini. 3. f. &
id in quadras digere pond. 3. 2. f. da-
to à balneo vnam.

SI BILIS FLAVA.

Purgato humore noxio hora ante ci-

ibi sumptionem exhibeatur mulieri
quadrarum sequentium vna. R.

Friamenti trium santalorum. 3. 2 ra-
menti eboris, visci querni, friamen-
ti pudendi tauri, vuluæ leporis. an.
3. 2. sacchari candidissimi lib. 6. sac-
charum rosacea liquetur, & inde
quadræ conficiantur pond 3. 3.

Vel, R. Conseruæ rosarum. 3. 1.
conseruæ florum nymphaeæ, & florū
vtriusque buglossi. an. 3. 3. diarhodon
ex abbate, conf. triū santalorum, cō-
fectionis manus christi cum perlis.
an. 3. 1. f. fragmentorum lapillorum
communium qui in pretio ab offi-
cinis habentur. 3. 2. feminis mercu-
rialis. 3. 1. f. ramēti eboris, visci quer-
ni, friamenti pudendorum tauri, ma-
tricis leporis. an. 3. 2. confice confe-
ctionem, quam serapio adianti ex-
ceptam auro tege, dato cochlear

t iii

ante prandium & tantumdem ante
coenam, & etiam à balneo.

SI EX SANGVINE.

Postquam lota fuerit mulier in
aqua in qua coriarii coria parant,
quæ huic negotio accommodatissi-
ma est, sumat quadram aut orbicu-
lum eclegmatis, quod Rx.

Cinnamomi, seminis mercurial.
rosarum rub. ramenti eboris, mar-
garitarum. an. ʒ. ʒ. corallii rub. frag-
mentorum lapillorum præciosorum
cōmuniū. an. ʒ. ʒ. omniū santalorū. ʒ.
f. sacchari. lib. f. liquetur saccharum
aqua in qua extinctum sit aurū aut
chalys. cum. ʒ. ʒ. confervæ ros. con-
fice quadras aut orbiculos pond. ʒ. ʒ.
Vel ante cibum quemlibet sumat
eclegmatis sequentis cochlear.
Rx. Confervæ ros. antiquæ. ʒ. ʒ. con-

conservæ florum vtriusque buglossi. an.
2. trium santalorum, diarhodon ab-
satis. an. 3. 2. prædictorum puluerū.
3. pannos auri. 12. misceantur cum
terapio viol.

SI ATRABILIS.

A balneo exhibeto mulieri melan-
cholicæ orbiculum, aut quadram
vnam eclegmatis sequentis.

℞ Eclegmatis ex gemmis. 3. 2. fe-
minis mercurial. ramenti eboris. an.
3. 1. pudendi tauri, coaguli leporini
& eiusdem matricis. an. 3. 2. sacchari
lib. 6. saccharum liquore stillatitio
liquetur, adde conservæ buglossi. 3.
1. misce. adde etiam cinnamomi tri-
ati. 3. 1. digere in quadras aut orbicu-
los.

SI EX SOLA SICCI-

tate.

t iiii

A balneo quadram eclegmatis sequentis dato.

Rx. Specierum diarhod. abbatis. 3.
2. feminis mercurial. rasuræ eboris.
an. 3. 2. matricis leporis. 3. 2. feminis
coti, tragacantes, commi. an. 3. f.
sacchari in liquore stillatitio, buglos
si soluti lib. f. conferuæ florum vtri-
usque buglossi. an. 3. 2. digere arte &
igne in quadras pond. 3. 3.

PESSI.

SI PITUITA

Rx. Artemisiæ, sabinae, maioranæ,
dictanni, absinthii. an. 3. f. anisi, am-
meos, rutæ, corticis thuris. an. 3. 1.
interioris farcti colocinthidis. 3. 2. in
tenuissimum pollinem redacta suc-
co mercuriali aut chamædryos exci-
pe, & in raro panno indatur noctu-
que in locellos immitte, quotidie

centem pessum indere potes, quod
redundantes succi exhausti fue-
runt, quibus siccatis talem intromit-
te pessum, ne rursus ad vterum de-
scendat pituita.

Rx.

Acaciæ, balaustiorum, calycum
glandium, scorix ferri, lycii, men-
sæ, corticis arboris ex qua desumi-
tur mastiche, corticis libani, semi-
nis ros. rhus coriariæ, fructus spicæ.
an. 3. f. friato, & labri veneris aut
oxallidis, aut millefolii succo exci-
pe, & in pessos redige, qui continuè
aliquot diebus sunt deferendi: præ-
dictis tartari friamentum addere
potes, cui vis mira doctorum testi-
monio inest, etiam si ore sumatur.

SI EX BILE FLAVA.

Rx. Medullæ, cruris vituli, cerebri
cerui, butyri vaccini, adipis capra-

rum, feminis mercurialis. an. ʒ. f. a-
 caciae, hypocystidis, fantal. rub. sta-
 ctes, cornu cerui vsti. an. ʒ. 2. oleo ro-
 faceo & lanæ floccis in pessos exci-
 pe.

SI EX SANGVINE.

℞. moschi grana sex, fantal. mos-
 chell. rosarum rub. an. ʒ. f. olei. rosa-
 rum. ʒ. 1. f. diu in mortario pistillo
 ducantur, & cotum teretis modo
 formatum his illinatur & indatur.

SI EX AT RABILE.

Pessi fiant ex costo friato, oleo rosa-
 ceo, foenigræco, anatis adipe, semi-
 ne asparagi, anseris adipe, oleo vio-
 laceo, moscho. &c.

SI EX ARIDITATE

SOLA.

℞. Medullæ crucis vaccini, adipis

linæ. an. 3. f. stactes. 3. 2. cum lana
confice pessos, quibus potes addere
ei amygdal. dulciū. 3. 4. & immit-
tere aut iniicere.

NIICIENDA PER ME-
tranchytum.

SI EX BILI FLAVA.

℞. Rerū in pello pro choleris de-
scriptorum 3. 1. aquæ rosarum, &
olei rosacei. an. 3. 3. misceatur & ini-
ciantur.

SVFFITVS.

SI EX PITVITA.

℞. Pilulorū cypressi, mastiches, thu-
ris, ladani, myrrhæ, chalbanes, bac-
carum lauri, bdelli, styracis, stactes.
an. 3. 2. ambaris. 3. f. frangatur, & his
mistis ad cubile per infundibulum
mulier suffiatur. Vel, ℞. Ladani

puri. 3. 1. styrac. 3. f. caryophyllorum,
 agallochi, fabinae siccae. an. 3. 1. f. am-
 baris. 3. f. moschi, grana. 4. cū pistel-
 lo calido fiat pastilli ex quibus vnus
 in prunas ardentes iniectus, per in-
 fundibulum suffiatur mulier.

Si diues sit. R. styrac. gabalites.
 3. f. agallochi, ambaris. an. 3. 2. balsa-
 mi. 3. 1. moschi. 3. 1. digere in pastil-
 los, & suffiatur mulier, orbiculo vno
 in carbones candentes iniecto.

Vel, R. rosarum rub. thuris, masti-
 ches, myrrhæ, sanguinis drac. glebæ
 armeniacæ, fructuum myrti. an. 3. 2.
 styracis. 3. 1. ladani. 3. f. ambaris, mos-
 chi, agallochi, caryophyllorum, bal-
 sami, spicæ nardi. an. 3. f. terentur in
 pollinem tenuissimum terenda, &
 cum pistello calido digere in pastil-
 los, quorum vno in carbones inie-
 cto suffiatur sterilis, post suffitum

rosacea (in qua maceratum sit mos-
chum) os vteri illine, subinde fu-
uat. Vel, ℞. agallochi. cinna-
nomy. an. ʒ. i. f. caryophyllorum, cy-
peri zingiberis, nucis moschatae.
an. ʒ. i. rad. bistortae, gallarum, alu-
minis rochae. an. ʒ. 2. moschi. ʒ. f. con-
fringantur, & inde fiat suffitus.
Sagzeneae sine opio Auicennae, aut
serapionis accommodatur, si ex ea
fiat suffitus. Aipta item moscha-
ta. Gallia moschata.

SI EX BILE.

℞. omnium santalorum. an. ʒ. i. ro-
sarum rub. florum nymphaeae & vio-
larum. an. ʒ. i. styracis. ʒ. 2. Ambaris.
ʒ. i. terantur, & rosacea excepta in
pastillos digerantur pro suffitu.

EMPLASTRA ET
cataplasmata.

Extra balneum assidue defera
hoc emplastrum pubi admotum
quod R̄. Emplastri ceronei. ʒ. 2. lada-
ni puri. ʒ. 1. f. galliæ moschatae, alypta
moschata. an. ʒ. f. excipiantur om-
nia oleo nardino, & inde concina-
netur emplastrum rotundum.

Vel, R̄. Ladani puri. ʒ. 1. thuris
mastiches. an. ʒ. 2. spicæ nardi, caryo-
phyllorum, ambaris. an. grana. 15
cera excipiantur sufficienti & oleo
nardino in emplastrum, quod exte-
sum in panno serico, rub. epigastrio
imponatur, locellos enim confor-
tat, & eos conceptui parat.

Cataplasmate mederi expedit ha-
rum rerum quæ bonum emittunt
odoris fluxum, unicuique pectinea.

Conducit non minus Polyarchium
epithema.

Frictio porrò pectinis atque co-
stendicum nulli quouis alii medi-
camento bonitatis honore & utili-
tate cedit.

CONCEPTIO, FOE-
tus generatio, impregnatio.

Conceptio est attracti à locellis
seminis cōmistio, in sanguinis mè-
strui puriori parte, in quam locello-
rū calor natiuus ita agit, quòd viui-
ficato seminis genitalis calore, de-
mū foetus generatio sequitur.

Foetus generatio, est virilis seminis
cum mēstruo sanguine tam diutur-
na actio, quo ad materia illa formā
recipiat humanam.

Ita auidè iniectum semen vterus
retinet, vt os ipsius internum ita ad-

stringitur, quod nec minimū quidē
feminis aut sanguinis menstrui exi-
re potest.

Sex primis diebus lactis similitu-
dinem semen utero detentum re-
fert, nouem diebus sequentibus in
sanguinem vertitur.

Duodecim aliis diebus caro effici-
tur. Decem tandem & octo die-
bus reliquis membra omnia for-
mantur.

Sex in lacte dies, tres sunt in sangui-
ne terni.

Aegidii versus.

Bissenī carnem, ter senī mem-
bra figurant. Vel, Inie-
ctum semē sex primis certē diebus.
Quasi lac, reliquis nouē fit sanguis,
ac inde Solidat duodenus dies,
bis nonāque demum Effugiat, tē-
pūsque sequens producit ad ortum.

Formato foetu (inquit Auicenna)
duplicato tempore mouetur, & sub-
inde duplicato tempore motus, fo-
etus ad ortum venit.

Auicenna libro nono de Anima
libus, imprægnationis tēpus in sep-
tem æquales partes diuidit: Prima
quarum formationi, duæ motui, &
quatuor aliæ partui correspondent,
Tempus enim motus contra tem-
pus informationis prorsus cōdistin-
ctum ei duplū fit, verbi gratia: Si in
30. die foetus formatus sit, eo dupli-
cato. 60. continuè, cui si triginta ad-
dideris 90. habebis, quibus. 90. die-
bus tres perficiuntur menses, & tūc
foetus moueri incipit, deinde dupli-
cato motus tempore, quod. 60. con-
stat diebus, seorsum à formationis
tempore si sumas, dies. 120. erūt, qui
menses quatuor constituunt, & his

præcedentibus additis, foetus ad or-
 tum veniet. Ex quibus sequitur in
 30. die formatus in. 7. mense nasci,
 pari modo de aliis dicendum. Ex
 dictis sequitur naturalem partum
 decimo aut vndecimo mense saepe
 fieri posse.

Astrologi moram foetus in vtero
 aliter scrutati sūt authore Ptoletheo
 in centilocui propositione. 51. Lo-
 cus (inquit) lunæ in natiuitate ipsius
 gradus ascēdētis est hora casus sper-
 matis, & locus lunæ in hora in qua
 cecidit semē est gradus ascendentis
 in hora natiuitatis: & quia tempus
 inclusum inter ascendentem nati-
 uitatis, & lunæ, casus seminis, horam
 & locum lunæ, hora natiuitatis va-
 riationem quandā recipit. 3. in vte-
 ro moras foetus distinctas inuenerūt

prædictis temporibus mensuratas,
maiores scilicet, mediam & mino-
rem. Maior siquidem dierum. 288.
existit, qui menses nouem, & dies
8. constituunt. Media dierum. 173.
existit, quibus perficiuntur menses
nouem, & dies. 3. Minor dierum est.
258. menses. 2. & dies. 18. perficien-
tium. Cognita hora infusionis se-
minis genitalis in vtero, natiuitatis
hora cognoscitur.

Astrologorū somniis ne sis plus
quàm par sit intentus, nam eo-
rum sententia sequeretur septimi,
octaui & vndecimi mensis partum
præter naturam existere sicque na-
tum non viuere, quoniam talis par-
tus fit influxa super cælesti obuian-
te, qui (vt notum est) tanquam vni-
uersale agens plus in causatū, quàm

in particularia agentia influit.

Octauo mense natus aliquando vixit autore Aristotele lib. historia-
rū animalium. 2. Foetus formationes
peculiares ita partiuntur Astrologi.

Quanquam Saturno totum tri-
buant imperium secūdam materiæ
diuersam dispositionem, planetas ta-
men ad talem actionem concurrere
affirmant, nam (ut dictum est) in cō-
ceptione materia simul adimatur,
cōstānsque fiat oportet, talis opera-
tio Saturno tribuitur, cuius est sicc-
itate & frigiditate materiam cogere,
coactāque cōstātē facere, hōcque ita
protēditur, quoadusq; à locellorū ca-
lore, seminis genitilis calor valēs in
generationis agat materiā. 2. opera-
tio Ioui attribuitur, cuius est mediā
te spiritu hominē viuificare. 3. Marti,
cuius caliditate & siccitate mem-

prorum vires roborantur, præsertim materiam illam firmat, qua tria mēbra principalia gignuntur in secunda, & hæc operatio. 7. dies desinit. Subinde sol instuit in illam materiam, vt foetus ad locum conceptionis materiam illam talem ac tantam attrahat, quantum satis sit ad principum membrorum augmentationem, & inde animam recipere valeat, quod in triduo perficitur.

Veneri operationem quintam adscribunt, cuius est, externa membra formare, quæ lunæ influxu variè disponuntur, & hæc operatio diebus nouem perficitur. 6. Mercurius proinde oculos, aures, nares, & vocis instrumenta procreandi facultatem ministrat, tuncque caput & in ipso capite contenta finguntur, & sensus instrumenta recto situantur

ordine, caput ab humeris separatur
 & hæc omnia dies expetunt duodecim.
 7. Luna que humidis præest
 talem influit facultatem, vt ad con-
 ceptionis locum humiditas tanta
 trahi possit, quòd mēbra omnia for-
 mam debitam recipiant, huius ope-
 ratione foetus completur. Hæc
 diffusius scripta offendes in astrolo-
 gorum libris.

A casu seminis in vterum, vsque
 ad foetus ortum, planetæ in hunc ab
 astrologis aliter influere dicuntur
 quum quilibet peculiari domine-
 tur mensi, quemadmodum & plan-
 tis. Primum mensem Saturno tri-
 buunt, & seriatim reliquis planetis
 menses sequentes dicant. Saturnus
 enim frigore & humore peculiari
 materiam cogendo constantem fa-
 cit, naturæque tribuit vegetatiuam.

Concreta coactaque materia, aloue,
cuius est viuificare omnes spiritus,
formandi membra vigorem recipit,
& hoc secundo mense. Tertius Mar
ti, qui tria principalia membra suo
calore formando, caput à cæteris se
parat membris, brachia quoque &
crura formando, ab inuicem diuidit
quum in ipsis adhuc nullus (vt vo
lunt phyci) existat vitalis spiritus.

Spiritus vitalis à Sole in cor de
fluit, cor autem aliis membris vite
spiritum ministrat, sicque foetus mo
uetur sentitque. In quinto mense
veneris virtute membrorum exter
norum lineamenta quædam perfici
untur ac formantur, puta, nares, os
virorum mulierumve pudenda, pe
dum manuumque & digitorum se
cretio. Sextus mensis Mercurio di
catus est, qui facultatem habet fa

v iiii

bricandi vocis instrumenta, supercilia & oculos, augendique capillos & ungues. 7. Luna præest, quæ in nata humiditate, corporis foetus vacua replet loca, tuncque perfectus est foetus. 8. Mensi dominatur Saturnus, qui hoc mense natos interimit fetus: nam quidam planetæ secundum ambas qualitates vitam amicabiliter largiuntur, uti Venus & Iuppiter. Quidam secundum vnam tantum, ut luna, Mars. Et quidam utraque qualitate vitæ contradicunt, ut Saturnus. Si tamen foetus natura fortis valentisque virtutis fuerit, matre etiam viribus valente (autore Arist. histor. animalium lib. 8.) in octauo natus viuet. Nono mensi Iuppiter præest iterum, qui utraque qualitate vitæ amicus, foetum viuificat, ipsiusque vitæ princi-

ipia fouendo, vitalem auget spiri-
tum, quamobrem partus ille lauda-
tissimus censetur. Mars decimo do-
minatur vna qualitate amicus vitæ,
natus igitur in hoc mēse puer iterdū
viuit. Sol vndecimo præest, vitā na-
to influit, sicque in ipso natus viuit.

Si ad duodecimum mensem pueri
natiuitas protendatur (quanquam
rara sit auis, nec vnquam vidi, ne-
que legi) viuet puer, cum tūc venus
vitæ amica dominium resumpserit.

Docere cupio, quid Pythagoras Cēfori-
de numero dierum ad partus perti- nus de
nentium senserit. Primum genera- dienatali
liter esse partus omnino duos dixit: c. 12. ex
Pithago.
Alterum minorem, quē vocant sep-
timestrem, qui ducentesimo & de-
cimo die post conceptionem exeat
ab utero. Alterum maiorem deci-

mestrem, qui edatur die. 274. Quo-
 rum prior ac minor senario maxi-
 me continetur numero. Nam quod
 ex semine cōceptum est, sex (vt ait)
 primis diebus humor est lacteus:
 deinde proximis octo sanguineus.
 Qui octo quū ad primos sex acces-
 serunt, faciunt primā symphoniam,
 Diatessaron. Tertio gradu nouem
 dies accedunt, iam carnem facien-
 tes. Hi cum sex illis primis collati,
 sescuplam faciunt rationem, & se-
 cundam symphoniam diapēte tum
 deinceps sequētibus duodecim die-
 bus fit corpus iam formatum. Ho-
 rum quoque ad eosdem sex collatio
 tertiam diapason reddit symphoni-
 am duplici ratione subiectā. li qua-
 tuor numeri. 6. 8. 9. 12. coniuncti fa-
 ciunt dies. 35. Nec immerito sena-
 rius fundamentum gignendi est.

Nam eum τέλειος græci, nos autem perfectum vocamus: quod eius partes.3, sexta & tertia & dimidia, id est vnus, duo, & .3. eundem ipsum perficiunt: Sed vt initia feminis & lacteum illud conceptionis fundamentum, quod est quinque & triginta dierum, sexies ductum, cum ad diem.210. peruenerint, maturum pro creatur. Alter autem ille partus qui maior est, maiore numero continetur, septenario scilicet, quo rota humana finitur:& vt Solon scribit, & Iudæi in dierum omnium numeris sequuntur, & Hetruscorum libri Rituales videntur indicare. Hippocrates quoque alique medici in corporum valetudinibus non aliud ostendunt, nam septimum quemque diem crisimon obseruant. Itaque vt alterius partus origo in sex est diebus,

post quos semen in sanguinem ver-
 titur, ita huius in septem: & ut ibi
 quinque & triginta diebus infans
 membratur, ita hic proportio est die-
 bus ferè. 40. Quare in Græcia dies
 habent quadragesimos insignes: nã-
 que prægñans ante diem. 40. nom-
 procedit infanum, & post partum
 40. diebus pleræque foetæ grauiores
 sunt, nec sanguinẽ interdum con-
 tinent, & paruuli ferme per hos fere
 morbidj sine risu nec sine periculo
 sunt, ob quam causam cum is dies
 præterit, diem festum solent agita-
 re, quod tempus appellat *τεσσαρά-
 κοςον*. Ii igitur dies. 40. per. 7. illos
 initiales multiplicati fiunt dies. 280.
 id est, hebdomades. 40. Sed quoniã
 ultimæ illius hebdomadis primo
 die æditur partus, sex dies decedũt,
 & 274. obseruantur. Qui numerus

hierum ad tetragonum illum Chal-
laeorum conspectum subtiliter con-
gruit. Nam quū signiferum orbem
diebus. 365. & aliquot horis sol cir-
cumeat, quarta necesse est parte
empta, id est diebus. 72. aliquot-
que horis. 3. quadras reliquis diebus
274. non plenis percurrat, vsque
dum perueniat ad id loci, vnde con-
ceptionis initium quadratus aspi-
ciat. Vnde autem mens humana
dies istos commutationis speculari,
& arcana naturæ rimari potuerit,
nemo miretur. Hæc enim frequens
medicorum experientia peruenit:
Qui quū multos animaduernerent
semen non retinere conceptum, cō-
pertum habuerunt, id quod intra sex
dies septēve eiiciebatur esse la-
cteum, & vocari ἡκρυνον, quod
postea autem, sanguineum, idque

ἐκ τῶν αὐτῶν appellatur. Qui verò
ambo partus videntur paribus die-
rum numeris contineri, Pythagoras
imparem laudat, tamen à secta non
discrepat. Duos enim impares. 209
dicit expleri, ad quorum consumma-
tionem aliquid ex sequentibus acco-
dere, quod tamen diem solidum nō
afferat, cuius exemplum videmus
tam in anni quàm mensis spatio, fer-
uasse numerum, quū & anni impa-
rem dierum. 365. numerum aliquan-
to cumulauerit, & mensi lunari ad-
dies vnde triginta aliquid addiderit.
Nec verò incredibile est ad no-
stros natales musicam pertinere.

Gal. lib. 1
defi.

Non est pars parentis foetus ip-
se. Nam hoc pereunte necesse esset
illum quoque emori, vel edito, fun-
ctionum offensam capere tanquam
deficiente aliquando parte, suo cor-

ore priuata.

Nutritur foetus in locis comprehensus & inuolutus, atque coactus, Nutrimentum numquam per os, sed per vmbilicum capit. Quidam autem animal, alii autem minime dixerunt. Qui animal esse dixerunt, ex motu ipso ita esse conieciarunt: nam mouetur foetus, & delectari videtur, quum mater gaudio afficitur, eademque affecta, contrahitur tristitia, & cogitur vt animal sensibile. Hac enim sensibilitas cui alteri est quam animali. Alii autem non animal esse dixerunt: nutriri vero & augeri volunt vt stirpes, aut arbores, neque aut motum voluntarium, aut inuoluntarium habere, quemadmodum animalia. Non enim suapte voluntate mouetur, sed vt arbores & plantae. His autem motus causa

sanguinis expers est, foetibus autem
ibi contenta humiditas, & lapsus,
atque figura vuluæ. Quum enim ple-
na est, rotundæ instar pilæ aggloba-
tur, rotunda quidem ad omnē mo-
tum nata & idonea, stare nesciens.
Asclepiades autem neque animal,
neque non animal esse, factum in
vtero matris declarat, sed dormien-
tibus ac sopitis simile. Quemadmo-
dum hi sensus habent, sed non utū-
tur, sic qui in vtero sunt. Gigni-
tur quidem masculus secundum a-
liquos, quū id quod ex dextra qui-
dem parte auulsum semen est des-
cendit in vuluā aut locos: foemina
verò quum id quod à sinistra. Alii
autem dixerunt propter propriam
seminis commissionē, vel propter
caliditatem, aut frigiditatem gigni.
Calidius enim semen marē progi-

inquit, frigidius verò foeminam. Gemelli, & tergemini secundū aliquos propter calidū semen in locos contractum, atque ibidem decisum, sic nim gemellos & tergeminos fieri iunt. Alii autem comprehensiones causatur, nos verò dicimus, quòd si decisum sperma defluerit in locos binos, tūc gemellos, si in.3. tunc tergeminos. Sed qui septimo mense nati sunt foetus, viuunt, octauo nequaquam. Octo, numerus recens est coniunctus, non autē iudicatorius, Septem, numerus superfluus, & non coniunctus, sed iudicatorius.

CAVSAE CONCEPTIONIS.

Causæ conceptionis est, moderata locorum caliditas, necnō recens menstruorū purgatio, & appetitus

Gal. lib.
defi.

libidinis : quum enim hæc concurrunt, semen continetur.

5. apho.

40.

Gal. in
cōmenta-
rio præ-
dictæ sen-
tentia.

Fœtus, mares quidē in dextris, fœ-
minæ verò in sinistris magis, Quod
propter temperaturā, quæ statim ab
initio calidior existit, fœtus mascu-
lus generatur, in cōmentariis de se-
mine est demonstratū: calidior verò
tēperatura fœtibus aduenit nō mi-
nimè ob locum qui est dextra vteri
pars. Hic autem ipse calidior existit,
propter hepatis vicinitatē : confert
autem aliquid ad conceptus calidi-
tatem & muliebre semen, profusum
quidem ex propriis testiculis per
vtrumque corniculum, pars vna in-
dextrum vteri sinum, pars altera in
sinistrū, dissimiles autem ambæ, vt
& hoc ipsum ostendimus. Siquidem
ferosior est atque frigidior quæ in
sinistro testiculo continetur, & iux-

hoc cōceptus in læua partæ vteri
constitutus, non absque ratione es-
t frigidior

NOTAE.

Si mulieri cessent purgationes, s. Aph. 61
neque febris, neque rigor superue-
nient & fastidia incidunt, iudica ip-
sam in vtero habere.

A conceptu decimo die, dolores
capitis, oculorum vertigines tene-
bræque, fastidium in cibis, redunda-
tio stomachi indices sunt hominis
conchoati. Melior color marem feren-
ti, & facilior partus, motus in vtero
40. die. Contraria omnia in altero
sexu, Ingestabile onus, crurum & in-
guinum levis tumor. Primus autem
20. die motus, sed plurimū languo-
ris in vtroque sexu, capillū germi-
nante par u, & in plenilunio, quod
tēpus ædi os quoque infantes præ-

Pli libro
7. c. 6.

cipue infestat, adeoque incessus, a
que omne quicquid dici potest in
grauida, refert: vt falsioribus cibi
vsa, carentem vnguiculis partun
ardant.

Aegineta — Foeminas vtero gentes eiusmodi
di magna ex parte casus affligun
corporis fere totius redundantia
moles, iugis vomitus, sputatio, ero
siones stomachi, & horror denique
cibi.

Si in futuitione vterus sugges
do, glandem valenter traxerit, vir
mulierque simul semen emiserint,
nec mulier quomodo viri semen
abiecerit, sed intra locellorum ali
quem sinum detinuerit, indica hac
vtero gerere, proinde si pigra semi
sopitaque sit mulier, dolore item si
feriat inter vmbilicū & foemur, par
noque horrore afficiatur, hac vtero

rit. Procedente tempore futue-
renuit, vel non ita libenter rem-
allic veneream, à futuitione pau-
am sentit in epigastrio dolorem,
que semen emittit, menses sta-
to tempore non destuunt, adest
ertigo, & visus hæbetudo, palpita-
o ac tremor cordis, pica, vomitio,
onnunquam color mutatur, pan-
i & lentigines in vultu, & aliæ cu-
s defœdationes sequuntur, palpe-
ræ mollescent, oculi cōcaui, pupil-
e attenuantur, coniunctiua oculi
ugetur, quamobrem atrocibus ocu-
is cernere dicuntur, dorsum quan-
doque & ilia dolore afficiūtur, præ-
dicta symptomata mulieres ad quar-
tum vsque mensem torquent, sub-
inde sensim minuūtur. Si velis nos- s. aph. 41.
cere an conceperit mulier, quū dor-
mitura est, ei aquam mulsam potan

Gal. in
commen-
tario.

dam da, & si alui tormina patie-
tur, concepit, si minus, non cōcepit.

Tormina fiunt quidem & propter
mordacitatem, fiunt autem & prop-
ter spiritum flatuosum, qui facilen-
tē nō habet exitum, quæ etiam tormi-
na fieri nūc est arbitrandum in mu-
lieribus quæ conceperunt, propter
eam quæ fit ex vtero agustationem.
Dat autem aquam mulsam mulier
dormitura, crudam videlicet, quo-
niam qualitas flatuosa si noscere vo-
lumus, est necessaria, volēs & quies-
cere simul & plenam esse cibis mu-
lierem. Hec enim ambo conferunt
ad torminum generationem.

Auic.

Misc. igitur. 3. 2. mellis æquæ por-
tioni aquæ cælestis, & potui dato,
tunc enim si matrix foetu plena, in-
testina compressa tenet, dolore pun-
gente mulieris aluus afficitur.

Vt certò scias an vtero gerat, an masculū aut foeminā cōceperit, Sumito urinā mulieris collectā in vase mundo obturato, ne aēr subintret viriduum, deinde pāno lineo mundo hāc traice, siquidē in panno infecta quædā pediculorū quantitate appareāt, cōcepit, si infecta rubescāt masculū peperit, si albescant foeminam. Acus polita madeat noctu in mulieris lotio in aneo vase, si maculis varis et coloribus tingatur acus, peperit mulier, masculū si maculæ rubescēt, quòd si non vtero gerat, acus nigra aruginosaque est.

Mola & foetus gestatio talibus discernuntur notis. Mensibus ordinatè fluentibus conceptio fit, mola non ita. Mola ante mensem tertium mouetur, in conceptione nunquam. In mola statim alius tu-

x iiii

mescit, contrà in vtero gerentibus.
 Foetus sepiissime à loco in locum
 mouetur, at mola sine cōpressione,
 aut mulieris motu non mouetur,
 aut rarò. Manus cōpressione
 violenta mouetur mola, deinde ad
 propriam tendit sedem: sed foetus
 ex tali cōpressione aliquando mo-
 uetur & aliquando non. Alius du-
 rior est in mola, quàm in foetus ge-
 statione. Velocior est vtero gerens
 quàm molâ vexata. Et si alius in
 mola tumescat, māmæ tamen gra-
 cilescent mollescuntque, contrà in
 prægnante.

Mola aliquando in vtero manet
 vsque ad annum quartum, at vtero
 gerens parit, saltem in vndecimo.
 Sunt qui dicant nihil de vteri gesta-
 tione ex lotio cognosci posse.

NOTAE CONCEPTIO-

nis ex lotio.

Auicenna tradit urinam in imprægnationis principio citrinam esse ac subalbescentem, in cuius medico stoci cotti quasi residere videntur. Urinam puram limpidamque ac subtilem, in cuius summo nubes persistit, cum atomis ascendentibus & descendentibus, utero gerere mulierem scribit. Auicenna significare. Refert item quod moto vase si turbetur urina, imprægnationis finem notat, contra principium. In fine conceptionis rubor ibi apparet, ubi primum albedo inerat.

Alii asserunt urinam utero gerentium tribus primis mensibus sanguinis colorem referre, & in se quasi quasdam nebulas, & sedimentum album habere. Cæterum in quarto

mēses & deinceps viridis ac ceræ
esse coloris cum liuenti sedimento.

NOTAE EX PVLSV.

Pragnātis pulsus arteriæ in princi-
pio validus ac magnus erit, authore
Cōstantino, sed circa finem pariens
ac spissus tactu percipitur.

NOTAE SEXVS.

Si mulier masculum gerat colora-
tior est, ac moderati vultus, læta quo-
que, agilis, velox, sine ciborū, vt plu-
rimum, fastidio, & reliqua vtero ge-
rentium minima adsunt, si stans am-
bulare velit primo dextrum pedem
mouet, oculus quoque eius dexter
latus magis, ac motus est velocioris
sinistro, alius rotunda est, mamma
dextra tumidior, cuius papilla boni
est coloris à qua lac defluit. Si in so-
le lac dictæ papillæ speculo aut rei
bene politæ imponatur, rotundum

cernitur margaritarū aut argēti vi-
ui modo, quod iniiciatur lac ipsum
in aquam, aut in ipsius mulieris vri-
nam fundum petet, grauedo pōdūf-
que sentitur à muliere in latere dex-
tro, in quo & sepiissime mouetur.

Contraria accidunt, si mulier foe-
minam vtero gerat.

Nati venam vmbilicalē inspice, Auic. 21.
3. 2. c. de
causis ge-
minorū.
quot enim rugæ seu nodi in ea fue-
rint, tot iterum foetus mulier cōci-
piet, & si nulla nullū. Quod si ruga-
rū vna ab alia distās multū fuerit, in-
ter illos foetus nascituros longa erit
tēporis intercapedo, si vicinæ sit, citò
vtero geret. Rugæ item nigræ aut ru-
bræ masculos, albæ foeminas arguūt.

PREDICTIONES.

Vtero gerentes sunt medicandæ,
si materia turgēt, quarto mense, &
vsque ad septimum, sed has minus.

4. aph. r.

Gal. in
commen-
tario.

Inuiora autem & seniores vereri oportet. Ad uteros foetuum connexus eandem habent proportionem, quam fructus ad plantas. Hi siquidem in prima generatione debilibus capitulis contineantur, & ideo facile decidunt, quando vehementior ventus ipsos concusserit, post hac aucti difficilem habent à placentis dissolutionem, sicuti rursus quum perfecti sunt, sponte sua sine vi extrinseca decidunt. Eodem modo & conceptus, in primo quidem tempore seminis iniectionis, si aliquando saltare contigerit mulierem, aut in lubrico cadere, siue quouis alio modo, vel secundum animam, vel secundum corpus moueri vehementius, facillime disrumpuntur: sic quando & iam perfecti sunt. Tempore verò in termedio firmiore habent coalitum,

quare mulier vtero gerēs potest fortiores motus sustinere, sine foetus offensione. Quæ omnia Hippocrates noscens, rectè inquit: Vtero gerētes sunt medicandæ, si materia turget quarto mense vsque ad septimum, quod est in medio tempore foetationis, quum foetus vtero firmiter alligatur. Non tamen omnes quæ hoc tempore indigēt purgatione, permittit purgari: sed si materia turget, inquit, hoc est cogat accellerare, tractum enim vocabulum ab animalibus ad coitum concitatis, quum superabundantes humores mouētur, & per totū corpus deferuntur, nondum in aliqua parte firmati, tunc ad eos expellendos natura incitatur, & aliquo indiget manum porrigēte, & hunc humorum motum ad aluum deducente. &c.

Seranus.
Hipp. lib.
de foetu,

Hipp. lib.
de natu-
ra pueri.

Certo tempore mulier concipit,
aut incipiente sanguine, aut deficiē-
te. Saltus in primis, 7. diebus peri-
mit semem in locellis & eiicit. In-
fans nisi latū locum habeat, quo nu-
triat, agitur, crescat, macilentū
fieri necesse est, ut pote qui satis am-
plum locum ad incrementum non
habeat. Eadem ratio est, cur mo-
do parui modo magni nascantur in-
fantes. Semper fere sani & integri
ex mutilis generantur. Quemad-
modum cucumeres & arbores, &
alia quaedam germina, si compri-
mantur, & in angustiis creuerint lo-
cis, partim mutilæ, partim tortuosæ
proveniūt. Ita & foetus in utero, iux-
ta ea quæ matri cōtingūt, vel mutila-
tur, vel nō recte crescit. Mulier quū
concepit, semen extra locellos non
exilit. Foemina quum conceperit,

nenfes non defluunt, fi quidem fœ-
tus fanus futurus eft, præter quod
ouillum quibusdam primo mense.

Mulierem vtero gerentem ca- 5. ash. 30.
pi ab aliquo morbo acuto, letale eft. Galenus

In hoc enim duplex eft periculū:
Vnum quidem propter febrem ip-
fam fœtum occidentem: Alterum
verò quod ex longo interuallo ci-
bum dantes ex alimenti defectu fœ-
tum destruemus, fi verò vt ferue-
mus hunc non verebimur crebro
cibum exhibere, febres cōtinuas vi-
ctu intempestiuo augentes, mulierē
gravidā occidemus, sic & si absque
febre aliquis alius morbus acutus
fiat veluti morbus comitialis, mor-
bus attonitus, conuulsio, distentio,
propter magnitudinem morbi &
acutiem impossibile est laborantem
euadere.

5.aph. 3.1
Gal.

Mulier vtero gerens sanguine misso é vena abortit, & magis si foetus sit maior. Ex defectu alimenti foetus destruitur, non modò misso sanguine é vena, sed etiam ex lōgiori inadia. Non absque ratione autem & maior foetus magis destruitur misso sanguine ex vena mulieris, quia plurimo indiget alimento. Mulieri vtero gerenti si aluus plurimūm profluat, periculum est ne abortiat.

5.aph. 34

5.aph. 37
Gal.

Mulieri vtero gerenti si mammae graciles repente fiant, abortit. Hic pariter aphorismus ex illorum numero est, quos diximus defectum alimēti foetui significare. Cōmunes enim quaedam venae sunt māmīs ac vteris, quae vbi parum habuerint sanguinis, graciles quidem mammas ostēdunt, inadia verò nonnū-

quam foetum perimunt, nonumquā
verò ad excretionem excitant, illam
ob causam quam ipse in libro de na-
tura foetus per hæc verba explicat.

Alimentū atque auctio à matre ve-
niēs, non adhuc est sufficiens infan-
ti, quando decem menses præterie-
rint, & foetus auctus fuerit: trahit
enim à sanguine ad se id quod dul-
cissimum, simul autē & lactis par-
te aliqua fruitur. Vbi verò hæc il-
li rariora fuerint, & iam infans mo-
lem corporis habet, plus cibi requi-
rens quā illud quod adest, calcitrat
& membranas disrumpit. Liquet
igitur, quòd & ante decem menses
foetus est indigens alimento, & cal-
citans, & membranas disrumpans,
initium partus matri affert.

Mulierī vtero gerenti si altera s.aph.38.
mamīna gracilis fiat, geminos habē

y

si alterum abortit, & siquidem mārē
ma dextra gracilis fiat, mārē: si ve-
rò sinistra, fæminam.

s.aph. 43
Gal.

Mulier si marem concepit, bene colorata est: si verò fæminam, male colorata. Ut ad seipsam mulierem collata videlz, non autem ad alterā dictum est ab Hipp. indicium, quod ex bono colore ac malo sumitur.

Nam quæ fæminā concepit, minus seipsa colorata apparet, quoniam frigidior est fæmina mare: nunquam verò talem concepisset, nisi viri semen, vel uterus mulieris frigidior eo tempore fuisset, in quo concepit: quare quod dicitur, ex eorum numero est quæ sæpius eueniunt.

Contingit enim ita omnia recte agere mulierem post tempus conceptionis, quod bene colorata fiet. Liqueat autem, & quod alia signa sunt mārē

esse cōceptū, sicut ipsius conceptus plurimæ ac validæ motiones quæ nequæ ipsæ signa perpetua sunt. Cōtingit enim aliquādo licet sit rarum, quod cōcepta fœmina sit mare robustior, & multis ac validis motibus moueatur, & aliquādo mas sit debiliior fœmina, ac paucioribus debilibusque motibus cieatur. Si mulieri grauidæ invtero sit erisipelas, letale. *s. aph. 43*

Quæcunque præter naturam tenues existentes vtero gerunt, abortiunt priusquam crassescant. *s. aph. 44*

Quæcunque mediocriter corpora habentes abortiunt secundo aut *s. aph. 45* 3. mense sine occasione manifesta, his acetabula vteri plena muccoris sunt, & non possunt ex pondere fœtum continere, sed disrumpuntur.

Sine manifesta occasione aut febre vehemente, & alii fluxu, vel proflu- *Gal*

uio sanguinis, vel oryipelate in ipso vtero constituto, vel saltu grauidæ mulieris vehementiore, vel clamore, vel ira, vel timore, vel victu parciori, vel tali aliquo actu, seu passione. Fit enim verisimile in his esse plena mucore ora vasorum venientium ad vterum, ex quibus secundæ patent: quæ ora acetabula nominauit, non sicuti quidam arbitratur adnatas ipsis carnes adenosas.

Nam uti ipse inquit in primo lib. de passionibus muliebribus: Si acetabula plena fuerint pituita, menstrua fiunt pauciora. & Praxagoras in primo de naturalibus: Acetabula autem sunt ora venarum & arteriarum, quæ ferunt ad vterum.

Quæ vtero gerunt, his vteri os cõprimitur. Maximum hoc est mulieris quæ concepit indicium, si obste-

rix potuerit immisso digito os vte-
 rorum tangere. Statim enim quum
 iemen intra seiplos acceperint, totū
 iui interius contrahunt spacium &
 claudunt os. Videtur autem & pro-
 pter durum tumorem & inflamma-
 tionem os vteri comprimi. Distin-
 guitur autem ab eo qui in grauidis
 ex duritie vteri.

Mulier i vtero gerenti, si lac mul-
 tum ē mammis effluat, foetum im-
 becillum significat: si verò māmæ
 solidæ fuerint, foetum significant sa-
 niorem. Quæ corrupturæ sunt foc-
 tus, his māmæ extenuantur.

Si verò rursus duræ fiant, dolor aut
 māmās, aut coxas, aut oculos, aut ge-
 nua infestabit, & non corrumpent.

Vide commentarios Gale.

Quæcumque vtero gerentes à fe- s.aph.55.
 bribus corripuntur & fortiter cale-

y iiii

fiunt sine occasione manifesta, difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortum facientes periclitantur.

Gal.

Accidit quibusdam grandis in quibus vitiosi humores priusquam conceperint sunt acervati, nonnumquam à febris vehementibus corripiti, ita quòd ex necessitate abortiunt nonnumquam verò mediocribus. Sed quum non purgentur sufficenter, aliquid superest reliquiarum humorum in corpore vitiorum, ex quibus febres sunt constitutæ, ut potest non potentibus medicis mulieri gravidæ aliquod forte auxiliū adhibere, neque exquisita victus ratione in ipsis uti. Ob hanc igitur causam febris in ipsis frequenter reuertitur, & magna temporis parte graviter se habent. Non sine ratione igitur foetus aliquando nequit obistere, sed

ex febre, & vitio humorum corrumpitur, nonnūquā verò perdurat quidem vsque ad tempus partus. Sed quum & ipse valetudinarius sit, vt qui longo tempore laborauerit, & quum matrem habeat imbecillam, non sine periculo paritur. Nam ad bonum partum, duorum corporum vigore est opus, & grauidæ mulieris & infantis. Si mulieri vtero gerenti purgationes eant, impossibile est foetum esse sanum. 5. aph. 60

Mulier vtero gerenti, si tentio 7. aph. superuenerit, facit abortum. Circa 27. Gal. intestinū quod rectum nominatur tentio fit, eandem habens causam ac dispositionem, quam in difficultatibus intestinorū suscipit aliquod ex his quæ superius iacet intestina.

Hæc autem passio nomen accepit, vt inquit, ab illa quæ fit in ea ten

tionē, ob quam quum cacare vehementer appetant, continuē exurgūt. Ob talem igitur tensionē atque molestiam, & totum aliud corpus laborat, sed præ cæteris vterus qui cognatus est recto intestino. Nihil autem mirum, si propter vehementes atque frequētes exurrectiones ac tensiones conceptus abortitur, quando & ex aliis omnibus fortibus motibus atque doloribus mulieres gravidæ solent abortire.

Infans in vtero sic continetur.

Summa pars clunibus continuatur, genua oculis sunt apposita: vnde & concaui exeunt, & genæ dicuntur.

ABORTVM FAC-

cientia.

Si hyemis australis & pluuiosa &

3. aph. 12.

ferena fuerit, ver autem siccum &
quilonium, mulieres quibus par-
tus ad ver inest, ex quacunque occa-
sione abortiunt. Quæ verò parient,
imbecilles & morbidos infantes pa-
riunt: quare vel statim intereunt,
vel tenues & valetudinarii viuunt. Gal.

Corpora siquidē humida, ac mol-
lia & laxa facta, hyeme ferena ad in-
timas sui partes aëris ambientis fri-
giditatem facile admittūt. Ita quod
quicumque infantes longo tempore
calori sunt assueti, percussi vehemē-
ter à frigore, non absque causa, hi
quidem iam mortui in ipso utero
sunt, hi verò in ipso partu morien-
tur. Qui verò viui in lucem edun-
tur, non ferentes subitam ad con-
trarium transmutationem, vel bre-
ui post tempore moriuntur, vel exi-
les, atque insalubres creati, vix in

vita perdurant.

Gal. lib. 3 de natu-
ralibus 2^a facultati
bus. Aborsus triplex est causa, aut moles
nimia, aut pondus aliquod, aut mor-
sus. Moles, vbi amplius disten-
di vterus non tolerat, pondus, quā
supra vires eius sit quod continet.

Morsus, vbi vel humores qui prius
in membranis continebantur, his
ruptis in ipsum vterum sunt effusi,
vel etiam totus partus corruptus &
putris, ac in noxiam saniem dissolu-
tus, vteri tunicam eius occasione
irritat, ac mordet.

SIMPLICIA ABOR-

tum facienti a Ex plinio.

Elaterium grauidis abortum facit,

Plinius. lib. 20. c. 2. Olympias the-

bana, maluas abortiuas esse cum a-

dipe anseris, Plinius. lib. 20. c. 21.

Cypero foetas foeminas quidem

abortus facere nō dubitat Apollodorus. lib. 21. c. 18. Polio abortum fieri poto. lib. 21. c. 20. Portentum est quod tradunt cedri succo abortiuū fieri in venere ante perfusa virilitate. lib. 24. c. 5. Tantum inest femini dracunculi virus, vt olfactum grauidis abortum inferat. lib. 24. c. 16. Prægnans si edat onosma, aut supergrediatur, abortum facere dicitur. lib. 27. c. 12. Viperam mulier prægnans si transcenderit, abortum faciet. lib. 30. c. 13. Si castoreum fibrūve supergrediatur grauida, abortum facere dicitur & periclitari partus si superferatur. lib. 32. c. 10.

Si prægnans radicem cyclamini transgrediatur, abortū fieri tradunt. lib. 25. c. 9. Neutra filicum danda sceminis, quoniam grauidis abortū, cæteris sterilitatem facit. Plinius

NVTRICATVS QVOQV
alenda sunt grauidæ.

Paulus. Utantur itaque præfenti commo-
 lib. 1. c. 1. ditate, in ambulationibus, alimen-
 tisque haud magnam partem suavi-
 bus, rufi coloris falerno, quod pari-
 ter & ab odore cōmendetur, in pri-
 mis autem lustrico: ceterum pota-
 tioni perpetuó non nisi mediocri
 indulgeant. Quippe hæc omnia tum
 superfluitatum saburram, tum cre-
 bram quoque vomitionem non di-
 co compescere, sed arcere etiam cō-
 sueuerunt. At qui medicamentorū
 in eadem affectione prouinciā pul-
 chrè subeūt, sanguinalis herba, quæ
 πολύγανον græcè vocatur, aqua
 elixa & epota: pariter & anethum,

radixque pontica, vernaculo ab indigenis gentis suæ vocabulo Rha appellata, hæc indiscriminatim tantantè, quàm à cibo, cum prima tum secunda mensa, sumi vtiliter possunt.

Aërem vtero gerens colat temperatum, pauco tribus primis mensibus vtatur exercitio, somno indulgeat modesto, alius sit probè cibus.

CLYSTER.

Si oletula non exeant, iniice clysterem pulli iure medullâ cassiarum saccharo & oleo concinnatum.

PVRGATIO.

A quarto mēse vsque ad septimū si materia turgeat, authore Hippocrate, medicamento non violento purgetur, verbi causa, cassiæ fistularis medulla, pulli decocto macerata, aut manna. Vel ex his addito sac-

charo & auro bucellatum cathartici-
cum conficere potes.

VENAE SECTIO.

Quaquam Hippocrates Gale-
nūque dixerint abortum pati mulie-
res utero gerentes, si sanguinem ē
vena miserint, passim tamen video
medicos, quarto, quinto & sexto
mense axillarem venam, interdum
medianam, & quam saluatellam vo-
cant audacissime incidētes his qui-
bus opus est, nec propterea perit
foetus.

CATAPLASMATA

& emplastra.

Aegineta

Forinfecus autem praecordiis
ananthem, sylvestris punice florem,
balaustium, trifolii (quod cytison
vocant) ac smyrnii coman, fœnicu-
lique semen, cataplasmatibus mode

applicare expedit. Neque vel tantil-
lum interest vtrumque misceas, cū
palmulīve, an vino veteri, modo lo-
co prædicto imponas. Hostioli præ-
terea ventriculi lancinationibus
(quos *καρδιαμοις* græci nun-
cupant) aquæ calidæ potio, deam-
bulationes tranquillæ, præcordio-
rumque quod è molliori lana confi-
citur, sceparnon, sæpe numero su-
currunt. Si ex debilitate renum
& ligaminum abortum metuas, post
inunctiones ceratum istud deferat,
quod. R. Mastiches ʒ. ʒ. f. ladani. ʒ.
ʒ. cere citrinæ. ʒ. ʒ. bistortæ, galbu-
lorum cypressi, hypocystidis, aca-
ciæ, sanguinis drac. terræ lemnia,
rosarum rub. glebæ armeniacæ. an.
ʒ. ʒ. f. concinna ceratum oleo myr-
thino & terebinthina exceptum,
corio imponatur.

Cæterum si renes viribus ex frigore destituantur, loco prædicti cerati sequens admoue, ℞. Mastiches. 3. 6. ladani. 3. 3. f. ceræ citrinæ, colophonix, picis naualis, styracis an. 3. 1. f. galbulorum cypressi, menthæ, galagæ, galliæ moschatæ, thuris chalbanses, commi, myrrhæ, an. 3. 1. f. fiat ceratum, addendo vbi opus est terebinthinæ quantum sit satis.

PICAE SE V MALA

tix & fastidii cura.

Fastidiosa & ab eduliis appetitus auersione laborantes, diuersi generis dapibus vesci, amilo arido, hoc est placentis, aut aliis nonnullis ex tritico esculentis, genioque liberiùs indulgere hortando, restitues. Peculiariter verò & magnifice hæc grauidis conferunt, quæ tellu-

is glebam deglutire gestiūt, quem-
dmodum in malatia, quam graci
ἰσθη id est pican indigitant, quæ
circa tertium à conceptu mensem Aegineta
ideo plærumque ingruit, quod ne-
queat tum partus ob imbecillitatē,
omne quod à locellis nutrimenti
causa recipitur, neque conficere, ne-
que consumere superuacanea, ob
eam causam, ac varia in stomacho
retrimenta (quibus περιττώματα
græcè nomen est inditū) veluti stru-
es congeruntur: vnde tam diuersa-
rum, tanquam portentosarum rerū
nascitur prægnantibus appetitus:
Verbi gratia, carbonum extincto-
rum, cretæ cymoleæ, & id genus in-
numerosorum ferme: ex qua ratio-
ne nomenclaturam hanc id malum
inuenit, ob picturatam illam scilicet
eius avis varietatem, vel quod isti-

usmodi affectus illam subinde auē
impetat. Aescæ porro desiderium,
exercitationes, & longiusculæ pere-
græ profectioes restituunt. Quod si
qua prægnans mulier genialiter vi-
sitare, lautiùsque cuticulam curare
assueuerit, hæc subitas nulla com-
moditate subibit motiones. Datur
præterea cibum abhorrentibus non
nunquā potus acrimonia quadā im-
butos, præsertim sinapi degustare.

Gal. lib. I
de sympt.
causis.

Prauas qualitates appetūt. 2. qui-
bus ventriculi tunicæ prauo aliquo
excremento sunt imbutæ. Atque cō-
suevit huiusmodi affectus mulieres
vitiosis humoribus refertas infesta-
re, idque quum vtero gestant, vo-
catur pathos ipsum Citta (id est pi-
ca, siue Malatia) appetunt autem
maximè per hunc affectum & acida
& acerba, nonnunquam acria quo-

que. Interdū vel cimoliā terram, vel
 flestas, vel extinctos carbones, aut ali
 os huiusmodi cibos absurdos. Atque
 cōplures earū huiusmodi vitio labo
 rant vsque ad secūdū ac tertīū mē
 sem. In quarto verò quiescunt, par
 tim quòd vomitione vitiati humo
 res expurgantur, partim quòd con
 coquūtur, vt pote exiguum cibi, tum
 sumente muliere ob fastidium, par
 tim etiam quòd multitudo vacua
 tione sit immunita. Quippe primis
 duobus mensibus foetus paucum ad
 se sanguinem attrahit, eo quòd pa
 rum adhuc auctus sit adeo vt ne fœ
 tus quidem nominari tum debeat,
 sed cyema potius (id est conceptus).
 Vbi verò iam increuit, tum pluri
 mo indiget alimento, atque tum nō
 id quod optimum est ē venis, allicit:
 verum etiam quia maiorem alimē

ti copiam requirit, aliquid vitiosi simul attrahit. Ita fit, vt vniuersū corpus & plethoricon (id est plenum) esse desinat, & minori humorū vitio crucietur. At foetus ipse excrementa quæ ab attracto redundant alimento, ad duas reponit mēbranas. Quò fit vt ipse quoque & maiori humorū vitio, & maiori intemperie infestetur, quandoquidē à vitioso sanguine alimentū sumit, nisi grauida mulier residuo, quo vterum gerit tempore, optimis vtatur cibis. Malacia viris etiā nōnunquā accidit, quando ipsis quoque vitii humores ad ventriculi osculū defluunt. Huiusmodi symptomata circa alimenti appetentiā euenire solent. Fit fastidiū eadē, qua pica, ratione, læso ore ventriculi in mulieribus grauidis. Cōtingit autē propter vitiosos humores totū cor

us occupātes tale aliquid accidere:
erūm hoc cū horrore & febre pati-
entur, & his distingūtur à grauidis.
Hac Gal. in commētario. 61. sentē-
tiæ quintæ sectionis. Si mulieri ces-
sent purgationes, neque febris. &c.

VNGVENTA.

Ventriculi os in malatia ante pran-
dium hoc inungito vngvine, pannū
calidum superponendo. R. Olei
spicati. ʒ. i. mastichini, olei ex coto-
neis. an. ʒ. f. friamētōrū corallii rub.
caryophyllorū, mentæ siccæ, calami
odorati, galliæ moschatæ. an. ʒ. f. ce-
ra excipiantur in vng. ʒ. Si discu-
tere cupis flatus, ilia & aluum inun-
ge oleo lilino composito. Si renes ex
calore debiles fuerint, R. Olei myr-
thini ʒ. i. f. olei. rosacei, olei ma-
stich. succi plantag. aut sedi. an. ʒ. f.
friamenti glebæ armeniacæ, terræ

z iii

DE MORB. MYL.

lénia, hordei vsti, santalorū rub. acacia, fructuum myrti, hypocystidis fructus oxyacanthæ. an. 3. f. cera excipiantur in vnguētum, addito paulo aceto.

ECLEGMA TA ET

pulueres.

Diamargariton vtraque cōfectio.
R̄. Conseruæ ros. cōseruæ vtriusque buglossi. an. 3. f. diamargariton. 3. 4. margaritarum. 3. 2. fragmentorū lapillorū preciosorū cōmuniū. 3. 1. corallii rub. 3. 2. trita subtilissime misc. & cum serapio rosaceo addito auro fiat cōfectio, dato cochlear.

Si adsunt flatus. R̄. Cinnamomi electi. 3. 1. caryophyll, nucis moschata, cardamomi. an. 3. 2. zingiberis. 3. f. piperis. 3. 1. croci. 3. f. friato, & friamento saccharo misto vtitor cū cochleare.

VICTVS.

Arnaldus nouauillanus hanc
vini confectionem pro foetu reti-
nendo in vtero descripsit. R. Zin-
giber. caryophill. an. 3. i. spiced. pipe-
ris albi. an. 3. f. galangæ, anisi, carei.
an. 3. 2. fiat vinū aromaticum addito
saccharo, quod diluatur aqua deco-
ctionis vuarū passarū aut glicyrhizæ.

Caueat vtero gerens à labore, ex-
ercitio vehementi, saltu, tussi, coitu,
balneo, frigore externo, ira, tristitia,
timore, vomitione forti, rebus acu-
tis & amaris, vt sunt cappares & oli-
uæ acerbæ, ab his quæ menses cient,
& abortum faciunt.

Si aliquid tamen ardentè desi-
deret, id non est prorsus denegan-
dum, & si non conueniat.

Cibi boni succi exhibeantur,
Vinum propinetur odoratum, ma-

z iiii

curum, non album, sed parum tendens ad fuscum.

Vtatur fructibus maturis abstrigentibus, cuiusmodi sunt cotonea, & pira, mala punica, nuces ponticæ tostæ, castanæ, limonium pomum, malum aureum quod arangiam vocant Galli.

Vitet porrum, allium, cepas, sinapi, cicera arietina, petroselinum.

Deformat preciosos lapillos.

Verbi gratia, sapphyrum, hyacinthum, corallium, corneliam, adamantem, tursciam. &c.

CONTRA PEDVM

tumores prægnantium.

Aegineta

Aduersus pedum tumores, præsentissima cum vtilitate, solastrum, quam authyllidem vocant, in aceto maceratū, & brassicæ latioris folia,

nec non & creta cymolea ex aceto
illita, alumen pariter ex aceto, adhi-
bentur. Profunt item mala medica
siue citrea, in aqua lauandis pedibus
elixa. Brassicas in aequali vini &
aceti quantitate coquito, & eo pedes
tumentes foueto, aut emplastri mo-
do imposito, vel cymoleam fabro-
rum ferrariorum aqua macerato,
addito pauco aceto, & illinito.

Arabes.

Vel rosaceo, aceto & cymolea si-
mul confusis pedes illine.

Papyrus aceto soluta imponatur.

Dracuntii folia etiam admota vti-
lia sunt. Vel foueantur pedes de-
cocto ramenti cornu cerui aceto &
vino macerat.

DIFFICULTAS

partus, *Ausonia.*

CAUSA.

Gal. lib.
defi.
medi.

Partuum difficultates tribus modis eueniunt, in prægnante, in foetu, & in exterioribus. In prægnante, quum irascitur, zelotypia laborat, vel molestiis, vel alio affectu. Si meatum plus iustò angustiorē habet, aut pinguiorē, tum primū parit, aut minimè amplam habet vuluam cōparatione partus. In pariēte, quādo abortū parit, aut gemellos, aut mēstruosū quippiā, extrinsecus hystericæ aut æstate supra modum vehementi, torrentiue pariendi difficultas nascitur, vel culpa parentis, vel culpa foetus, vel chorii vitio.

(Est autem chorion inuolucrum, quo partus in vulua parentis inuoluitur) vel per ea quæ foris accidunt.

Gignentis quidem culpa, aut propter crassitiem & pinguedinem, aut ob arctam & exiguam matricē vni-

uersam, aut dolorem immensum,
aut dilam vlcus, aut ob animum
pusillum, aut inflammationem ma-
tricem occupantem, aut aliud mem-
brum, aut quocumque alio morbo
affectam, aut suapte natura valetu-
dinariam, vel viribus destitutā, ex-
trudere foetum non valentem, aut
ante legitimum parturitionis pun-
ctū parientē. Itē si os cervicis vteri
obliquū fuerit, aut eidē caro aliqua
ob vlcus quod præcessit adnata sit. Arab.
Vel quia puella citius quā par sit
parit, aut non cōsuevit vtero gerere,
vel quia annosa annūve est: nā an-
nis confectæ difficillimē pariunt.

Culpa verò foetus, vel quum su-
pra modum ingens est, aut nimium
pusillus, & nec magnopere ponde-
rosus, aut amplissimi capitis, aut mō-
strum: verbi causa, biceps, aut mor-

Aegineta

tuus, aut viuens quidem, sed imbecillis, neque potens in lucem progredi, aut quòd complures partus fortita sit: quinque namque simul in vtero haberi posse asserit Herophilus, & repente omnes simul collo vteri impingantur, aut quòd non naturaliter dispositus sit, neque ad exitum quadrans corporis figura, seu habitus. Est enim uero naturale foetus in lucem edendi schema. Primū quidē & præcipuū ebrii schema in caput manibus in foemora dispositis, porrectis & extēsis, & ne paululū quidē perperā declinās, rectā os versum caput porrigens.

Secunda verò foetus forma, rectā in pedes, ne tantillum quidem ab eo tramite declinans probatur.

Præter hæc duo, omnia cætera in lucem edendi partus præter na-

curam, ne monstrosa dicam, existūt
schemata, vt si caput in dextram
aut sinistram vteri partem inclinat,
vel si altera, aut vtraque manus exe-
ritur, crurāque interiūs à se inuicem
diducuntur, aut si foetus altero pede
prodit, altero interius retento: aut si
duplicatus alicui vteri parti in-
nuitur.

Vitio autem membranæ chorii
puerperii difficultas fit, vel quum
non auellitur propter crassitiem, vel
quum antequam conueniat auelli-
tur, ob tenuitatem & macilentiam:
humore siquidem qui in vtero col-
lectus fuit, vacuato, agerrimè dela-
betur embryon propter ariditatem.

Si quæ extrinsecus occurrant, in
causa agræ parturitionis sunt, siue
frigore condensante, siue calore im-
modico disiciente potentiā, aut alio

quoque euentu incurfante.

Cauſæ externæ ex parientis & aſſiſtentium ſermonibus cognoscuntur.

NOTAE:

Fachl, ex
philonio,

Debilitas quoque parientis, veluti etiam pinguedo, ex habitu corporis deprehenditur. Ex morbis etiam præcedentibus facile in imbecillitate cognitionem veniemus. Foetus imbecillitas ex debili ac tarda maturatione cognoscitur, qui si mortuus fuerit, à motu prorsus ceſſat, ventris frigiditas adest, atque dolor iuxta umbilicum grauis, ſpiritus exhalatur foetidus, faciei color prauus. Magnitudo foetus ex parentum corporis conſtitutione, ac ventris parietis mole coniicitur. Craſſities ſecundæ inde colligi poteſt, quod prædictorum ſignorum nullum adſit, & par-

curiens robusta, facilisque foetus mo-
tus fit.

PRAESAGIA.

Vide praedictiones in capite de
conceptione foetus praescriptas.

Mulier post annū quintū & vigesi-
mum primò cōcipiēs, difficulter pa-
riet. Pinguis mulier sicut difficile
concipit, ita & agerrimè parit.

Si dolor vētris imas partes tētat, cū
pariētis virium robore, & nulla ad-
sit anhelandi difficultas, in muliere
tēperaturæ & ætatis mediocris, bo-
no est. Si dolor ad ilia & os sacrū
tendit, difficillimè pariet.

Mulieri quæ vterinis molestatur,
aut difficulter parit, superueniens
sternutatio, bonum.

Quæcūque vtero gerentes à feбри- 5. aph. 35.
bus corripuntur. &c.

Vide in. c. de conceptione.

Mulieres quæ in nauibus pariunt, mutos edunt. Primiparæ, & quæ rarius pariunt, plurimū in partu & puerperio laborāt, quæ verò cræbrius pariunt, minus. Oscitatio in enixu letalis est. Plinius lib. 7. c. 6.

PARIENDI RATIO.

Aegineta Obasam mulierē in lectulo pronā, hoc est in caput propendētē, & vultu in terrā deiecto figurare oportet, flectentē inclinātēve genua ad scemora, quo vterus ad abdomen tendēs, ē directo oris sit. Digitis verò pinguedinibus, verbi gratia, butyro, oleo, axūgia anatis, gallinæ & similiū, delinire os oportet, & sensim dilatare. Quod si igitur astrictioni aut densitati quasque cuneationi difficultatis pariendi culpa imputatur, laxatione primitus succurrito,

infundens iugiter oleum dulce, &
calidum, & elixationem fœnigræci,
aut maluæ, aut seminis lini, aut etiã
dua, laboris mitigandi gratia.

Deinde pubem cum epigastrio
& lumbis cataplasmatibus modo illi-
nito cum semine lini, aut melicra-
to, aut hydrælæo, encathismatis præ-
terea cõsimilibus: Insuper calamos
id est laxationes balneis aquarum
dulcium moliri oportet, præterquã
si febris, aut alia quæpiam prohibeat
occafio. Mouetõque parietem le-
ctica fellæve, in aëre temperatè cali-
do. Nonnulli verò concussionibus
vehementibus ac violētis vtuntur,
Sternutamenta adhibent, atque ani-
mo puido existentem, quasque
detrectantem, concitant quidem &
exhortantur. Sed inexpertem dolo-
res partus admonere expedit, vt cõ-
&

stanter ceu operæ precium spiritum
 contineat, & validiore nisu concep-
 tionem ad os vteri protrudat. Atqui
 Syncope. sensum non tentatibus odoramen-
 tis animo deficiens recuperanda &
 recreanda est; refocillata verò me-
 diocriter nutrienda est alimento
 haud multo.

Quod si Inflammatio, aut alius
 quispiam morbus vterum infestavit,
 huic etiā ex propriis capitibus suc-
 currendum, ac prospiciendum erit.
 Vbi infans præmagnus fuerit, ea ad-
 hibenda quæ dilatare & laxare os
 vteri possunt. Vbi autē præter na-
 turam conformatum embryon est,
 schematissimum naturalem reddit:
 nunc quidem impellendo, nunc ve-
 rò adducendo, nunc flectendo, nunc
 verò dirigendo, Et si quidem manū
 prætendit, aut pedem, nulli membro

apprehensum arripere: magis nāque obstruitur, aut debilitatis artubus impotens euadit, aut etiam frangitur interdum. Sed digitos ad humorum aut coxendicum foetus trahendo, denuo prominētem infantulum in iocum suum reducito.

Porro si cum oris vteri compressione, totius infantis indecora fuerit figura, rursus ab ore vteri in superiora quamprimum eundem attollito: deinde comprehensum denuo in os ipsum dirigito.

Si autem gemini aut terni, pluresve fuerint, ac cervicem vteri obsederint, reliquos propellere ad fundum vteri oportet, & eum qui magis paratus videbitur, prius educere, verum cuncta paulatim, & absque partus ruptura facito, oleo perfundens locos. Opportunum porro tem

& ii

pus in sedis lecticam est, vbi matricis ostium apertum subcidit digito, inclinátque pro ruptura.

Fuchsius Porro si foetus tunica, seu secunda crassior fuerit, ac solidior quam vt rumpi possit, dissecanda erit. Quibus autem humor in tunicis contentus, ante congruum tempus effluxerit, ita aut loca exaruerint, ouorum albuminibus cum maluae aut foenigræ ci decocto excolato, aut ptisanæ cre more tepido perfundemus.

Aeg. lib. 6.
Aetius lib. 16. Verum si non procedat, quod infans mortuus sit, aut caput nimis magnū, vel etiā aliā ob causā ad foetus extractionē seu sectionē, quam græci ἐμβρυοτέλκίαν appellant, veniendū est.

PARTVS IV VAN- tia ex Plinio

Partus putant semine cucumeris
syluestris iuuari, si in arietis lana al-
ligatum inscientis lumbis fuerit, ita
vt protinus ab ea eximatur & rapia-
tur extra domum ipsam. lib. 20. c. 1.

Bulbi hortensii partum accelerant
cum sapa, aut passo sumpti, lib. 20. c.

9. Secundos partus ciet apii se-
men, lib. 20. c. 11. Seseleos folia utilia

sunt, vt quæ partus adiuuent etiam
quadrupedum. lib. 24. c. 5. Suffitu al-

lii secundos partus euocari existima-
uit Hippocrates, lib. 20. c. 6. Cunila-

go mollis montana serpillio similis
purgat à partu mulieres, lib. 20. c. 16.

Dalion herbarius parturientibus ex
aniso cataplasmata iposuit cū opio,

lib. 20. c. 17. Parere quoque faci-
lius anisum olfactantes, & statim à

partu dandum potui polenta asper-
sa, ibidem. Constat parturientes fo-

& illi

his maluarū substratis celerius solui, protinus à partu reuocanda, ne vulua sequatur. Dāt & succum maluæ bibendum, parturientibus ieiunis, in vino decocta hemina, lib. 20. c. 21. Caulis & folia ænanthes herbæ cum melle ac vino nigro pota, facilitatem pariēdi præstant, secundasque purgant, lib. 21. c. 24. Sonchi succus trium cyathorum mēsurā, in vino albo & oleo calefactus, adiuuat partus, ita vt à partu ambulent grāuidæ, lib. 22. c. 22. Palma suffitu partus extrahit, lib. 23. c. 5. Sunt qui celeritati partus multū conferre putent, radice lauri acetabuli mēsurā pota in aqua, efficacius recentem quā aridam, lib. 23. c. 8.

Laurus Alexandrina siue Idæa, partus celeres facit, radice pota triū denariorum pondere, in vini dulcis

cyathis tribus, secundas etiam pel-
lit, ibidem. Galbanum bibitur & in
difficili partu fabæ magnitudine in
vini cyatho, vuluâsque cōuersas cor-
rigit, lib. 24. c. 5. Chamædaphne par-
tus difficiles cit in lana apposita,
lib. 24. c. 15. Lingua herba quæ nas-
citur circa fontes, cribro in limite
abiecto herba intus extantes de-
cerptæ adalligatæque grauidis, par-
tus accelerant, lib. 24. c. 12. Diocles
difficile parientibus semen fœnigræ
ci debet acetabuli mensura tritum
in nouem cyathis sapæ, ad tertias
partes bibere, vt qui biberint in ca-
lida lauarentur. Et in balneo sudan-
tibus dimidium ex relicto iterum
dedit, mox à balneo reliquum, pro
summo auxilio, lib. 24. c. 19. Beto-
nica drachma bibitur in vini cya-
this tribus contra omnia vuluarum

& iiii

vitia, aut quæ à partu fiunt, secundas
 morantes, vel partus emortuos, ra-
 dices panacis appositæ extrahunt,
 Polemonia pota ex vino secundas
 pellit. Centaurii maioris radix dera-
 sa & apposita extrahit partus emor-
 tuos. Præcipua dictamo vis est, par-
 tus emortuos vel transuersos enicit,
 Bibitur ex aqua foliorum obolo, a-
 deo ad hæc efficax, vt ne in cubicu-
 lum quidem prægnantium inferatur:
 nec potu tantum, sed & illitu & fuf-
 fitu valet, pluribus autem modis &
 aristolochia prodest: nam & menses
 & secundas cit, & emortuos partus
 extrahit, myrrha & pipere additis,
 pota vel subdita, Secundas pota cis-
 santhemus pellit, Mandragoræ suc-
 cus appositus menses cit, & emor-
 tuos partus. Daucum & menses &
 secundas, potu facillime pellit, Emor-

ua scammonium pellit, potum vel
appositum. Radix è geranio, peculia-
riter secūdis inflammationibꝯque
vuluarum conueniens, Artemisiæ
radix pota intantum purgat, vt par-
tus euectos extrahat, Menses & se-
cundas cit ramorum artemisiæ de-
coctum insidentibus, Item folia po-
ta dragma. Ad eadem omnia pro-
sunt vel imposita ventri imo cum
farina hordeacca. Anthyllides duæ
vuluis vtilissimæ, torminibꝯque &
secundarum moræ, in vino potæ.
Radix verbenacæ pota ex aqua, ad
omnia in partu, aut ex partu maia,
præstantissima est, partus accelerat
scordotis pota, drachma succi in a-
qua mulsa cyathis quatuor. Dictami
folia præclare dantur ex aqua, con-
stat vnius oboli pondere, vel si mor-
tui sint in vtero infantes, protinus

reddi sine vexatione puerperæ, &
 militer prodest pseudodictamū, se-
 tardius, cyclaminos adalligata, cito
 fanthemos pota. Item betonica fa-
 rina ex aqua mulsa Plinius, lib. 26. c. 25.
 25. Anagyri, quam aliqui acopon
 vocant, folia difficulter parientibus
 adalligatur, ita ut à partu statim ar-
 ferantur quòd si emortuus hæreat
 & secundæ mensesque morentur
 drachmæ pondere bibantur in pas-
 so folia, lib. 27. c. 4. Postilli ex pe-
 riclymeno resoluti dati in vini albi
 cyathis tribus, partum iuuant, se-
 cundāsque pellunt, lib. 27. c. 12.
 Smyrnii radix partus adiuuat, & se-
 cundas pellit, lib. 27. c. 13. Axū-
 gia ē Sūe quæ non peperit, syncera
 partus in abortum vergētes nutrit,
 collyrii modo sublita, lib. 28. c. 9.
 Tradunt ceruas cū senserint se gra-

uidas lapillum deuorare: quem in
excrementis repertum, aut in vulua
(nam & ibi inuenitur) custodire par
tus adalligatum: Inueniuntur & of-
ficula in corde & vulua perquam
utilia grauidis parturientibusque,
lib. 28. c. 19. Tota oua adiuuant par-
tum, cum ruta & anetho & cymio
pota ex vino, lib. 29. c. 3. Partus euo-
cat membrana e canum secundis, si
terram non attigerit, cinis herina-
ceorum cum oleo perunctarum cu-
stodit partus, cōtra abortus. Facilius
euitantur, quæ fimum anserinum
cum aquæ cyathis duobus sorbuere,
aut ex vtriculo mustelino per geni-
tale effluentes aquas. Vermes ter-
reni grauidis secundas pellunt in
passo poti. Inueniuntur & in grami-
ne vermiculi, qui adalligati collo,
continent partum, Detrahuntur au-

tem sub partu, aliâs enitti non patiuntur. Cauendum etiam ne in terram ponantur. Cochleæ in cibo sumptæ accelerant partum, Amphibæna viua in pixide, etiam si mortua sit, atque asseruata, partus faciles præstat, Anguium senectus ad alligata lumbis, faciliores partus facit, proptinus à puerperio remouenda. Dant & in vino bibendam cum thure, aliter sumpta, abortum facit, Baculus quo angui rana excussa sit, parturiētes adiuuat. Lapis ætites in aquilæ repertus nido, custodit partus contra omnes partuum insidias. Penna vulturina subiecta pedibus adiuuat parturientes, Ouum cerui grauidis cauendum constat, quoniam transgressus abortus asperos facit, lib. 30. c. 13. Cancris fluuiatiles si partus stranguletur, poti ex aqua auxilian-

ur. Eosdem recentes vel aridos bibunt ad partus continendos. Hippocrates ad purgationes mortuosque partus vititur illis cum quinis lapathi radicibus, cum ruta & fuligine teritis, & in mulso datis potui. Ad secundas uti castoreo prodest, cum panace in quatuor cyathis vini. Mirum & quod de torpedine inuenio: Si capiatur cum luna in libra fuerit, triduoque asservetur sub diuo, faciles partus facere, postea quoties inferatur adiuuare. Et pastinacæ radius adalligatus vmbilico existimatur idem facere. A viuenti ablati sit ipsaque denuo in mare dimissa, Plinius lib. 32. c. 10. Crudus brassicæ caulis si edatur, partus quoque emortuos pelli. lib. 20. c. 9. Cichorium mulierum purgationibus quidem decoctum in aqua adeo pro

dest, vt emortuos partus trahat, lib. 20. c. 8. Ruta syluestris foeminarum etiam purgationes, secundasque etiam emortuos partus, vt Hippocrati videtur, ex vino dulci nigro potiora, lib. 20. c. 13. Mentastrum potum foeminas purgat à partu, sed partus necat, lib. 20. c. 14. Pulegium secundas & defunctos partus eiicit, lib. 20. c. 12. Si symbrium non edendum grauidis, nisi mortuo conceptu, lib. 20. c. 22. quippe impositum etiam eiicit. Si emortui sint in vtero partus, thymi decoctum in aqua ad tertias, lib. 21. c. 21. Anthemis pellit mortuos partus, lib. 22. c. 21. Silphii folia ad expurgandas vuluas pollendosque emortuos partus decoquuntur in vino albo odorato vt bibatur mensura acetabuli à balneis, lib. 22. c. 23. Nostri herbarii partus

mortuos salvia apposita extrahunt,
lib. 22. c. 25. Vino cognata res fa-
a est, musto decocto donec tertia
pars supersit, Ex albo hoc melius,
secundas, partusque emortuos tra-
hit cū bulbis potum, lib. 32. c. 2. Gal-
banum abortus non exeuntes tra-
hit appositū vel suffitu, lib. 24. c. 5.

Chamæpitys mortuos partus, ex ace-
to cocta potaque eiicere protinus di-
citur, lib. 24. c. 6. Herba sabina par-
tus emortuos apposita extrahit &
suffitu, lib. 24. c. 11. Aron partus om-
nium animalium extrahit, lib. 24. c.
16 Leporis iecur illitum cum croco
& porri succo, vellere appositū, abor-
tus mortuos expellit, lib. 28. c. 19.

Si mortuus partus sentiatur, equiliē
ex aqua dulci potus eiicit, lib. 28. c.
19. Succida lana composita subdi-
taque mortuos partus euocat, libro

EX MONUMENTIS

Arabum.

Eligatur obstetrix habens digitos
protenfos gracilesque, quibus oleo
lilino illitis in debitum schema fœ-
tus exitui paratus reponatur. Vtero
gerens aliquot diebus ante partum
crebriori exercitio vtatur, aliquan-
do gradus descendat ascendatque,
saltationes ante cœnā colat, dein-
de ieiuna tali luatur encathysinate.

INSESSVS.

℞. Althææ cum rad. m. 6. maluæ,
chamæmeli, fertulæ campanæ, apii.
ā. m. 4. foliorum lauri, lauēdulæ. an.
m. 2. seminis lini, fœnigræci, an, lib.
2. coquatur, decocto quotidie dimi-

lia hora huic decocto infideat mu-
lier.

VNGVENTVM.

A balneo aut infessu epigastrium
& os sacrum tali inungito vnguen-
to. Rx. Olei amygdal. dulc. ʒ. i. pin-
guedinis gallinæ, olei lilini, mucro-
rii althææ. an. ʒ. f. cera alba excipiā-
tur in vnguentum.

POTVS.

Ab inunctione duo ouorum lu-
tea speciebus aromaticis sequenti-
bus conspersa calidè potui dentur.
Sunt item qui vinum aromaticum
partui proximis propinant.

SPECIES AROMA-
tica.

R. Cinnamomi. ʒ. f. casia, aut
aa

DE MORB. MVL.

croci, cortic. cassiæ, fistularis. an. ʒ. ʒ.
sabinæ, betonicæ, adianti, dictamnifolij
foenigræci, baccarum lauri, mentanæ
an. ʒ. ʒ. f. ossis ex corde cerui. ʒ. ʒ. f. sacchari.
ʒ. ʒ. f. in pollinem omnia res
ducito.

ECLEGMA.

℞. Pharmacorum in speciebus
descriptorum & friatorum. ʒ. ʒ. f. sacchari
lib. ʒ. f. saccharum artemisiæ, aut
apiastri succo, aut liquore stillationis
liquetur, & inde quadras pond. ʒ. ʒ.
f. confice, dato quotidie quadram
ieiunæ, subinde decocti præscri-
pti, aut vini aromatici cyathum di-
midiatum propinato.

IN HORA PARTV.

ritionis quid facien-
dum.

Aër parientis esto calidus & humidus, pira domo (si quæ fuerint) abiiciantur. Lapillos preciosos portet, quibus vis inest iuuandi parientes, puta Aëtites sinistro lateri adalligatus, Magnes in sinistra manu detentus.

Sortilegæ cacoclæmonibus deuotæ ablegantur.

Partum accelerant dolorémque mitigant, lapsis, Smaragdus, Corallium, Styrax tritus & lana subactus, & pelli modo immissus, cor gallinæ adhuc ipsa palpitante positum, radix ocymi simul cum penna hyrundinis, radix cyclamini, artemisia, Dracuntium genibus alligatum, penna sinistra aquilæ seu tota ala, aut penna vulturis parituræ pedibus imposita, vnguis milui sub laborantis interula portata.

aa ii

Ex rostro porcino sertum capiti imponitur. Quum dolores vehemētissimos cum graui pubis pondere paritura crudeliter senserit, retentum spiritum sæpe inferius deprimat.

CATAPLASMATA & emplastra.

Auic.

Pedes cum contrito polypodio emplastrandisunt, venter totus artemisia emplastrandus. Fartum internum colocynthidis succo rutæ, & momēto myrihæ exceptum toti aluo emplastri modo imponatur.

PER METRANCHY- tum iniicienda.

Chorio rupto sæpe humores qui partum ad exitum iuuant, defluunt,

partu in locellis ficcis remanen-
te, tunc iniice decoctum sequens.
℞. Althææ cum rad. m. 2. artemisiæ.
m. 1. fœnigraci, seminis lini. an. 3. 3.
decem ficus ficas, coquantur.
decocti. 3. 4. adde, olei lilini. 3. 2.
moschi granum vnum.

POTVS.

Potui dato colamentum aquæ in
qua hirundinis nidus maceratus sit,
Berbenacam cum aqua frigida,
Adiantum cum vino, aut syrupo ro-
saceo, Mentam betonicam, cha-
mæmelum cum aqua & melle,
Ramentum nucleorum dactylorū,
Fimum anseris, falconis, aut acci-
pitris cum dulci vino. Vel ℞. Cor-
tic. cassiæ fistularum. 3. 1. aut. 2. pul-
ueris dictami, cū seminis lini deco-
cto, quibus nonnihil cinnamomi

aa iiii

semper adde. Medicamentum vniuersum
 rō quod in vniuersum omnes diffi-
 culter parientes iuuat, est hoc. R^x.
 cinnamomi electi. 3. 2. myrrhæ, casia-
 an. 3. 1. succini albi. 3. 1. f. vnā friato,
 de quo friamento in potu cum vino
 aromatico potui dato. 3. 1.

CATAPOTIA, ET orbiculi.

Globulos sequentes ex eorū quæ
 partus accellerāt decocto potui da-
 bis. 3. 2. R^x. Sabina. 3. 2. rutæ. 3. 4. ru-
 tæ syluestris. 3. 1. laſerpicii, ammonia-
 ci, rubiæ passiua. an. 3. 2. rutæ suc-
 co excepta digere in catapotia. Vel
 R^x. Aristolochiæ longæ, piperis,
 myrrhæ, aquas partes rutæ succo
 excipe in orbiculos.

ECLEGMATA.

Myrrhæ, castorii, styracis. an. ʒ.
cinnamomi & sabinae. an. ʒ. 2. mel
despumato excipiantur, & coch-
lear vnum cum seminis lini & iu-
iperi decocto ex vino calidè dato.
Sternutamenta profunt.

SECVNDÆ RE-
tentio.

Secunda siue chorion est mem- Gal. lib.
brana totum foetum inuoluens, ve- de semine
nis & arteriis contexta, duas habēs genitali.
tunicas, vel, vt alii volunt, tres, ma-
triciſ venis arteriſque cohærens,
per venas etenim illas sanguinem
quo foetus alitur, attrahit, per venā
vmbilicalem ipsum administrando,
per arterias item vmbilicales ad cor
foetus refrigerandum aërem trans-
mittit. Mediante enim radice, & qui

aa iiii

Arabes.

ab ea oriuntur villis capillaribus, plā-
 ta solo connectitur, à quo alimentū
 per ipsos villos sibi trahit, pari ratio-
 ne foetus per venulas in secūda spar-
 sas & arterias, quibus locellis hæ-
 ret, suctu sibi alimentum foetus ca-
 pit. Est & secunda membranula à
 filio Aboali Arabe bilex dictus. Itē
 ab vmbilicali vena ac vase quodā,
 per quod sibi foetus vrinam mādat,
 ortum trahit, quod plicas (rugatæ
 vestis figura) plurimas habēs, ac an-
 fractus, in quibus vrina foetus ad ip-
 sum missa reconditur, ab vmbilico
 infra, foetum ipsum totum inuoluit.
 Est & membrana tertia tenuissima,
 quæ foetui proximior prorsus ipsum
 circūdat, & intra se vniuersum fœ-
 tus sudorē receptū seruat. Prima igi-
 tur mēbrana & extima humores in
 locellis collectos à conceptione, qui

neque auctiori, neque nutritioni fœtus, ne fœtui noceant, arcet, sed inter locellos & hanc membranā ad partum vsque feruantur, & hæc secunda, siue chorion dicitur, quæ natura aut obstetricis digitis horâ partus dirumpitur. Secunda mēbrana biles dicitur, quā ab vmbilico partes fœtus inferiores teguntur, rugosa est, cavitates receptaculāque habens, quibus detinetur humor erodens & asper: verbi causa, lotium, sudor, quādiu enim fœtus in matris utero est, vrinam emittit per venam ab vmbilico, pertingentem dictam membranā, & nō per vrinæ meatus assuetos siue naturales. Tertia membrana vniuersum fœtum tegit, & vrinam in bile mēbrana contentā, ne pusioni noceat, arcet, mollior quā secūda mēbrana est, ne detri-

Euchari-
us, rodio;

mentum foetui inferat : hanc obstetrices pueri armaturam, Auicenna abgas vocant.

SECUNDAM EXTRA- hendi modus.

Fuchf.

Porro foetu excussio frequēter accidit, vt secūda in vtero firmiter adhærescat, quod vbi euenit, tum interdum os vteri apertum, interdum clausum reperitur, secundināque ipsa nonnumquam vteri fundo adhuc coniuncta, nonnūquam seiuncta est. Si itaque os vteri diductum fuerit, & secunda quæ inibi relicta est, alicui parti vteri orbiculatim ac pilæ modo conuoluta inhæserit, facile educitur, manu siquidem sinistra calida pinguique illita in fundū demissa, secundam sublabentem extrahere oportet. Si autem fundo vteri sit cōnexa, demissa simili modo manu ca

da, & pingui inuncta apprehensam
secundam trahemus, non tamen in
ectum, ne vterus procidat, neque
violenter admodum, sed leniter ac
placide primum in obliquum didu-
cemus, huc atque illuc circumagen-
tes: deinde paulò validius attrahe-
mus, hoc enim pacto obsequuntur,
& à connexu soluuntur. Quòd si vul-
uæ os clausum fuerit, perfusionibus
utemur, & sinistrae manus digitis le-
niter aperire & paulatim dilatare
conabimur. Quod si non successerit,
mulieris pubi fomenta, perfusio-
nes, vnguentaque emollientia &
relaxantia adhibere conuenit. Si ro-
busta fuerit, eo tempore etiam ster-
nutamenta ex castorio, pippere & si-
milibus confecta naribus admouē-
da sunt. Hinc est quod Hippocra-
tes. 5. aph. 49. sic scriptum reliquerit.

Vt secunda procidat, sternutatoria
apponito, & nares & os apprehen-
dito.

ECLEGMATA QVAE
cerebrum & cor confortant exhi-
beto: verbi causa, diamargariton.
Dianthu, Pliris cum moscho, po-
tio moschata.

ENCHATISMATA.
Inseffus sunt ex foliis & surculis
alii. Aut ex chamæmelo & chamæ-
acte.

LINIMENTA, INVN-
ctiones, & portanda vide in capite
difficultatis partus.

Os vteri illinitur croco & lepo-
ris coagulo. Inungatur vterus oleo
lilino, aut sambucino calido. Aegra
cingatur senecta anguium, Coxæ
adalligabis artemisiam aut absin-
thium tritum.

POTIONES.

Potiones denique aliquæ earum
quæ menses prouocant propinan-
dæ. Quæ quidem omnia primo, aut
altero die peragenda sunt. Vide po-
tiones scriptas in capite de difficili
partu, & de suppressis mensibus.

Bibendæ item decoctiones rosarum
recentium, allii, artemisiæ, faseolo-
rum rub. prassii, abrotoni, althææ,
pulegii, dauci, mentastri, petroseli-
ni, polytrichi, mercurialis, rubiæ
qua tingitur, potui dētur dictami, ar-
temisiæ, polytrichi, petroselini, mar-
rubii mercurialis, absinthii, pulegii,
verbenæ, porri, rutæ, hyperici.

Ad secundas, & partus emortuos
extrahendum. Ex Haly. abbate. R.
Sabinæ, aristolochiæ, perpenfæ, aco-
ri partes æquas, friata melle exci-

pito, portio esto. i. 3. 2. ex lupinorum.
mentastri & sabinae decocto.

Vel, R. opopanacis, galbani, fel-
lis bouis. an. 3. 2. castorii. 3. 1. detur
potui cum maratri & sabinae deco-
cto. Vir colem iuniperi lachry-
ma inungat & futuat, exhibit enim
statim foetus & secunda. R. Sabin-
ae, lupinorum. an. 3. 1. myrrhae, opo-
panacis. an. 3. f. castorii. 3. f. in tenu-
issimum pollinem redacta potui da-
to cum brassicae & pulegii decocto.

SVFFITVS.

Fuch.

Præterea suffitu vtendum, deco-
ctis in olla artemisia, iride, sabina,
pulegio, calamintha & similibus,
olla sellæ supposita, cui mulier vesti-
mentis vndiquaque circumsepta in-
sudeat. Quia veró grauitate odoris

& caput replet, & stomachum euer-
tit, odoramenta iugiter suffienda
sunt, quæ possint his malis aduersa-
ri, & secundam subducere. Ad quos
usus excellunt cardamomum, bdel-
lium cum sabina, thus, styrax, lada-
num, agallochum & huiusmodi.

Vel suffiatur ægra ungulis equi,
asinæ, capræ, stercore bouis, equi,
columbarum fimo & aquilæ, porri
semine, allio, picea, veratro candi-
do, nigella, aristolochia longa.

Vel Rutam, prassium & abroto-
num, trita parum dilue oleo lilino,
ferueat paululum, & mulier pannis Auic.
tecta vaporetur.

PESSI:

Pessos concinato ex allio, asphal-
to, lasere, balsamo, stercore accipi-
tris, galbano, gentiana, sagapeno,

scammonio, bryonia, iride, nitro, di-
 ctanno, excipiendo succo artemisiæ
 Rx. Aristolochiæ vtriusque, sabinae,
 nasturtii partes æquas trita in polli-
 nem bouis felle excipe in pessos.

At si secunda non obediat, dila-
 ceranda non est, haud multis enim
 postea diebus putrefacta, & in sani-
 em soluta excidet.

PVERPERAE CVRA:

Si peperit masculum, triginta die-
 bus lecto iacet: Si foeminam. 40.

Nonnullæ tamen statim à partu
 resurgūt. Cuius enim crudelis partus
 est, & cubilis exitus tardus, in pri-
 mis tenuem victum huic exhibere
 oportet. Symptomata à partu mulie-
 rem torquent, quæ proueniunt ex
 sanguinis suppressione, aut ipsius flu-

in nimio, aut adfunt vlcera^r ex liga-
mentis ruptis. Ex sanguine retento
sequuntur vertigines, animi deli-
quia, febres, & tandem omnes mor-
bi, qui supressos comitantur mēses:
i prædicta puerperam torquent, tūc
statim à partu saphena vena secāda
est, modò vires adsint minimè ficul-
neæ. Sanguinis fluor sistendus vt
dictum est, in mēsum nimio fluxu,
febres profligandæ his quæ de feбри-
bus libro peculiari dicētur. Dolo-
res sedandi sunt à copis, anodinis,
cataplasmatibus, inunctionibus.
Danda etiam potui triphara magna
cum opio ex vino: Si crudelissimo
affectu, sequentis eclegma-
is. 3. f. aut. 3. i. potui dato cum arte-
misie decocto ex vino calido, nam
statim dolorem sedat. R. Piperis
longi, seminis herbæ apollinaris cā-

1 bb

DE MORB. MVL.

didæ.an.3.5.opii thebaici,croci.an.
3.2.ß.pyrethri , castorii.an.3.ß.am-
meos , baccarum lauri, cymini,fol.
rutæ sic.calamenti.an.3.1.ß.marga-
rit.hyacinthi.an.3.ß.moschi electi.3
ß.excipiantur melle despumato in
eclegma, & seruetur sex mensibus
antequam quicquam detur.

MONSTRA.

Gal.lib.
de finitio
num.

Monstra,vt aliquibus placet,fiunt
propter inclinationem vuluæ, semē
enim effusum inequaliter, monstra
facit : sic & plumbum calefactum,
posteaquam inæqualiter fustum est,
inæqualia facit simulacea. Monstra
autem defecta fiunt quædam magni-
tudine, vt quæ magno sunt capite
prædita: Alia paruitate, vt quæ par-
ua habent capita: Nonnulla abun-
dantia, vt quæ sex digitos in altera
manu habent.

Vidimus aliquando (inquit Mar-
 cellus) ex gallia in italiam aduectū
 hominis in natura monstrum, quod
 per vrbes ad spectaculum quæstus
 causa à plerisque circumferebatur.
 Id puer nondum plenæ pubertatis
 erat, cui ab anteriore parte inter imū
 pectus & umbilicum eiusdem sexus
 paulominus quàm integer alius per
 sedebat homo alterius illius & inte-
 gri, ex quo pēdebat tertia fere pars,
 Caput illi tantum & superiores hu-
 merorum partes deerant, quæ velu-
 ti insitione quadam in integro illo
 latentes, tam apta quo diximus lo-
 co coaluerant, vt sine labore vitæ
 que tedio duo simul paulominus
 quàm tota corpora in vno homine
 viuerent. Brachia incepta illi tan-
 tum videbantur, reliquum vndique
 integrum corpus erat, quod ad al-

Marcel.

Virgili.

in diosc.

lib. 4. c.

142. in

lauro A-

lexadri.

bb iii

terius sensus necessitatēque omnes
etiam moueretur. haecenus Marcel-
lus: Hoc etiam vidi in pandocheo
quodam in opido castauariensi pi-
ctonum, quum tertiū decimū æta-
tis annum agerem, anno à christo
nato, aut passio. 1516.

Octauo die februarii anni do-
mini. 1541. in castro diui Amādi al-
liferi in solo borbonico ex iuuenula
quadam nihi notissima natum est
monstrum hominis effigiem à ca-
pite ad vmbilicum vsque referens,
ab vmbilico infra, crurum pedum-
que ac digitorum pedis loco substi-
tuta erat cauda syrenum modo, py-
ramidali figura, in latum tamen pe-
dis magnitudine desinebat. Tin-
ctum fuit hoc monstrum christia-
norum lauacro, horanīque à partu
duntaxat vixit.

Vidimus (inquit Alexander) mu- ^{Alex. be.}
 lierem sine brachiis natam, pedes ^{in anato.}
 pro manibus, adnendi suendique ^{mc.}
 artem habuisse. Eādem vidimus in
 castro Amādino allifero anno chri-
 sti. 1540. nentem, sumentem, pedibus
 manuum vice cyathum vini appre-
 hendentem, & cultello panem scin-
 dentem, & bellantium amore pe-
 dibus arreptis baculis tympanum
 bellicum pulsantem.

Ferunt ab orientis parte intima ^{Pli. lib.}
 gentes esse sine naribus, æquali to- ^{6. c. 30}
 tius oris planicie, Alias superiore
 labro orbas, Alias sine linguis, pars
 etiam ore concreto & naribus ca-
 rens, viuo tantum foramine spirat,
 positumque calamis hauenæ & grana
 eiusdem hauenæ sponte prouenien-
 tis ad vescendum, Quibusdam pro
 sermone nutus motusque membro-

bb iii

rum esse, Quibusdam ante Ptolema-
um lathyrum regem Aegypti igno-
tus fuit vsus igniū. Quidam & Pig-
meorum gentes prodiderunt ante
paludes, ex quibus Nilus oritur,
Nomades cynocephalorū lacte vi-
uentes, Olabi, Styrbotæ, qui octonū
cubitorum esse dicuntur, Cinamol-
gi caninis capitibus.

Pl. lib.
7 c. 1.

Iam in facie vultūque nostro,
cum sint decem, aut paulò plura mē-
bra, nullas duas in tot millibus ho-
minum indiscretas effigies existere
quod ars nulla in paucis numero
præstet affectando.

Iuxta eos, qui sunt ad septentrio-
nē versī, haud procul ab ipso Aquil-
onis exortu, specūque eius dicto,
quem locum Gesglitron appellant,
produntur Arimaspi, vno oculo in
fronte media insignes, quibus assi-

luè bellum esse circa metalla cum
tryphis, ferarum uolucris genere,
quale vulgò traditur, eruenta ex cu-
niculis aurū mira cupiditate, & fe-
ris custodientibus, & Arimasps ra-
pientibus, multi, sed maxime illu-
stres Herodotus & Aristes Proco-
nensis scribunt, vide cætera apud
Plinium. lib. 7. c. 2. Perlege librum
cui titulus in est, Omnium gentium
mores. &c.

FINIS.

Patere aut abſtine.



Nul ne ſy frotte.

